

Método de Jacobi-Richardson

Estagiária PAE: Ana Paula Mazzini

Marina Andretta / Franklina Toledo

Baseado no livro Cálculo Numérico, de Neide B. Franco.

16 de agosto de 2012

Já vimos que existem dois tipos de métodos numéricos para a solução de sistemas lineares:

- Métodos Exatos;
- Métodos Iterativos.

Métodos como

- Método de eliminação de Gauss,
- Método de decomposição LU

são ditos exatos: obtém a solução final após um número k de passos.

Em alguns casos/aspectos, métodos iterativos têm algumas vantagens:

- são melhores em matrizes esparsas;
- apresentam auto-correção de erros (podem ser usados para melhorar a solução obtida por métodos exatos).

- Um método é **iterativo** quando fornece uma sequência de aproximantes da solução;
- No caso de métodos iterativos, precisamos saber se a sequência que estamos calculando está convergindo ou não para a solução;

Idéia Geral:

Queremos resolver: $Ax = b$. Para tanto vamos reescrever o sistema como:

$$x = Bx + g,$$

onde $B = I - A$, $g = b$, por exemplo.

"Chutamos" um valor inicial para x : $x^{(0)}$. Obtemos:

$$\begin{aligned}x^{(1)} &= Bx^{(0)} + g; \\x^{(2)} &= Bx^{(1)} + g; \\x^{(3)} &= Bx^{(2)} + g; \\&\vdots \\x^{(k+1)} &= Bx^{(k)} + g.\end{aligned}$$

A série converge?

Critério: A série será convergente se, para alguma norma de matrizes, $\|B\| < 1$.

O Método de Jacobi-Richardson

Considere o sistema linear $Ax = b$ de ordem n , onde $\det(A) \neq 0$, isto é:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \dots + a_{3n}x_n = b_3, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

A matriz A pode ser escrita como a soma de três matrizes:

$$A = L + D + R,$$

onde:

- L é uma matriz triangular inferior formada pela parte inferior de A ,
- D é uma matriz diagonal formada pela diagonal de A e
- R é uma matriz triangular superior formada pela parte superior de A .

Então: $L = (l_{ij})$, $D = (d_{ij})$ e $R = (r_{ij})$, onde:

$$l_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, i > j \\ 0, i \leq j \end{cases} ; d_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases} ; r_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, i < j \\ 0, i \geq j \end{cases} .$$

Exemplo:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

O Método de Jacobi-Richardson

Supondo que $\det(D) \neq 0$, podemos transformar o sistema linear original em:

$$\begin{aligned} Ax &= b && \Rightarrow \\ (L + D + R)x &= b && \Rightarrow \\ Dx &= -(L + R)x + b && \Rightarrow \\ x &= -D^{-1}(L + R)x + D^{-1}b \quad , \end{aligned}$$

onde $-D^{-1}(L + R) = B$ e $D^{-1}b = g$.

O Método de Jacobi-Richardson

O processo iterativo definido por

$$x^{(k+1)} = -D^{-1}(L + R)x^{(k)} + D^{-1}b$$

é chamado de *Método de Jacobi-Richardson*.

O Método de Jacobi-Richardson

Supondo que $\det(D) \neq 0$ ($a_{ii} \neq 0$, $i = 1, \dots, n$) e dividindo cada linha de A pelo elemento da diagonal, temos:

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12}/a_{11} & a_{13}/a_{11} \\ a_{21}/a_{22} & 1 & a_{23}/a_{22} \\ a_{31}/a_{33} & a_{32}/a_{33} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a_{12}^* & a_{13}^* \\ a_{21}^* & 1 & a_{23}^* \\ a_{31}^* & a_{32}^* & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_{21}^* & 0 & 0 \\ a_{31}^* & a_{32}^* & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12}^* & a_{13}^* \\ 0 & 0 & a_{23}^* \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Assim temos:

$$A^* = L^* + I + R^*.$$

No caso geral

$$l_{ij}^* = \begin{cases} a_{ij}^* = \frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & i > j \\ 0, & i \leq j \end{cases} ; r_{ij}^* = \begin{cases} a_{ij}^* = \frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & i < j \\ 0, & i \geq j \end{cases} ; b_i^* = \frac{b_i}{a_{ii}}.$$

O Método de Jacobi-Richardson

Reescrevendo novamente o sistema, temos:

$$\begin{aligned} Ax &= b && \Rightarrow \\ A^*x &= b^* && \Rightarrow \\ (L^* + I + R^*)x &= b^* && \Rightarrow \\ x &= -(L^* + R^*)x + b^* \quad , \end{aligned}$$

onde $-(L^* + R^*) = B$ e $b^* = g$. O processo iterativo fica:

$$x^{(k+1)} = -(L^* + R^*)x^{(k)} + b^*.$$

Convergência do Método de Jacobi-Richardson

Vimos que o processo iterativo

$$x^{(k)} = Bx^{(k-1)} + g$$

converge se $\|B\| < 1$, para ao menos uma norma.

No caso do Método de Jacobi-Richardson ele converge se ao menos um critério de convergência é satisfeito. Ou seja, se para alguma norma $\|L^* + R^*\| < 1$.

- Critério das linhas

$$\|L^* + R^*\|_\infty < 1.$$

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}^*|.$$

- Critério das Colunas

$$\|L^* + R^*\|_1 < 1.$$

$$\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1, i \neq j}^n |a_{ij}^*| < 1;$$

Convergência do Método de Jacobi-Richardson

Note que se a matriz for estritamente diagonal dominante (isto é, em cada linha, o elemento da diagonal é estritamente maior que a soma de todos os outros elementos da linha), então o critério de convergência é automaticamente atendido para $B = -(L^* + R^*)$.

- Erro absoluto

$$E_{abs} = \|x^k - x^{k-1}\| \leq \epsilon.$$

- Erro relativo

$$E_{rel} = \frac{\|x^k - x^{k-1}\|}{\|x^k\|} \leq \epsilon.$$

Geralmente o ϵ   um valor suficientemente pequeno que nos indica a toler ncia que o erro poder  ter (ex: $\epsilon = 10^{-2}$, $\epsilon = 10^{-3}$, $\epsilon = 10^{-4}$).

Resolva o sistema linear:

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + x_3 = 7, \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -8, \\ 2x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 6 \end{cases}$$

pelos Métodos de Jacobi-Richardson com $x^{(0)} = (0.7, -1.6, 0.6)^T$, até encontrar um erro de 10^{-2} .

Exemplo (solução)

Primeiramente, vamos verificar se é possível obter convergência. Vemos que a matriz é estritamente diagonal dominante:

$$\begin{aligned} |a_{12}| + |a_{13}| &= |2| + |1| < |10| = |a_{11}|, \\ |a_{21}| + |a_{23}| &= |1| + |1| < |5| = |a_{22}|, \\ |a_{31}| + |a_{32}| &= |2| + |3| < |10| = |a_{33}|. \end{aligned}$$

Isso já nos garante que o método irá convergir.

Exemplo (solução)

Critério das linhas:

$$|a_{12}^*| + |a_{13}^*| = |0.2| + |0.1| = 0.3,$$

$$|a_{21}^*| + |a_{23}^*| = |0.2| + |0.2| = 0.4,$$

$$|a_{31}^*| + |a_{32}^*| = |0.2| + |0.3| = 0.5,$$

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1, j \neq i}^3 |a_{ij}^*| = 0.5 < 1.$$

Critério das colunas:

$$|a_{21}^*| + |a_{31}^*| = |0.2| + |0.2| = 0.4,$$

$$|a_{12}^*| + |a_{32}^*| = |0.2| + |0.3| = 0.5,$$

$$|a_{13}^*| + |a_{23}^*| = |0.1| + |0.2| = 0.3,$$

$$\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1, i \neq j}^3 |a_{ij}^*| = 0.5 < 1.$$

Exemplo (solução)

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -0.2x_2^{(k)} - 0.1x_3^{(k)} + 0.7, \\ x_2^{(k+1)} = -0.2x_1^{(k)} - 0.2x_3^{(k)} - 1.6, \\ x_3^{(k+1)} = -0.2x_1^{(k)} - 0.3x_2^{(k)} + 0.6. \end{cases}$$

- Iteração 1:

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = -0.2x_2^{(0)} - 0.1x_3^{(0)} + 0.7 = -0.2(-1.6) - 0.1(0.6) + 0.7 = 0.96, \\ x_2^{(1)} = -0.2x_1^{(0)} - 0.2x_3^{(0)} - 1.6 = -0.2(0.7) - 0.2(0.6) - 1.6 = -1.86, \\ x_3^{(1)} = -0.2x_1^{(0)} - 0.3x_2^{(0)} + 0.6 = -0.2(0.7) - 0.3(-1.6) + 0.6 = 0.94. \end{cases}$$

Exemplo (solução)

Calculando o erro:

$$E_{abs} = x^{(1)} - x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0.26 \\ -0.26 \\ 0.34 \end{pmatrix} = 0.34,$$

$$E_{rel} = \frac{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}}{\|x^{(1)}\|_{\infty}} = \frac{0.34}{1.86} \simeq 0.1828 > 10^{-2}.$$

Exemplo (solução)

Como o erro não foi satisfeito, continuamos o processo iterativo.

k	0	1	2	3	4
x_1	0.7	0.96	0.978	0.9994	0.9979
x_2	-1.6	-1.86	-1.98	-1.9888	-1.9996
x_3	0.6	0.94	0.966	0.9984	0.9968

Exemplo (solução)

Calculando o erro:

$$E_{abs} = x^{(4)} - x^{(3)} = \begin{pmatrix} -0.0015 \\ 0.0108 \\ 0.0016 \end{pmatrix} = 0.0108,$$

$$E_{rel} = \frac{\|x^{(4)} - x^{(3)}\|_{\infty}}{\|x^{(4)}\|_{\infty}} = \frac{0.0108}{1.9996} \simeq 0.0054 < 10^{-2}.$$

Com isso, paramos o processo iterativo e devolvemos $x^{(4)}$ como solução do sistema.

Dado o sistema $Ax = b$:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 & = 7, \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 & = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 & = -1. \end{cases}$$

Aplique o método Jacobi-Richardson a partir do ponto $x^{(0)} = (1.1, 1.1, -0.04)^T$ por duas iterações ou até atingir um erro menor que 10^{-2} . Utilize 4 dígitos significativos.