

1a. Lista de Exercícios SMA 0354 - Cálculo II - Curso Coordenado
atual.: 10/09/2019

Integrais Indefinidas

Exercício 1 Usando a técnica por substituição, encontre as integrais indefinidas:

- a) $\int \frac{8x^2}{x^3+2} dx$ b) $\int x\sqrt{x-4} dx$ c) $\int (2x+3)^{11} dx$ d) $\int \frac{t^5+2t}{\sqrt{t^6+6t^2}} dt$
 e) $\int \left(\frac{2z^2}{z^3+5} - \frac{3z}{z^2-10} \right) dz$ f) $\int [\sqrt{4t} + \cos(2t)] dt$ g) $\int \frac{\cos(t)}{-\sin^2(t)} dt$ h) $\int (2z^2-3)^5 z dz$
 i) $\int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$ j) $\int e^{\cos(x)} \sin(x) dx$ k) $\int \sin(x) \tan(\cos(x)) dx$ l) $\int \frac{(\ln(x))^4}{x} dx$
 m) $\int \cos^3(x) dx$

Exercício 2 Utilizando a técnica por integração por partes na integral indefinida, resolva:

- a) $\int \ln(x) dx$ b) $\int x e^{3x} dx$ c) $\int x^2 \sin(3x) dx$ d) $\int e^x \cos(x) dx$
 e) $\int e^x \sin(x) dx$ f) $\int \frac{\sin(2x)}{e^x} dx$ g) $\int \operatorname{arctg}(x) dx$ h) $\int \operatorname{arcsen}(x) dx$
 i) $\int x \ln(x) dx$ j) $\int x \operatorname{arctg}(x) dx$ k) $\int x \operatorname{arcsen}(x) dx$

Integrais Definidas

Exercício 3 Encontrar o valor das integrais definidas:

- a) $\int_{-3}^2 |x+1| dx$ b) $\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ c) $\int_7^{12} dx$ d) $\int_1^0 t^2 (t^{\frac{1}{3}} - \sqrt{t}) dt$
 e) $\int_3^2 \frac{x^2-1}{x-1} dx$ f) $\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} dx$ g) $\int_0^1 \frac{1}{(1-v^2)^2} dv$ h) $\int_0^1 x^2 e^x dx$
 i) $\int_1^2 \frac{\operatorname{senh}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$ j) $\int_0^1 \operatorname{sen}(x) e^{[\cos(x)+1]} dx$ k) $\int_1^2 x 2^x dx$ l) $\int_0^1 x (2x+3)^{99} dx$

Exercício 4 Consideremos uma partícula que se desloca sobre o eixo x com equação $x = x(t)$ e com velocidade $v = v(t)$ contínua em $[a, b]$. Qual é uma primitiva de v ?

(a) A diferença $x(b) - x(a)$ é o deslocamento da partícula entre os instantes $t = a$ e $t = b$. Como o Teorema Fundamental do Cálculo pode ser utilizado para calcular o deslocamento de uma partícula?

Definamos o espaço percorrido pela partícula entre os instantes $t = a$ e $t = b$ por $\int_a^b |v(t)| dt$.

(b) Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com velocidade $v(t) = -t^2 + t$, para $t \geq 0$. Calcule o espaço percorrido entre os instantes $t = 0$ e $t = 2$.

(c) Uma partícula desloca-se sobre o eixo x com velocidade $v(t) = 2t - 3$, para $t \geq 0$. Calcule o deslocamento entre os instantes $t = 1$ e $t = 3$. Calcule o espaço percorrido entre os instantes $t = 1$ e $t = 3$. Descreva o movimento realizado pela partícula entre os instantes $t = 1$ e $t = 3$.

Exercício 5 Seja $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável.

1. Mostre que se f é uma função par, então

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

2. Mostre que se f é uma função ímpar, então

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Exercício 6 Estude a paridade das funções que aparecem no integrando das integrais definidas abaixo e depois calcule-as:

$$(a) \int_{-1}^1 (x^2 + 4) dx \quad (b) \int_{-17\pi/4}^{17\pi/4} [\sin(x^3) - x^7 \cos(x)] dx \quad (c) \int_{-1}^1 \frac{x^{17}}{x^2 + 1} dx$$

$$(d) \int_{-1}^1 \frac{x^3}{x^4 + 1} dx \quad (e) \int_{-1}^1 \frac{\operatorname{senh}(x)}{\cosh(x^3 - x)} dx$$

Exercício 7 Sendo $f : [0, 9] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, calcule $\int_{-3}^3 xf(x^2) dx$.

Exercício 8 Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função w -periódica e integrável em qualquer intervalo limitado da reta, mostre que

$$\int_0^w f(x) dx = \int_a^{a+w} f(x) dx$$

para cada $a \in \mathbb{R}$ e para um real w fixados.

Exercício 9 Verifique que para todo natural $n > 1$, temos $\int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2}(t) dt$.

Exercício 10 Determine se a função f é integrável no intervalo $[a, b]$.

$$a) f(x) = \frac{x}{1+x^2} \text{ e } [a, b] = [-1, 2]$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 1 & \text{para } x = 0, \\ -\sin(x)/x & \text{para } x \in (0, 1] \end{cases} \text{ e } [a, b] = [0, 1]$$

$$c) f(x) = \begin{cases} 1/x^2 & \text{para } |x| \leq 1, x \neq 0, \\ 3 & \text{para } x = 0 \end{cases} \text{ e } [a, b] = [-1, 1]$$

Exercício 11 Determine o maior domínio de definição da função cuja lei é dada por:

$$a) F(x) = \int_0^x t^2 dt$$

$$b) F(x) = \int_{-2}^x 1/t^2 dt$$

$$c) F(x) = \int_0^x f(t) dt, \text{ onde } f(t) = \begin{cases} t & \text{para } t \in [-2, 0], \\ e^{-t} & \text{para } t > 0 \end{cases}$$

Exercício 12 Em cada um dos itens abaixo, encontrar a expressão da função $f' : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por:

$$\begin{array}{lll} a) f(x) = \int_0^x (t^2 + 1)^{10} dt & b) f(x) = \int_x^0 \sqrt{u^2 + 4u} du & c) f(x) = \int_{-1}^x t \operatorname{sen}(t) dt \\ d) f(x) = \int_0^{x^3} \cos^{\frac{1}{3}}(t) dt & e) f(x) = \int_{\operatorname{sen}(x)}^{\cos(x)} \sqrt{t^2 + 1} dt & f) f(x) = \int_0^{4x} \operatorname{sen}^{10}(t) dt \end{array}$$

Aplicações do teorema do valor médio (TVM) para integrais

Exercício 13 Em cada um dos itens abaixo, calcule o valor médio das funções f e determine $c \in \mathbb{R}$, tal que $f(c) = \text{valor médio da função } f \text{ no intervalo } [a, b]$:

- a) $f(x) = 3x$ e $[a, b] = [1, 2]$.
- b) $f(x) = \operatorname{sen}(x)$ e $[a, b] = [-\pi, \pi]$.
- c) $f(x) = \operatorname{sen}(x)$ e $[a, b] = [0, \pi]$.
- d) $f(x) = x^2 - 2x$ e $[a, b] = [0, 2]$.

Mudança de variáveis para integral definida

Exercício 14 Nos casos abaixo aplique o Teorema da Mudança de Variáveis para Integral (T.M.V.I) para resolver as seguintes integrais.

$$\begin{array}{lll} a) \int_{-1}^0 x \sqrt{x+1} dx & b) \int_0^1 \frac{u^2}{(u^3 + 1)^2} du & c) \int_{-1}^0 t(t^2 + 1)^{80} dt \\ d) \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2(t) \sin(t) dt & e) \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(z) dz & f) \int_0^1 \operatorname{senh}^3(t) dt \end{array}$$

Exercício 15 Suponha que a função $f : [-2, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em $[-2, 0]$ e que $\int_{-2}^0 f(x) dx = 3$. Calcule $\int_0^2 f(x-2) dx$.

Exercício 16 Suponha a função $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em $[-1, 1]$ e que $\int_{-1}^1 f(t) dt = 5$. Calcule $\int_0^1 f(2x-1) dx$.

Exercício 17 Sendo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $\int_{-4}^2 f(x) dx = 12$, encontre $\int_0^2 f(2-3x) dx$.

Cálculo de áreas de regiões planas

Exercício 18 Encontrar a área da região limitada do plano xy , delimitada pelas representações geométricas dos gráficos das seguintes funções e retas abaixo:

- a) $f(x) = x^2$, para $x \in \mathbb{R}, x = 2, x = 4$ e $y = 0$
- b) $f(x) = x \sqrt{4-x^2}$, para $x \in [-2, 2], x = 0, x = 2$ e $y = 0$
- c) $f(x) = |\operatorname{sen}(x)|$, $x = -2\pi, x = 2\pi$ e $y = 0$
- d) $f(x) = \operatorname{sen}(x)$, para $x \in \mathbb{R}, x = -2\pi, x = 2\pi$ e $y = 0$
- e) $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{10-x^2}}$, para $x \in [-\sqrt{10}, \sqrt{10}], x = 2$ e $y = 0$

Exercício 19 Encontrar a área da região limitada do plano xy , delimitada pelas representações geométricas dos gráficos das curvas abaixo:

$$a) y = x^2 \text{ e } y = 4x - x^2$$

$$b) y = \cos(x), y = \cos^2(x), x = 0 \text{ e } x = \pi$$

Exercício 20 Calcule a área da região limitada do plano xOy , que está à direita do eixo Oy e à esquerda da parábola $x = 2y - y^2$.

Exercício 21 Calcule a área da região limitada abaixo do gráfico da função f (e acima do eixo x), nos seguintes casos:

$$(a) f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{para } x \in [0, 1], \\ 2-x & \text{para } x \in [1, 2] \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{para } x \in [0, 1], \\ -(x-1)(x-4) & \text{para } x \in [1, 4] \end{cases}$$

Exercício 22 Considere a região $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, a \geq b > 0\}$. Encontre a área da região E .

Exercício 23 Desenhe o subconjunto A , do plano xy , e calcule sua área nos seguintes casos:

(a) A é o subconjunto limitado do plano xy , delimitado pelas retas $x = 1$, $x = 3$, pelo eixo x e pelo gráfico de $y = x^3$.

(b) A é o conjunto do plano limitado pelas retas $x = 1$, $x = 4$, $y = 0$ e pelo gráfico de $y = \sqrt{x}$.

(c) A é o subconjunto limitado do plano xy , formado por todos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tais que $0 \leq y \leq 9 - x^2$.

(d) A é o subconjunto limitado do plano xy , formado por todos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tais que $1 \leq x \leq 2$ e $0 \leq y \leq \frac{x}{1+x^2}$.

Exercício 24 Seja $x_o \in \mathbb{R}$ o ponto máximo da função $f(x) = x^2 e^{-x}$, para $x \in \mathbb{R}$. Calcule a área do conjunto limitado $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; 0 \leq x \leq x_o \text{ e } 0 \leq y \leq x^2 e^{-x}\}$.

Frações parciais

Exercício 25 Use decomposição em frações parciais para calcular as seguintes integrais indefinidas:

$$(a) \int \frac{16x + 69}{x^2 - x - 12} dx$$

$$(b) \int \frac{3x^2 - 10x - 60}{x^3 + x^2 - 12x} dx$$

$$(c) \int \frac{-3x^3 + x^2 + 2x + 3}{x^4 + x^3} dx$$

$$(d) \int \frac{3x^2 - 5x + 4}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$$

$$(e) \int \frac{x-1}{x^2(x+1)^2} dx$$

$$(f) \int \frac{x^3 + 4x^2 + 6x + 1}{x^3 + x^2 + x - 3} dx$$

$$(g) \int \frac{x^2 + 3}{x^2 - 9} dx$$

$$(h) \int \frac{x+1}{x^4 - x^2} dx$$

$$(i) \int \frac{1}{x^2(4-x)} dx$$

$$(j) \int \frac{1}{(x-1)(x^2+x+2)} dx$$

$$(k) \int \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x + 2} dx$$

$$(l) \int \frac{x^3 - 4x - 1}{x(x-1)^3} dx$$

$$(m) \int \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx$$

$$(n) \int \frac{6x^2 - 3x}{(x-2)(x-4)} dx$$

$$(o) \int \frac{x^4 + 5x^3 + 20x + 16}{x(x^2 + 4)^2} dx$$

$$(p) \int \frac{4x^3 - x}{x^2 - x - 30} dx$$

$$(q) \int \frac{8 - t^3}{(t-3)(t+1)^2} dt$$

$$(r) \int \frac{6 - z^2}{2z^2 + z - 21} dz$$

$$(s) \int_2^4 \frac{3z^2 + 1}{(z+1)(z-5)^2} dz$$

$$(t) \int \frac{2 + w^4}{w^3 + 9w} dw$$

$$(u) \int \frac{8 + t + 6t^2 - 12t^3}{(3t^2 + 4)(t^2 + 7)} dt$$

Exercício 26 No seguinte exercício verifique que: $A = 1, B = -1, C = -1, D = 1, E = 0$.

$$\int \frac{16 - 4x + 5x^2 - x^3}{x^5 + 8x^3 + 16x} dx = \dots = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{Bx + C}{x^2 + 4} dx + \int \frac{Dx + E}{(x^2 + 4)^2} dx.$$

Agora, responda as seguintes perguntas:

1. Como se resolve estas três últimas integrais acima?. E se a constante E fosse uma constante não nula? Como você resolveria a última integral?
2. E se fossem integrais do tipo: $\int \left(\frac{3}{2x+1} + \frac{2}{(3x+2)^2} + \frac{2x+3}{(2x^2+x+1)} \right) dx$? Como você resolveria?

Integração por substituição trigonométrica

Exercício 27 Faça substituição trigonométrica e então calcule a integral:

(a) $\int \frac{1}{x^3\sqrt{x^2-1}} dx$	(b) $\int x\sqrt{1-x^4} dx$	(c) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-6x+13}} dx$
(d) $\int 3x^5\sqrt{16-x^2} dx$	(e) $\int \frac{z^5}{(9z^2-25)^{\frac{3}{2}}} dz$	(f) $\int \frac{5}{x^2\sqrt{x^2+4}} dx$
(g) $\int \frac{\sqrt{3-4t^2}}{t^2} dt$	(h) $\int \frac{w^5}{\sqrt{8w^2+1}} dw$	(i) $\int \frac{2}{(x-3)^6\sqrt{-x^2+6x-5}} dx$
(j) $\int \frac{1}{(z+1)^2(2z^2+4z-34)^{\frac{3}{2}}} dz$	(k) $\int \frac{\sqrt{4y^2-16y+19}}{(y-2)^6} dy$	(l) $\int \frac{e^{12t}}{\sqrt{4e^{6t}-1}} dt$

Exercício 28 Resolva as seguintes integrais trigonométricas:

(a) $\int \sin(5x)\cos(x) dx$	(b) $\int \sin(4x)\cos(2x) dx$	(c) $\int \sin^6(x)\cos^3(x) dx$
(d) $\int \frac{\sin^7(x)}{\cos^4(x)} dx$	(e) $\int \sin^3\left(\frac{2}{3}x\right)\cos^4\left(\frac{2}{3}x\right) dx$	(f) $\int \sin^8(3z)\cos^5(3z) dz$
(g) $\int \sec^6(3y)\tan^2(3y) dy$	(h) $\int \tan^3(6x)\sec^{10}(6x) dx$	(i) $\int \csc^6\left(\frac{1}{4}w\right)\cot^4\left(\frac{1}{4}w\right) dw$
(j) $\int \frac{\sec^4(2t)}{\tan^9(2t)} dt$	(k) $\int \frac{2+7\sin^3(z)}{\cos^2(z)} dz$	(l) $\int [9\sin^5(3x)-2\cos^3(3x)]\csc^4(3x) dx$

Exercício 29 Desenvolvendo outras habilidades: Faça uma substituição para expressar o integrando como uma função racional (ou seja, como divisão de polinômios) e então calcule a integral:

(a) $\int \frac{\sqrt{x+1}}{x} dx$	(b) $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x}} dx$	(c) $\int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2+1}} dx$
(d) $\int \frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}} dx$	(e) $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{x} dx$	(f) $\int \frac{e^{2x}}{e^{2x}+3e^x+2} dx$
(g) $\int \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)-3\cos(x)} dx$	(h) $\int \frac{1}{1+e^x} dx$	(i) $\int \frac{\sec^2(t)}{\tan^2(t)+3\tan(t)+2} dt$

Cálculo de volume por integral simples

Exercício 30 Calcule o volume do sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo- x da região do plano- xOy delimitada pelos gráficos das funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sqrt{x}$.

Exercício 31 Calcule o volume do sólido de revolução obtido girando-se a região

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ e } x^2 \leq y \leq 1\},$$

em torno do eixo-y.

Exercício 32 As seções transversais de um certo sólido, por planos perpendiculares ao eixo-x, são círculos, cujos diâmetros estão compreendidos entre as curvas no plano-xOy definidas pelas equações $y = x^2$ e $y = 8 - x^2$. Encontre seu volume.

Exercício 33 Para $a > 0$ fixado, temos que a base de um certo sólido é o círculo

$$C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}.$$

Cada seção plana do sólido por planos perpendiculares ao eixo-x é um quadrado com um lado sobre a base do sólido. Calcule o seu volume. Faça o mesmo quando a base desse sólido é o círculo

$$C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)^2 + (y + 2)^2 \leq a^2\}.$$

Exercício 34 A base de um certo sólido é a região do plano-xOy delimitada pelo eixo-x, pela curva dada por $y = \sin(x)$ e pelas retas $x = 0$ e $x = \pi/2$. Cada seção plana do sólido perpendicular ao eixo-x é um triângulo equilátero com um lado na base do sólido. Encontre o volume do sólido.

Exercício 35 Em cada um dos itens abaixo, esboce a região delimitada pelas curvas dadas. Além disso, usando o método das cascas cilíndricas, determine o volume do sólido gerado pela rotação desta região em torno do eixo indicado.

- | | |
|---|--|
| (a) $y = \sqrt{x}$, $x = 4$, $y = 0$ e o eixo-y | (b) $y = x^2$, $y^2 = 8x$ e o eixo-y |
| (c) $y^3 = x$, $y = 3$, $x = 0$ e o eixo-x | (d) $x^2 = 4y$, $y = 4$, e o eixo-x |
| (e) $y = \sqrt{x+4}$, $y = 0$, $x = 0$ e o eixo-x | (f) $16y = x^2$, $y^2 = 2x$ e o eixo-y. |

Exercício 36 Seja R a região do plan-xOy delimitada pela parábola de equação $x = y^2$ e pela reta $x = 9$. Para cada um dos itens abaixo, determine o volume do sólido que tem a região R como base, sabendo-se que a secção relativa ao eixo-x é

- (a) um quadrado.
- (b) um retângulo de altura igual a 2.
- (c) um semicírculo.
- (d) um quarto de círculo.
- (e) um triângulo equilátero.
- (f) um triângulo, cuja altura é igual a 1/4 do comprimento da sua base.
- (g) um trapézio com base inferior no plano-xOy, cuja base superior tem comprimento igual à metade do comprimento da sua base inferior e o comprimento da altura é igual a 1/4 da sua base inferior.
- (h) um paralelogramo, com base no plano-xOy e cuja altura é igual a duas vezes o comprimento de sua base.

Integrais Impróprias

Exercício 37 Decida quais integrais impróprias abaixo são convergentes e quais são divergentes:

- | | | | |
|---|---|--|--|
| (a) $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ | (b) $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$ | (c) $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ | (d) $\int_0^\infty e^{2x} dx$ |
| (e) $\int_0^\infty e^{-2x} dx$ | (f) $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$ | (g) $\int_1^\infty \frac{1}{s^2+x^2} dx$, $s > 0$ | (h) $\int_{-\infty}^{\frac{-1}{s}} e^{-sx} dx$, $s > 0$ |
| (i) $\int_0^\infty te^{-st} dt$, $s > 0$ | (j) $\int_0^\infty e^{-st} \cos t dt$, $s > 0$ | (k) $\int_1^\infty \frac{x}{1+x^2} dx$ | (l) $\int_1^\infty \ln x dx$ |
| (m) $\int_{-\infty}^0 e^{st} s e^{nt} dt$, $s > 0$ | (n) $\int_{-\infty}^0 \frac{x^2}{1+x^2} dx$ | (o) $\int_{-\infty}^{-1} \frac{\ln x }{x} dx$ | (p) $\int_1^\infty \ln^2 x dx$. |

Exercício 38 Verifique para quais valores de α a integral $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx$ converge e para quais diverge.

Exercício 39 Determine todos os números naturais n para os quais a integral imprópria $\int_1^\infty x^n \ln x dx$ é convergente.

Exercício 40 Se f é contínua em $(-\infty, \infty)$ definimos $\int_{-\infty}^\infty f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^\infty f(x)dx$. Identifique quais integrais abaixo convergem e quais divergem.

$$(a) \int_{-\infty}^\infty xe^{-x^2} dx \quad (b) \int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+x^2} \quad (c) \int_{-\infty}^\infty e^{-|x|} dx \quad (d) \int_{-\infty}^\infty \frac{x}{1+x^2} dx.$$

Exercício 41 Se f é contínua em $(x_0, b]$ então $\int_{x_0}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow x_0^+} \int_a^b f(x)dx$. De modo análogo, se f é contínua em $[a, x_0)$ então $\int_a^{x_0} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow x_0^-} \int_a^b f(x)dx$. No caso do limite existir dizemos que a integral converge. Com estas definições verifique se as integrais abaixo convergem ou não:

$$(a) \int_0^1 \frac{1}{x} dx \quad (b) \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx \quad (c) \int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}} \quad (d) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(e) \int_0^1 \frac{dx}{x^3 + 2x^2 + x} \quad (f) \int_0^1 \frac{dx}{x^3 + x^2}.$$

Exercício 42 Teste a convergência das integrais abaixo:

$$(a) \int_3^\infty e^{-2x} dx \quad (b) \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)^3} \quad (c) \int_8^\infty x^{-4/3} dx \quad (d) \int_0^\infty \operatorname{sen} x dx$$

$$(e) \int_1^\infty \frac{1}{x^2} \operatorname{sen} \frac{1}{x} dx \quad (f) \int_e^\infty \frac{dx}{x \ln x} \quad (g) \int_e^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^2} dx \quad (h) \int_1^\infty e^{-x} \cos x dx$$

$$(i) \int_0^2 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx \quad (j) \int_0^\infty |x| \cos x^2 dx \quad (k) \int_0^\infty e^{-x} \cos x dx \quad (l) \int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-x^3} dx$$

$$(m) \int_0^2 \frac{1}{4-x^2} dx \quad (n) \int_0^e \ln x dx \quad (o) \int_0^1 \frac{x^2+4x+1}{x^4-3x+2} dx \quad (p) \int_0^1 \frac{1}{(x-1)^2} dx$$

$$(q) \int_0^3 \frac{1}{2x^2-18} dx \quad (r) \int_0^\infty \operatorname{sen}(x+1) dx \quad (s) \int_0^\infty 4x^3 e^{-x^4} dx \quad (t) \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\operatorname{sen} x}} dx$$

Exercício 43 Use o critério da comparação ou comparação por limite para decidir se as integrais abaixo convergem ou divergem:

$$(a) \int_1^\infty \frac{\cos^2 x}{1+x^2} dx \quad (b) \int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx \quad (c) \int_{-\infty}^{-2} \frac{1+\cos x}{\sqrt{|x|^3}} dx \quad (d) \int_0^1 \frac{e^{-x^2} - 0.05}{x^2} dx$$

$$(e) \int_1^\infty \frac{x}{1+3x-x^7+x^{10}} dx \quad (f) \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{x^4+3e^{-x}} dx \quad (g) \int_2^\infty \frac{x^3-3x-1}{\sqrt{|x|^7}} dx \quad (h) \int_0^\infty \frac{xe^{-x^2}}{\cos x+2} dx.$$

SMA0354 - Calculo II
Lista 1 de exercícios

Integração

*Os exercícios a seguir são do livro THOMAS, G.B. Cálculo, V. I, 12^a edição.
Pearson, 2013.*

No site <https://www.integral-calculator.com/> você pode calcular integrais, ver passo a passo as resoluções, ver os gráficos do integrando, da integral definida e da região da integral definida e comparar seu resultado com o resultado do site.

Integração (Capítulo 5 do livro)

Exercícios 5.3: 2, 10(b), 10(e), 14(a), 21
Exercícios 5.4: 4, 14, 25, 28, 30, 41, 51, 59, 63, 73, 78, 87
Exercícios 5.5: 5, 6, 10, 19, 33, 49, 51, 52, 56, 72, 77, 79
Exercícios 5.6: 3(a), 29, 46, 50, 57, 59, 66, 80, 87, 95, 97, 113, 121

Aplicações das integrais definidas (Capítulo 6)

Exercícios 6.1: 5, 8, 10, 14, 16, 18, 28, 31, 34, 37, 43, 49, 52, 62
Exercícios 6.2: 4, 8, 13, 18, 24, 34, 40
Exercícios 6.3: 3, 15, 22, 33
Exercícios 6.4: 3, 9, 12, 20, 31

Funções transcendentes e integrais (Capítulo 7)

Exercícios 7.1: 4, 11, 33, 48

Técnicas de integração (Capítulo 8)

Exercícios 8.1: 3, 12, 16, 20, 24, 33, 39, 45, 49, 53
Exercícios 8.2: 4, 7, 12, 22, 25, 34, 45, 50, 51
Exercícios 8.3: 1, 4, 6, 9, 17, 29, 37
Exercícios 8.4: 1, 4, 7, 11, 14, 20, 23, 33, 45, 55
Exercícios 8.7: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 48, 50, 52, 64