

# Notas de Aula

Leandro F. Aurichi <sup>1</sup>

20 de maio de 2015

<sup>1</sup>Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - USP



# Sumário

<b>1</b>	<b>Espaços topológicos</b>	<b>5</b>
1.1	Definições básicas . . . . .	5
	Alongamentos . . . . .	13
	Exercícios . . . . .	14
1.2	Bases . . . . .	16
	Alongamentos . . . . .	18
	Exercícios . . . . .	18
1.3	Axiomas de Separação . . . . .	19
	Alongamentos . . . . .	24
	Exercícios . . . . .	25
1.4	Axiomas de Enumerabilidade . . . . .	26
	Alongamentos . . . . .	30
	Exercícios . . . . .	31
<b>2</b>	<b>Funções</b>	<b>33</b>
2.1	Funções contínuas . . . . .	33
	Alongamentos . . . . .	37
	Exercícios . . . . .	38
2.2	Lema de Urysohn . . . . .	39
	Alongamentos . . . . .	43
	Exercícios . . . . .	43
2.3	Extensões de funções . . . . .	43
	Alongamentos . . . . .	47
	Exercícios . . . . .	48
2.4	Homeomorfismos . . . . .	48
	Alongamentos . . . . .	51
	Exercícios . . . . .	52

<b>3</b>	<b>Produto</b>	<b>53</b>
3.1	Definição e conceitos básicos . . . . .	53
	Alongamentos . . . . .	56
	Exercícios . . . . .	56
	Exercícios extras . . . . .	57
3.2	Algumas propriedades sobre produtos . . . . .	58
	Alongamentos . . . . .	61
	Exercícios . . . . .	62
3.3	Exercícios extras . . . . .	62
<b>4</b>	<b>Compactos</b>	<b>65</b>
4.1	Definição e propriedades básicas . . . . .	65
	Alongamentos . . . . .	68
	Exercícios . . . . .	69
4.2	Teorema de Tychonoff . . . . .	70
	Alongamentos . . . . .	73
	Exercícios . . . . .	73
4.3	Pontos de acumulação . . . . .	73
	Exercícios . . . . .	76
<b>5</b>	<b>Conexos</b>	<b>77</b>
5.1	Definição e propriedades básicas . . . . .	77
	Alongamentos . . . . .	80
	Exercícios . . . . .	80
5.2	Componentes e conexidade por caminhos . . . . .	81
	Alongamentos . . . . .	83
	Exercícios . . . . .	83
	<b>Índices</b>	<b>93</b>
	Notação . . . . .	93
	Índice Remissivo . . . . .	94

# Capítulo 1

## Espaços topológicos

### 1.1 Definições básicas

Um espaço topológico é um espaço dotado de uma noção de proximidade. Uma maneira de dar uma noção de proximidade é de modo quantitativo, como no caso de espaços métricos:

**Definição 1.1.1.** Seja  $X$  um conjunto. Dizemos que  $(X, d)$  é um **espaço métrico**, se  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função que satisfaz:

- (a)  $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$  e  $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ ;
- (b)  $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$ ;
- (c)  $\forall x, y, z \in X, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ .

Desta maneira, temos que uma maneira de medir o quanto um ponto está próximo do outro - simplesmente vemos o valor de  $d$  neste dois pontos. Um ponto está mais próximo de outro o quanto menor for o valor de  $d$  calculado nestes dois pontos.


**Exemplo 1.1.2.** Uma métrica sobre o conjunto dos reais  $\mathbb{R}$  é a função  $d(x, y) = |x - y|$ . Esta é a métrica usual sobre  $\mathbb{R}$ .

Para muitos casos, essa noção de proximidade é suficiente. Mas ela não cobre uma gama grande (e importante) de noções em matemática.

O seguinte exemplo é um caso simples onde o conceito não é aplicável: considere um rio com uma correnteza razoavelmente forte. Para simplificar, pensemos que esta correnteza anda para a direita e seja tão forte que não seja possível andar rio acima (ou seja, andar para esquerda). Podemos

Para espaços de funções em geral não é possível definir métricas.

representar este rio usando a reta real, mas precisamos de uma noção de proximidade diferente da usual: ao tomarmos dois pontos  $x, y$  com  $x < y$  queremos que  $y$  esteja perto de  $x$  mas não que  $x$  esteja perto de  $y$  (pois a correnteza não permite sair de  $y$  e chegar em  $x$ ). Note que isso não é possível ao usar uma métrica, uma vez que teríamos  $d(x, y) = d(y, x)$ .



Veja também o Exercício 1.1.54.

Uma maneira de contornar isso é simplesmente abandonar o conceito quantitativo de proximidade dado pela métrica e usarmos um conceito qualitativo. Para isso, vamos precisar de um conceito diferente:

**Definição 1.1.3.** Seja  $X$  um conjunto. Dizemos que uma família não vazia  $\mathcal{F}$  de subconjuntos de  $X$  é um **filtro** sobre  $X$  se:

- (a)  $\emptyset \notin \mathcal{F}$ ;
- (b) se  $A, B \in \mathcal{F}$ , então  $A \cap B \in \mathcal{F}$ ;
- (c) se  $A \in \mathcal{F}$  e  $A \subset B$ , então  $B \in \mathcal{F}$ .


Agora, em vez de usarmos uma função distância, “atribuímos” a cada ponto um filtro:

Esta não será a definição “oficial” de vizinhança que teremos ao longo do texto. Mas a relação entre as duas é explicitada nos Alongamentos ?? e 1.1.42.

**Definição 1.1.4.** Seja  $X$  um conjunto e  $x \in X$ . Dizemos que uma coleção  $\mathcal{V}$  de subconjuntos de  $X$  é um **sistema de vizinhanças** para  $x$  se  $\mathcal{V}$  é um filtro sobre  $X$  e cada elemento  $V \in \mathcal{V}$  é tal que  $x \in V$ . Chamamos cada  $V \in \mathcal{V}$  de **vizinhança** de  $x$ .

A intuição por trás desta definição é que cada elemento de  $\mathcal{V}$  representa uma coleção de pontos “próximos” de  $x$ . Você pode pensar que um ponto  $y$  fixado está mais próximo de  $x$  quanto maior for o conjunto

$$\{V \in \mathcal{V} : y \in V\}$$



Desta maneira, na situação representada pela figura, o ponto  $y$  está mais próximo de  $x$  que o ponto  $z$  está.

O próximo exemplo dá uma maneira de traduzirmos para a ideia de vizinhanças o conceito de proximidade dado pela métrica usual em  $\mathbb{R}$ .

**Exemplo 1.1.5.** Fixado  $x \in \mathbb{R}$ , temos que  $\mathcal{V} = \{V : \text{existem } a < x < b \text{ tais que } ]a, b[ \subset V\}$  é um sistema de vizinhanças para  $x$ .

Ao mudarmos ele ligeiramente, obtemos a ideia do exemplo do rio:

**Exemplo 1.1.6.** Fixado  $x \in \mathbb{R}$ , temos que  $\mathcal{V} = \{V : \text{existe } a > x \text{ tal que } ]x, a[ \subset V\}$  é um sistema de vizinhanças de  $x$ . Ao conjunto dos reais munido com tal conceito de vizinhanças damos o nome de **reta de Sorgenfrey**.

Para tentarmos ver que algo da nossa intuição está sendo capturado neste exemplo, vamos analisar um caso específico. Considere as vizinhanças de 0 como definidas acima. Note que números positivos estão muito mais próximos de 0 do que os números negativos. Note também que isso não ocorre no caso mais simétrico do exemplo anterior.

Com todo esse material, podemos finalmente definir um espaço topológico. Intuitivamente, um espaço topológico nada mais é que um conjunto tal que todos os pontos possuem uma medida qualitativa de proximidade:

**Definição 1.1.7.** Seja  $X$  um conjunto. Fixe, para cada  $x \in X$ ,  $\mathcal{V}_x$  um sistema de vizinhanças para  $x$ . Chamamos de **espaço topológico** o conjunto  $X$  com tal família fixada de sistemas de vizinhanças.

Sim, parece estranho agora que isso seja realmente uma tradução. Mas veremos isso mais formalmente no Alongamento 1.1.43.

Veja a definição “definitiva” em 1.1.12.

Esta não é a definição que iremos trabalhar. Optamos por apresentar esta versão por entendermos que a intuição por trás dela é mais aparente do que na definição “definitiva”.

Um tipo bastante importante de vizinhança são os abertos, que nada mais são do que conjuntos que são vizinhanças de todos os seus pontos:

**Definição 1.1.8.** Seja  $X$  um espaço topológico. Dizemos que  $A \subset X$  é um **aberto** se para todo  $a \in A$ , temos que  $A$  é vizinhança de  $a$ .

Vejamos alguns exemplos:

**Exemplo 1.1.9.** Se considerarmos  $\mathbb{R}$  com a topologia usual (como no Exemplo 1.1.5) e  $a < b$ , temos que um intervalo  $]a, b[$  é aberto. De fato, dado qualquer  $x \in ]a, b[$ , o próprio conjunto  $]a, b[$  atesta que  $]a, b[$  é uma vizinhança de  $x$ . Por outro lado, o conjunto  $[a, b[$  não é aberto pois  $[a, b[$  não é vizinhança de  $a$ .

**Exemplo 1.1.10.** Se considerarmos  $\mathbb{R}$  com a topologia da reta de Sorgenfrey (como no Exemplo 1.1.6 e  $a < b$ , temos que  $]a, b[$  é aberto, pois, para cada  $x \in ]a, b[$ , temos que  $[x, b[$  atesta que  $]a, b[$  é uma vizinhança de  $x$ . De maneira análoga, podemos mostrar que  $[a, b[$  também é aberto.

Os abertos tem algumas propriedades a se destacar:

**Proposição 1.1.11.** *Seja  $X$  um espaço topológico. Temos:*

- (a)  $\emptyset$  e  $X$  são abertos;
- (b) se  $A$  e  $B$  são abertos, então  $A \cap B$  também é;
- (c) se  $\mathcal{A}$  é uma família de abertos, então  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$  é um aberto.

*Demonstração.* Veja o Alongamento 1.1.40. □

Essas propriedades da última proposição na verdade motivam a definição usual de espaço topológico:

Esta é a definição oficial para espaços topológicos.  $\wp(X)$  é a coleção de todos os subconjuntos de  $X$ .

**Definição 1.1.12.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é um **espaço topológico** se  $X$  é um conjunto e  $\tau \subset \wp(X)$  é uma família que satisfaz:

- (a)  $X, \emptyset \in \tau$ ;
- (b) se  $A, B \in \tau$ , então  $A \cap B \in \tau$ ;
- (c) se  $\mathcal{A} \subset \tau$ , então  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \in \tau$ .



Cada elemento de  $\tau$  é chamado de **aberto** e a própria família  $\tau$  é chamada de **topologia**.

**Exemplo 1.1.13.** Seja  $X$  um conjunto qualquer. Então  $\tau = \{\emptyset, X\}$  é uma topologia sobre  $X$  (chamada **topologia caótica**).

**Exemplo 1.1.14.** Seja  $X$  um conjunto qualquer. Então  $\tau = \wp(X)$  é uma topologia sobre  $X$  (chamada **topologia discreta**).

**Proposição 1.1.15.** *Seja  $X$  um conjunto qualquer e  $\sigma$  uma topologia sobre  $X$ . Então,  $\sigma$  é a topologia discreta se, e somente se, para todo  $x \in X$ ,  $\{x\} \in \sigma$ .*

*Demonstração.* Se  $\sigma$  é a topologia discreta, segue da definição que para todo  $x \in X$ ,  $\{x\} \in \sigma$ .

Reciprocamente, dado um conjunto qualquer  $A \subset X$ , ele pode ser escrito da forma  $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ . Logo, pela definição de topologia,  $A \in \sigma$  e, portanto,  $\sigma$  é a topologia discreta.  $\square$

**Exemplo 1.1.16.** O conjunto  $\mathbb{R}$  é um espaço topológico, com a topologia  $\tau = \{A \subset \mathbb{R} : \forall x \in A, \exists \varepsilon > 0, ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[ \in A\}$ . Esta é chamada de **topologia usual em  $\mathbb{R}$** .

Veja o Alongamento 1.1.43 para notar que diversas maneiras definir a topologia nos reais chegam ao mesmo lugar.

**Exemplo 1.1.17.** Seja  $X$  um conjunto qualquer. Considere  $\tau = \{A \subset X : X \setminus A \text{ é finito}\} \cup \{\emptyset\}$ . Temos que  $\tau$  é uma topologia sobre  $X$  (chamada **topologia cofinita** - veja também o Exercício 1.1.52).

De fato,  $X, \emptyset \in \tau$ . Seja  $\mathcal{A}$  uma família de elementos de  $\tau$ . Temos que

$$X \setminus \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} (X \setminus A)$$

Note que o lado direito da equação é finito pois é interseção de conjuntos finitos. Logo,  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \in \tau$ . Agora, sejam  $A_1, A_2 \in \tau$ . Note que

$$X \setminus (A_1 \cap A_2) = (X \setminus A_1) \cup (X \setminus A_2)$$

Novamente o lado direito é finito, pois é união finita de conjuntos finitos. Portanto,  $A_1 \cap A_2 \in \tau$  e  $\tau$  é uma topologia sobre  $X$ .

Também podemos definir um espaço “menor” que um já fixado:

**Definição 1.1.18.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico e seja  $Y \subset X$ . A **topologia de subespaço** sobre  $Y$  induzida por  $(X, \tau)$  é dada por  $\tau_Y = \{A \cap Y : A \in \tau\}$ . Veja Alongamento 1.1.45.

A menos de menção contrária, sempre que tomarmos  $Y \subset X$ , onde  $(X, \tau)$  é um espaço topológico,  $Y$  será considerado com a topologia de subespaço.

Com uma métrica, é fácil definir uma topologia:

**Proposição 1.1.19.** *Seja  $(X, d)$  um espaço métrico. Então,  $\tau = \{A \subset X : \forall x \in A, \exists r > 0, B_r(x) \subset A\}$ , onde  $B_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$ , é uma topologia sobre  $X$ , chamada **topologia induzida pela métrica  $d$** .*

*Demonstração.* Note que  $X \in \tau$  trivialmente e que  $\emptyset \in \tau$  por vacuidade. Agora, sejam  $A_1, A_2 \in \tau$ . Se  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ , nada há a provar. Caso contrário, seja  $x \in A_1 \cap A_2$ . Sejam  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$  tais que  $B_{\varepsilon_1}(x) \subset A_1$  e  $B_{\varepsilon_2}(x) \subset A_2$ . Seja  $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ . Note que  $B_\varepsilon(x) \subset A_1 \cap A_2$ . Finalmente, seja  $\mathcal{A} \subset \tau$ . Novamente, podemos supor que  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \neq \emptyset$  pois caso contrário nada há a provar. Seja  $x \in \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ . Seja  $A \in \mathcal{A}$  tal que  $x \in A$ . Seja  $\varepsilon > 0$  tal que  $B_\varepsilon(x) \subset A$ . Note que  $B_\varepsilon(x) \subset \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$  e, portanto,  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \in \tau$ .  $\square$

Agora podemos apresentar a ideia de vizinhança, se começamos com o conceito de abertos:

Esta é a definição oficial de vizinhança. A relação entre as duas definições está explicitada nos Alogamentos 1.1.42 e 1.1.41.

**Definição 1.1.20.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $x \in X$ . Dizemos que  $V$  é uma **vizinhança** de  $x$  se existe  $A$  aberto tal que  $x \in A \subset V$ .

Um importante conceito é o de conjunto fechado:

**Definição 1.1.21.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Dizemos que  $F \subset X$  é um **conjunto fechado** se  $X \setminus F$  é aberto.

**Exemplo 1.1.22.** Em qualquer espaço topológico  $(X, \tau)$ ,  $X$  e  $\emptyset$  são fechados, pois seus complementares são abertos (em particular,  $X$  e  $\emptyset$  são abertos e fechados).

**Exemplo 1.1.23.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $[0, 1]$  é fechado já que  $\mathbb{R} \setminus [0, 1] = ]-\infty, 0[ \cup ]1, +\infty[$ .

**Exemplo 1.1.24.** Na topologia discreta, qualquer conjunto é fechado. Para isso, basta notar que o complementar de qualquer conjunto é ainda um membro de  $\wp(X)$  e, portanto, é aberto.

**Exemplo 1.1.25.** Na reta de Sorgenfrey,  $[a, b[$  é fechado, onde  $a < b$ . Vamos mostrar que  $\mathbb{R} \setminus [a, b[$  é aberto. Se  $x \in \mathbb{R} \setminus [a, b[$ , então há dois casos a considerar:

- $x \geq b$ : basta tomar o aberto  $[x, x + 1[$ , cuja interseção com  $[a, b[$  é vazia;

- $x < a$ : podemos considerar o aberto  $[x, a[$ , que também está contido no complementar de  $[a, b[$ .

Portanto, o complementar de  $[a, b[$  é aberto, como queríamos.

Algo muito comum de se fazer é tomar o menor fechado contendo um determinado conjunto:

**Definição 1.1.26.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Definimos  $\overline{A} = \bigcap \{F \subset X : F \text{ é fechado e } A \subset F\}$  (**fecho** de  $A$ , também denotado por  $\text{Cl}(A)$ ).

Definimos  $\overset{\circ}{A} = \bigcup \{V \subset X : V \text{ é aberto e } V \subset A\}$  (**interior** de  $A$ , também denotado por  $\text{Int}(A)$ ).

**Proposição 1.1.27.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Então  $\overline{A}$  é fechado e  $\overset{\circ}{A}$  é aberto.

*Demonstração.* Decorre diretamente da definição e das propriedades de conjuntos abertos e fechados.  $\square$

Pensando que os abertos que contém um ponto são as possíveis noções de “perto do ponto”, podemos definir a noção de um ponto estar perto de um conjunto se toda vez que olhamos para “perto do ponto”, interceptamos o conjunto:

**Definição 1.1.28.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Dizemos que  $x \in X$  é **ponto aderente** a  $A$  se para todo aberto  $V$  tal que  $x \in V$  valer  $V \cap A \neq \emptyset$ .

Note que esta definição difere da definição que daremos para ponto de acumulação.

Vamos mostrar que o fecho de um conjunto basicamente é a coleção de todos os pontos próximos do conjunto:

**Proposição 1.1.29.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Então  $\overline{A} = \{x \in X : x \text{ é ponto aderente de } A\}$ .

*Demonstração.* Chame de  $D$  o conjunto dos pontos aderentes a  $A$ . Vamos provar que  $\overline{A} \subset D$ . Seja  $x \in \overline{A}$ . Seja  $V$  aberto tal que  $x \in V$  e suponha  $V \cap A = \emptyset$ . Logo,  $A \subset X \setminus V$  que é fechado. Assim, pela definição de  $\overline{A}$ , segue que  $\overline{A} \subset X \setminus V$ , contradição com o fato que  $x \in \overline{A}$  e  $x \in V$ .

Provemos que  $D \subset \overline{A}$ . Seja  $x \in D$  e suponha  $x \notin \overline{A}$ . Logo,  $x \in X \setminus \overline{A}$  que é aberto. Como  $x \in D$ , temos que  $(X \setminus \overline{A}) \cap A \neq \emptyset$ . Contradição, pois  $A \subset \overline{A}$ .  $\square$

**Proposição 1.1.30.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $A, B \subset X$ . Temos

Vale um resultado análogo para o interior de um conjunto  $A$ . Em particular,  $A$  é aberto se, e somente se,  $\overset{\circ}{A} = A$  (ver Alongamento 1.1.49).

(a) Se  $A \subset B$ , então  $\overline{A} \subset \overline{B}$ ;

(b)  $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$ ;

(c)  $\overline{A} = A$  se, e somente se,  $A$  é fechado.

*Demonstração.* Dado  $x \in \overline{A}$ , segue que  $U \cap A \neq \emptyset$  para todo aberto  $U$  que contém  $x$ . Como  $A \subset B$ , segue em particular que  $U \cap B \neq \emptyset$ . Isto prova (a).

Provemos (c). Naturalmente se  $\overline{A} = A$ , obtemos que  $A$  é fechado, pois seu fecho é fechado. Reciprocamente, se  $A$  é fechado, segue que  $A = \bigcap \{F \subset X : F \text{ é fechado e } A \subset F\} = \overline{A}$ . O item (b) segue então diretamente de (c), por  $\overline{A}$  ser fechado.  $\square$

**Exemplo 1.1.31.** Considere um conjunto  $X$  com a topologia discreta. Como todo subconjunto  $A$  de  $X$  é fechado, segue que  $\overline{A} = A$  (e também que  $\overset{\circ}{A} = A$ ).

**Exemplo 1.1.32.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $\overline{[a, b[} = [a, b]$ . De fato,  $b$  é o único ponto fora de  $[a, b[$  que é aderente a  $[a, b[$ .

**Exemplo 1.1.33.** Na reta de Sorgenfrey,  $\overline{[a, b[} = [a, b]$ . Para isso, basta lembrar que  $[a, b[$  é fechado.

**Exemplo 1.1.34.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$  e  $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$ . Ambas as igualdades se devem ao fato de que dado qualquer ponto  $q \in \mathbb{Q}$  e  $\varepsilon > 0$ ,  $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$  contém pontos de  $\mathbb{Q}$  e de  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ . O mesmo vale na reta de Sorgenfrey.

Algumas vezes, um ponto pode estar próximo tanto de um conjunto, como de seu complementar:

**Definição 1.1.35.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Dizemos que  $x \in X$  é um **ponto de fronteira** de  $A$  se para todo  $V \subset X$  aberto tal que  $x \in V$ , temos  $V \cap A \neq \emptyset$  e  $V \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ .

**Notação 1.1.36.**  $\partial A = \{x \in X : x \text{ é ponto de fronteira de } A\}$ .

**Exemplo 1.1.37.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $\partial[a, b[ = \{a, b\}$ . Enquanto que na reta de Sorgenfrey temos que  $\partial[a, b[ = \emptyset$ .

**Observação 1.1.38.** A igualdade acima vale de modo geral. Se  $A$  é um subconjunto aberto e fechado de um espaço topológico  $(X, \tau)$ , então  $\partial A = \emptyset$ .

**Exemplo 1.1.39.** Em  $\mathbb{R}$  (ou na reta de Sorgenfrey),  $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ .

## Alongamentos

**Alongamento 1.1.40.** Mostre a Proposição 1.1.11.

**Alongamento 1.1.41.** Mostre que, se começamos com abertos, definimos vizinhanças e depois abertos novamente (usando essas vizinhanças), chegamos à mesma topologia.

**Alongamento 1.1.42.** Seja  $X$  um conjunto e fixe  $\mathcal{F}_x$  sistema de vizinhanças para cada ponto. Defina aberto como fizemos a partir destas vizinhanças. Agora, para cada ponto  $x$ , seja  $\mathcal{V}_x$  a coleção de vizinhanças como definimos a partir dos abertos.

- (a) Mostre que, para cada  $x \in X$ ,  $\mathcal{V}_x \subset \mathcal{F}_x$ .
- (b) Considere  $X = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{F}_0 = \{A \subset \mathbb{R} : 0 \in A \text{ e } \mathbb{R} \setminus A \text{ é enumerável}\}$  e, para cada  $x \neq 0$ ,  $\mathcal{F}_x = \{\mathbb{R}\}$ . Note que, de fato, cada  $\mathcal{F}_y$  é um filtro e, se fizermos o procedimento acima, temos que  $\mathcal{V}_0 \subsetneq \mathcal{F}_0$ .

**Alongamento 1.1.43.** Vejamos que os abertos em  $\mathbb{R}$  podem ser obtidos de várias maneiras. Mostre que os abertos são os mesmos se:

- (a) fizermos como no Exemplo 1.1.16;
- (b) usamos as vizinhanças como em 1.1.5
- (c) usamos a métrica de 1.1.2 e depois a Proposição 1.1.19.

**Alongamento 1.1.44.** Mostre que todo aberto usual nos reais é um aberto na reta de Sorgenfrey.

**Alongamento 1.1.45.** Mostre que, de fato, a topologia de subespaço é uma topologia.

**Alongamento 1.1.46.** Considere  $[0, 1]$  com a topologia de subespaço de  $\mathbb{R}$ . Mostre que  $[0, \frac{1}{2}[$  é aberto em  $[0, 1]$  mas não é aberto em  $\mathbb{R}$ .

**Alongamento 1.1.47.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Mostre que são verdadeiras:

- (a)  $X, \emptyset$  são fechados;
- (b) Se  $F, G \subset X$  são fechados, então  $F \cup G$  é fechado;
- (c) Se  $\mathcal{F}$  é uma família não vazia de fechados, então  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$  é um fechado.

**Alongamento 1.1.48.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Dizemos que  $x \in X$  é **ponto interior** de  $A$  se existe  $V$  aberto tal que  $x \in V \subset A$ . Mostre que  $\overset{\circ}{A} = \{x \in X : x \text{ é ponto interior de } A\}$ .

**Alongamento 1.1.49.** Mostre o análogo à Proposição 1.1.30 para o interior.

**Alongamento 1.1.50.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $A \subset X$ . Mostre as seguintes afirmações:

(a)  $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$

(b)  $\overset{\circ}{A} \cap \partial A = \emptyset$

(c)  $\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$

(d)  $\overline{A} = A \cup \partial A$

**Alongamento 1.1.51.** Mostre que a fronteira de um conjunto sempre é fechada.

### Exercícios

**Exercício 1.1.52.** Na definição da topologia cofinita (Exemplo 1.1.17), poderíamos pedir, em vez que os abertos tivessem complementar finito, que os abertos simplesmente fossem infinitos?

**Exercício 1.1.53.** Dizemos que duas métricas sobre um mesmo espaço  $X$  são **métricas equivalentes** se elas induzem a mesma topologia. Mostre que se  $(X, d)$  é um espaço métrico qualquer, então existe uma outra métrica  $d'$  sobre  $X$  equivalente a  $d$  e que é limitada (isto é, existe  $L > 0$  tal que  $d'(x, y) \leq L$  para todo  $x, y \in X$ ).

**Exercício 1.1.54.** Seja  $X$  um conjunto. Chamamos de **assimétrica** (na maioria dos livros, **quasi-métrica**), uma função  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  satisfazendo:

(i)  $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$  e  $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ ;

(ii)  $\forall x, y, z \in X, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ .

(a) Mostre que  $\tau = \{A \subset X : \forall x \in A, \exists r > 0, B_r(x) \subset A\}$ , onde  $B_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$  é uma topologia sobre  $X$  (como fizemos com uma métrica);

(b) Considere seguinte função sobre  $\mathbb{R}$ :

$$d(x, y) = \begin{cases} y - x & \text{se } y \geq x \\ 1 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

para  $x, y \in \mathbb{R}$ . Mostre que  $d$  é uma assimétrica sobre  $\mathbb{R}$ . Mostre que a topologia induzida por ela é a mesma da reta de Sorgenfrey.

**Exercício 1.1.55.** Sejam  $(X, d)$  um espaço métrico e  $Y \subset X$ . Note que a restrição de  $d$  a  $Y$  induz uma métrica sobre  $Y$ . Mostre que a topologia induzida por tal métrica e a topologia induzida de subespaço de  $X$  coincidem.

**Exercício 1.1.56.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $Y \subset X$  subespaço. Mostre que  $F \subset Y$  é fechado em  $Y$  se, e somente se, existe  $F' \subset X$  fechado em  $X$  tal que  $F = F' \cap Y$ .

**Exercício 1.1.57.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $Y \subset X$  subespaço fechado. Mostre que  $F \subset Y$  é fechado em  $Y$  se, e somente se,  $F$  é fechado em  $X$ .

**Exercício 1.1.58.** Encontre o análogo do Exercício 1.1.57 para abertos.

**Exercício 1.1.59.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico. Dados  $A \subset X$  não vazio e  $x \in X$ , definimos  $d(x, A)$  (**distância de ponto a conjunto**) como  $d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$ . Mostre que  $x \in \overline{A}$  se, e somente se,  $d(x, A) = 0$ .

**Exercício 1.1.60.** Considere  $\tau = \{A \subset \mathbb{Z} : \text{para todo } a \in A, \text{ existe } b \in \mathbb{N}_{>0} \text{ tal que } \{a + bz : z \in \mathbb{Z}\} \subset A\}$ .

(a) Mostre que  $\tau$  é uma topologia sobre  $\mathbb{Z}$ .

(b) Mostre que não existe um aberto não vazio que seja finito.

(c) Mostre que, dados  $a \in \mathbb{Z}$  e  $b \in \mathbb{N}_{>0}$ , o conjunto  $S(a, b) = \{a + bz : z \in \mathbb{Z}\}$  é aberto e fechado.

(d) Mostre que  $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \text{ é primo}} S(0, p)$ .

(e) Mostre que existem infinitos primos.




Figura 1.1: O desenho básico de uma base

## 1.2 Bases

Uma base nada mais é que uma subfamília de abertos que é suficiente para recuperarmos todos os abertos por meio de uniões:

**Definição 1.2.1.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Dizemos que  $\mathcal{B} \subset \tau$  é uma **base** para  $(X, \tau)$  se para todo aberto não vazio  $A \in \tau$ , existe uma família  $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$  de elementos da base tal que  $A = \bigcup_{B \in \mathcal{A}} B$ .

Uma importante caracterização para bases é o seguinte resultado:

Veja a figura 1.1.

**Proposição 1.2.2.** Uma família  $\mathcal{B}$  de subconjuntos de  $\tau$  é uma base para  $(X, \tau)$  se, e somente se, para todo aberto não vazio  $A \in \tau$  e todo  $x \in A$ , existe  $B \in \mathcal{B}$  de forma que  $x \in B \subset A$ .

*Demonstração.* Suponha que  $\mathcal{B}$  seja uma família como no enunciado e seja  $A \in \tau$ . Para cada elemento  $x \in A$ , existe um conjunto  $B_x \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B_x \subset A$ . Segue, então, que  $A = \bigcup_{x \in A} B_x$ .

Reciprocamente, sejam  $x \in X$  e  $A \in \tau$ . Como podemos escrever  $A = \bigcup \mathcal{B}'$  com  $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ , tomamos  $B \in \mathcal{B}'$  tal que  $x \in B$ . Além disso, temos que  $B \subset A$ .  $\square$

**Exemplo 1.2.3.**  $\mathcal{B} = \{]a, b[ : a, b \in \mathbb{Q}\}$  é uma base para a topologia usual de  $\mathbb{R}$ .



De fato, seja  $x \in \mathbb{R}$  e  $A \in \tau$ . Pela definição de  $\tau$ , existe  $\varepsilon > 0$  tal que tal que  $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[ \subset A$ . Note que existem  $a, b \in \mathbb{Q}$  tais que

$$x - \varepsilon < a < x < b < x + \varepsilon$$

Logo,  $B = ]a, b[ \in \mathcal{B}$  e  $x \in B \subset A$ .

**Exemplo 1.2.4.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico qualquer. Então,  $\mathcal{B} = \{B_{\frac{1}{n}}(x) : x \in X, n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é uma base para  $(X, d)$  (ver Alongamento 1.2.12).

**Exemplo 1.2.5.** Seja  $X$  um conjunto qualquer.  $\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}$  é uma base para a topologia discreta sobre  $X$  (ver Alongamento 1.2.12).

**Exemplo 1.2.6.** A família  $\mathcal{B} = \{[x, y[ : x < y\}$  é uma base para a reta de Sorgenfrey (ver Alongamento 1.2.12).

Em algum sentido, uma base é um conjunto suficiente para determinar todos os abertos. Podemos fazer o análogo para vizinhanças:

**Definição 1.2.7.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $x \in X$ . Dizemos Veja o Exercício 1.2.17 que  $\mathcal{V}$  é um **sistema fundamental de vizinhanças** de  $x$  se

- (a) Para todo  $V \in \mathcal{V}$ ,  $V$  é vizinhança de  $x$ ;
- (b) Para todo aberto  $A \subset X$  tal que  $x \in A$ , existe  $V \in \mathcal{V}$  tal que  $x \in V \subset A$ .

No caso em que os elementos de  $\mathcal{V}$  são abertos, chamamos  $\mathcal{V}$  de **base local** para  $x$ .

**Exemplo 1.2.8.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $\mathcal{V}_1 = \{]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[ : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$  (mais que isso, como todos os membros de  $\mathcal{V}_1$  são abertos,  $\mathcal{V}_1$  é uma base local de  $x$ ).

$\mathcal{V}_2 = \{[x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}] : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ .

**Exemplo 1.2.9.** Na reta de Sorgenfrey,  $\mathcal{V} = \{[x, x + \frac{1}{n}[ : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ .

**Exemplo 1.2.10.** Considere  $X$  com a topologia discreta.  $\mathcal{V}_1 = \{\{x\}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ , bem como  $\mathcal{V}_2 = \{A \subset X : x \in A\}$ .

O próximo resultado mostra como bases do espaço original se relacionam com as de um subespaço:

**Proposição 1.2.11.** *Se  $\mathcal{B}$  é uma base para  $(X, \tau)$ , então  $\mathcal{B}' = \{B \cap Y : B \in \mathcal{B}\}$  é uma base para  $Y \subset X$  com a topologia de subespaço.* Podemos fazer o análogo com sistemas fundamentais de vizinhanças.

*Demonstração.* Sejam  $A' \in \tau_Y$  e  $x \in A'$ . Pela definição de topologia de subespaço, existe  $A \in \tau$  tal que  $A' = A \cap Y$  e, assim,  $x \in A$ . Logo, pelo fato de  $\mathcal{B}$  ser base, existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B \subset A$ . Logo,  $x \in B \cap Y \subset A \cap Y$  e, portanto,  $\mathcal{B}'$  é uma base para  $(Y, \tau_Y)$ .  $\square$

### Alongamentos

**Alongamento 1.2.12.** Mostre as afirmações dos Exemplos 1.2.4, 1.2.5 e 1.2.6.

**Alongamento 1.2.13.** Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Sejam  $x \in X$  e  $V$  aberto tal que  $x \in V$ . Mostre que  $\{A \in \tau : x \in A \subset V\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ .

**Alongamento 1.2.14.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico,  $x \in X$ ,  $\mathcal{V}$  sistema fundamental de vizinhanças de  $x$  e  $W \subset X$  vizinhança de  $x$ . Mostre que  $\{V \cap W : V \in \mathcal{V}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ .

### Exercícios

**Exercício 1.2.15.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico,  $A \subset X$ ,  $x \in X$  e  $\mathcal{V}$  um sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ . Mostre que  $x \in \overline{A}$  se, e somente se, para todo  $V \in \mathcal{V}$ ,  $V \cap A \neq \emptyset$ .

**Exercício 1.2.16.** Seja  $X$  um conjunto e sejam  $\tau$  e  $\sigma$  topologias sobre  $X$ . Sejam  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$  bases para  $(X, \tau)$  e  $(X, \sigma)$  respectivamente.

- (a) Suponha que para todo  $x \in X$  e todo  $B \in \mathcal{B}$  e  $C \in \mathcal{C}$  tais que  $x \in B$  e  $x \in C$  existam  $C' \in \mathcal{C}$  e  $B' \in \mathcal{B}$  tais que  $x \in C' \subset B$  e  $x \in B' \subset C$ . Mostre que  $\tau = \sigma$ .
- (b) Suponha que para todo  $x \in X$  e todo  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$  exista  $C \in \mathcal{C}$  tal que  $x \in C \subset B$ . É verdade que  $\sigma = \tau$ ? Se não for verdade, vale alguma das inclusões?

**Exercício 1.2.17.** Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Para cada  $x \in X$ , seja  $\mathcal{V}_x$  um sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ . Mostre que, dado  $A \subset X$ ,  $A$  é aberto se, e somente se, para todo  $x \in A$  existe  $V \in \mathcal{V}_x$  tal que  $x \in V \subset A$ .

**Exercício 1.2.18.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é um **espaço zero-dimensional** se ele possui uma base formada por abertos fechados.

- (a) Mostre que a reta de Sorgenfrey é zero-dimensional.

- (b) Mostre que tanto  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  quanto  $\mathbb{Q}$  são zero-dimensionais (considerados com a topologia de subespaço).
- (c) Mostre que se  $Y$  é subespaço de um espaço zero-dimensional, então  $Y$  também é zero-dimensional.

**Exercício 1.2.19.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $\mathcal{B}$  base para  $(X, \tau)$ . Mostre que  $\tau$  é a menor topologia que contém  $\mathcal{B}$ . Isto é, mostre que  $\tau = \bigcap_{\sigma \in T} \sigma$  onde  $T = \{\sigma : \sigma \text{ é uma topologia para } X \text{ tal que } \mathcal{B} \subset \sigma\}$ .

**Exercício 1.2.20.** Dado um conjunto  $X$  e uma família  $\mathcal{B}$  de subconjuntos de  $X$ , chamamos de **topologia gerada** por  $X$  o conjunto  $[\mathcal{B}] = \bigcap_{\tau \in T} \tau$ , onde  $T = \{\tau \subset \wp(X) : \tau \text{ é topologia sobre } X \text{ e } \mathcal{B} \subset \tau\}$ .

- (a) Mostre que  $T$  definido acima é não vazio (e, portanto, podemos tomar a intersecção).
- (b) Mostre que  $[\mathcal{B}]$  é uma topologia sobre  $X$ .
- (c) Mostre que, se  $\mathcal{B}$  satisfaz:
- (i)  $\forall x \in X, \exists B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$ ;
  - (ii)  $\forall A, B \in \mathcal{B}, \forall x \in A \cap B, \exists C \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in C \subset A \cap B$ .
- então  $\mathcal{B}$  é uma base para  $(X, [\mathcal{B}])$ .

### 1.3 Axiomas de Separação

Muitas vezes, só a definição de topologia é muito simples para que possamos trabalhar. Nesta seção veremos algumas hipóteses adicionais que podemos pedir num espaço topológico. As hipóteses desta seção tem como objetivo, por exemplo, exigir que a topologia sobre o espaço seja rica o suficiente para diferenciar os pontos do espaço, ou separar os pontos entre si ou até mesmo separar fechados. Apresentaremos as propriedades em ordem de “força” (veja o Exercício 1.3.27).

Num espaço  $T_0$ , pelo menos um dos abertos da Figura 1.2 existe.

**Definição 1.3.1.** Dizemos que um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_0$  se para quaisquer  $x, y \in X$  distintos existir um aberto  $A$  tal que  $(x \in A \text{ e } y \notin A)$  ou  $(x \notin A \text{ e } y \in A)$ .

Num espaço  $T_0$ , os abertos “diferenciam” pontos, isto é, dados dois pontos distintos, existe ao menos um aberto que os distingue.




Figura 1.2: Abertos diferentes para pontos diferentes

Vejamos alguns exemplos de espaços que não são  $T_0$ . Exemplos que satisfazem tal propriedade serão dados no decorrer do texto (veja também o Exercício 1.3.24).

**Exemplo 1.3.2.** Qualquer conjunto  $X$  com mais de dois pontos, munido da topologia caótica não é  $T_0$ .

**Exemplo 1.3.3.** Seja  $X$  um conjunto qualquer com pelo menos dois elementos. Fixe  $x, y \in X$  distintos e defina  $\tau = \{A \subset X : x, y \in A \text{ ou } A = \emptyset\}$ . É fácil ver que  $(X, \tau)$  é um espaço topológico. Contudo, não existe aberto em  $X$  tal que  $x \in A$  e  $y \notin A$  ou  $y \in A$  e  $x \notin A$ . Logo  $(X, \tau)$  não é  $T_0$ .

Esse resultado deixa claro que os pontos próximos de um ponto são diferentes dos próximos a outro num espaço  $T_0$ .

**Proposição 1.3.4.** Um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_0$  se, e somente se, para quaisquer  $x, y \in X$  distintos e para quaisquer bases locais  $\mathcal{B}_x, \mathcal{B}_y$  para  $x$  e  $y$  respectivamente, tivermos que  $\mathcal{B}_x \neq \mathcal{B}_y$ .

*Demonstração.* Suponha  $(X, \tau)$   $T_0$ . Tomemos  $x, y \in X$  pontos distintos e  $\mathcal{B}_x, \mathcal{B}_y$  bases locais arbitrárias para  $x$  e  $y$  respectivamente. Por  $X$  ser  $T_0$ , existe um aberto  $A$  tal que  $x \in A$  e  $y \notin A$ , ou  $x \notin A$  e  $y \in A$ . Sem perda de generalidade, suponha o primeiro caso. Por  $\mathcal{B}_x$  ser base, existe  $B \in \mathcal{B}_x$  tal que  $x \in B \subset A$ . Como  $y \notin A$ , segue que  $y \notin B$  e, por tanto,  $B \notin \mathcal{B}_y$ , mostrando que  $\mathcal{B}_x \neq \mathcal{B}_y$ .

Reciprocamente, suponha que para quaisquer  $x, y \in X$  distintos, toda base local de  $x$  seja distinta de qualquer base local de  $y$ . Em particular,

$\mathcal{B}_x = \{A \in \tau : x \in A\}$  e  $\mathcal{B}_y = \{A \in \tau : y \in A\}$  são bases locais de  $x$  e  $y$  respectivamente. Logo,  $\mathcal{B}_x \neq \mathcal{B}_y$  pela hipótese. Assim, existe  $B \in \mathcal{B}_x$  tal que  $B \notin \mathcal{B}_y$  ou existe  $B \in \mathcal{B}_y$  tal que  $B \notin \mathcal{B}_x$ .  $\square$

Já nos espaços  $T_1$ , exigimos que ambos os abertos da Figura 1.2 existam.

**Definição 1.3.5.** Dizemos que um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_1$  se, e somente se, para quaisquer  $x, y \in X$  distintos, existir  $A$  aberto tal que  $x \in A$  e  $y \notin A$ .

Note que ser  $T_1$  é “mais forte” do que ser  $T_0$ , pois enquanto o último exige a existência de um aberto que satisfaça ao menos um dentre dois casos, ser  $T_1$  exige a existência de abertos que satisfaçam ambos os casos.

Provavelmente a caracterização mais importante de  $T_1$  é a seguinte:

**Proposição 1.3.6.**  $(X, \tau)$  é  $T_1$  se, e somente se, para todo  $x \in X$ ,  $\{x\}$  é fechado.

*Demonstração.* Suponha  $(X, \tau)$  um espaço  $T_1$ . Sejam  $x, y \in X$  tais que  $x \neq y$ . Como  $(X, \tau)$  é  $T_1$ , existe um aberto  $A$  tal que  $y \in A$  e  $x \notin A$ , isto é,  $A \cap \{x\} = \emptyset$ . Logo,  $y \notin \overline{\{x\}}$ . Assim, o único ponto que pode pertencer a  $\{x\}$  é o próprio  $x$ . Ou seja  $\overline{\{x\}} = \{x\}$ .

Reciprocamente, sejam  $x, y \in X$  distintos. Como  $\{x\}$  é fechado para qualquer  $x \in X$ , então  $X \setminus \{x\}$  é um conjunto aberto. Assim,  $X \setminus \{x\}$  é um aberto tal que  $y \in X \setminus \{x\}$  e  $x \notin X \setminus \{x\}$ .  $\square$

**Exemplo 1.3.7.** Um conjunto  $X$  com a topologia cofinita é sempre  $T_1$ . De fato, dados  $x, y \in X$  distintos, o complementar de  $\{x\}$  é um aberto que não contém  $x$  mas contém  $y$ .

Para espaços de Hausdorff, já exigimos que os abertos em volta dos pontos sejam disjuntos.

**Definição 1.3.8.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é  $T_2$  (**espaço de Hausdorff**) se para todo  $x, y \in X$  distintos, existem  $A, B$  abertos tais que  $x \in A$ ,  $y \in B$  e  $A \cap B = \emptyset$ .

Num espaço de Hausdorff, os abertos “separam” pontos.

**Exemplo 1.3.9.**  $X$  munido da topologia cofinita é  $T_1$ , mas não é  $T_2$  se  $X$  for infinito. De fato, sejam  $x, y \in X$  distintos e abertos  $A, B$  tais que  $x \in A$  e  $y \in B$ . Temos que  $A = X \setminus F_1$  e  $B = X \setminus F_2$ , com  $F_1, F_2$  finitos. Logo,  $A \cap B = X \setminus (F_1 \cup F_2)$  e, como  $X$  é infinito,  $A \cap B$  é necessariamente não vazio.

**Proposição 1.3.10.** Considere  $(X, d)$  um espaço métrico. Então tal espaço é de Hausdorff (com a topologia induzida pela métrica).




Figura 1.3: Comportamento de vizinhanças em espaços  $T_3$

*Demonstração.* Sejam  $x, y \in X$  distintos. Seja  $r = d(x, y) > 0$ . Vamos mostrar que  $B_{\frac{r}{2}}(x) \cap B_{\frac{r}{2}}(y) = \emptyset$ . Suponha que não. Seja  $a \in B_{\frac{r}{2}}(x) \cap B_{\frac{r}{2}}(y)$ . Então

$$d(x, y) \leq d(x, a) + d(a, y) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r,$$

absurdo, pois  $d(x, y) = r$ . □

Num espaço topológico regular, os abertos “separam” pontos de fechados.

**Definição 1.3.11.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é  $T_3$  se, para quaisquer  $x \in X$  e  $F \subset X$  fechado tais que  $x \notin F$  existirem  $A, B$  abertos tais que  $x \in A$ ,  $F \subset B$  e  $A \cap B = \emptyset$ . Se, além disso,  $(X, \tau)$  é  $T_1$ , dizemos que  $(X, \tau)$  é um **espaço regular**<sup>1</sup>.

O próximo resultado é provavelmente a principal caracterização de espaços  $T_3$ :

Veja a Figura 1.3.

**Proposição 1.3.12.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico.  $(X, \tau)$  é  $T_3$  se, e somente se, para todo  $x \in X$  e para todo aberto  $V$  tal que  $x \in V$ , existe um aberto  $A$  tal que  $x \in A \subset \overline{A} \subset V$ .*

*Demonstração.* Suponha  $(X, \tau)$  espaço  $T_3$ . Sejam  $x \in X$  e  $V \in \tau$  tal que  $x \in V$ . Note que  $X \setminus V$  é um fechado e  $x \notin X \setminus V$ . Então existem  $A, B$

<sup>1</sup>essa nomenclatura não é padrão - às vezes se supõe  $T_1$  para regulares, às vezes não

abertos disjuntos tais que  $x \in A$  e  $X \setminus V \subset B$ . Assim,  $A \subset X \setminus B$  que é fechado. Logo,  $\overline{A} \subset X \setminus B \subset V$ .

Reciprocamente, mostremos que  $(X, \tau)$  é  $T_3$ . Sejam  $x \in X$  e  $F \subset X$  fechado tais que  $x \notin F$ . Então  $X \setminus F$  é aberto e contém  $x$ . Logo, existe  $A$  aberto tal que  $x \in A \subset \overline{A} \subset X \setminus F$ . Note que  $x \in A$ ,  $F \subset X \setminus \overline{A}$  e  $A \cap (X \setminus \overline{A}) = \emptyset$ .  $\square$

**Corolário 1.3.13.** *Um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_3$  se, e somente se, para todo  $x \in X$  existe um sistema fundamental de vizinhanças fechadas para  $x$ .*

*Demonstração.* Veja o Alongamento 1.3.22.  $\square$

**Exemplo 1.3.14.**  $\mathbb{R}$  é regular. De fato, para cada  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\left\{ \left[ x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n} \right] : n \in \mathbb{N} \right\}$$

é um sistema fundamental de vizinhanças fechadas para  $x$ .

**Exemplo 1.3.15.** A reta de Sorgenfrey é regular (veja o Exemplo 1.2.9, e considere o Corolário 1.3.13).

Veja o Exercício 1.3.30 para um exemplo de um espaço de Hausdorff que não seja regular.

**Definição 1.3.16.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é  $T_4$  se, para quaisquer  $F, G \subset X$  fechados disjuntos, existirem  $A, B$  abertos disjuntos tais que  $F \subset A$ ,  $G \subset B$ . Se, além disso,  $(X, \tau)$  é  $T_1$ , dizemos que  $(X, \tau)$  é **espaço normal**<sup>2</sup>.

Neste e no próximo exemplo já estamos supondo claro que os espaços em questão são  $T_1$ .

Num espaço normal, os abertos separam os fechados disjuntos.

**Exemplo 1.3.17.** Vamos mostrar mais para frente que todo métrico é normal (Corolário 2.2.4).

**Exemplo 1.3.18.** A reta de Sorgenfrey é normal. Vamos provar tal afirmação. Primeiramente, note que ela é  $T_1$ .

Sejam  $F, G$  fechados disjuntos. Para cada  $a \in F$  e cada  $b \in G$ , sejam  $x(a)$  e  $y(b)$  de forma que

$$[a, x(a)[ \cap G = \emptyset \text{ e } [b, y(b)[ \cap F = \emptyset.$$

Podemos fazer isso pois os complementares de  $F$  e  $G$  são abertos. Sejam

$$A = \bigcup_{a \in F} [a, x(a)[ \text{ e } B = \bigcup_{b \in G} [b, y(b)[.$$

<sup>2</sup>novamente, tal nomenclatura não é completamente padrão. Às vezes se supõe  $T_1$ , às vezes não.

Note que  $F \subset A$  e  $G \subset B$ , os quais são abertos. Vamos mostrar que  $A \cap B = \emptyset$ . Suponha que não. Então existe  $c \in A \cap B$ . Para tanto, existem  $a \in F$  e  $b \in G$  tais que  $c \in [a, x(a)[ \cap ]b, y(b)[$ .

Caso  $a < b$ : então  $x(a) < b$ , pois  $b \notin [a, x(a)[$ , logo  $[a, x(a)[ \cap ]b, y(b)[ = \emptyset$ , absurdo. Se  $b < a$ , obtém-se uma contradição de maneira análoga. É claro que  $a = b$  não pode ocorrer por estarmos supondo  $F \cap G = \emptyset$ .

**Exemplo 1.3.19.** Veremos mais para frente que o quadrado da reta de Sorgenfrey é regular mas não é normal (Proposição ??).

Veremos que até regularidade, as propriedades desta seção são “bem comportadas” e muitas vezes a verificação de se um espaço tem ou não a propriedade é elementar. Mas com a normalidade, a situação muda. Desta forma, um tipo de resultado bastante útil é quando podemos “subir” alguma propriedade até a normalidade. O próximo resultado vai nesta direção: veremos que para um espaço enumerável ser normal basta ele ser regular. A ideia para a demonstração será usada outras vezes no decorrer do texto:

Note que na verdade estamos provando que todo espaço  $T_3$  enumerável é  $T_4$ .

**Proposição 1.3.20.** *Todo espaço enumerável e regular é normal.*

*Demonstração.* Sejam  $F$  e  $G$  fechados disjuntos. Faça  $F = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  e  $G = \{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Como o espaço é regular, para cada  $m \in \mathbb{N}$ , existe  $A_m$  aberto tal que  $x_m \in A_m$  e  $\overline{A_m} \cap G = \emptyset$  (pela Proposição 1.3.12), bem como  $B_m$  aberto tal que  $y_m \in B_m$  e  $\overline{B_m} \cap F = \emptyset$ .

Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , defina

$$A_n^* = A_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{B_k} \text{ e } B_n^* = B_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{A_k}.$$

Note que  $A_n^*$  e  $B_n^*$  são abertos (pois  $A \setminus B = A \cap (X \setminus B)$  para  $A, B \subset X$ ).

Sejam  $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^*$  e  $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n^*$ . Note que  $F \subset A$  e  $G \subset B$  (em particular, observe que  $A_n^* \cap F = A_n \cap F$ ). Vamos mostrar que  $A \cap B = \emptyset$ . Suponha que não. Então existe  $z \in A \cap B$ . Sejam  $m, n \in \mathbb{N}$  tais que  $z \in A_n^*$  e  $z \in B_m^*$ .

Vamos fazer o caso  $n \leq m$ , o outro é análogo. Então  $z \in A_n^* = A_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{B_k}$  e  $z \in B_m^* = B_m \setminus \bigcup_{k \leq m} \overline{A_k}$ . Note que, como  $m \geq n$ ,  $z \notin \bigcup_{k \leq m} \overline{A_k} \supset \overline{A_n} \supset A_n \supset A_n^*$ , contradição, pois supomos  $z \in A_n^*$ .  $\square$

## Alongamentos

**Alongamento 1.3.21.** Mostre que um espaço finito é  $T_1$  se, e somente se, tem a topologia discreta.



**Alongamento 1.3.22.** Demonstre o Corolário 1.3.13.

**Alongamento 1.3.23.** Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Mostre que  $T_4$  é equivalente à seguinte propriedade: “Para todo  $F$  fechado e todo  $V$  aberto tal que  $F \subset V$ , existe um aberto  $U$  tal que  $F \subset U \subset \bar{U} \subset V$ ”.

### Exercícios

**Exercício 1.3.24.** Dê um exemplo de um espaço  $T_0$  que não seja  $T_1$ .

**Exercício 1.3.25.**  $(X, \tau)$  é  $T_0$  se, e somente se, para quaisquer  $x, y \in X$  distintos tivermos  $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{y\}}$ .

**Exercício 1.3.26.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. São equivalentes:

- (a)  $(X, \tau)$  é  $T_1$ ;
- (b)  $\forall x \in X$ , existe  $\mathcal{A}$  uma coleção de abertos tal que  $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = \{x\}$ ;
- (c)  $\forall x \in X$  existe  $\mathcal{V}_x$  um sistema fundamental de vizinhanças para  $x$  tal que  $\bigcap_{V \in \mathcal{V}_x} V = \{x\}$ ;

**Exercício 1.3.27.** Prove a cadeia de implicações:  $(X, \tau)$  é normal  $\Rightarrow (X, \tau)$  é regular  $\Rightarrow (X, \tau)$  é  $T_2 \Rightarrow (X, \tau)$  é  $T_1 \Rightarrow (X, \tau)$  é  $T_0$ .

**Exercício 1.3.28.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $Y \subset X$  subespaço. Mostre que se  $(X, \tau)$  é  $T_i$  para  $i = 0, \dots, 3$ , então  $Y$  também é.

**Exercício 1.3.29.** Mostre que se  $Y$  é subespaço fechado de um espaço normal, então  $Y$  também é normal.

**Exercício 1.3.30.** Considere  $\mathbb{R}$  com a topologia gerada pelos conjuntos da forma

$$]a, b[ \setminus C$$

onde  $a < b \in \mathbb{Q}$  e  $C \subset \mathbb{R}$  é enumerável. Vamos chamar tal espaço de **reta esburacada**.

- (a) Mostre que isso é uma base para tal topologia;
- (b) Mostre que tal espaço é de Hausdorff;
- (c) Mostre que todo subconjunto enumerável é fechado;
- (d) Mostre que tal espaço não é regular.

**Exercício 1.3.31.** Mostre que  $\mathbb{Q}$  com a topologia induzida pela reta de Sorgenfrey é normal.

## 1.4 Axiomas de Enumerabilidade

Nesta seção vamos começar a investigar quando a existência de determinados conjuntos enumeráveis nos dão propriedades importantes sobre o espaço. Tais propriedades serão muito usadas no decorrer do texto.

Veja o Alongamento 1.4.24 para ver que um ponto ter um sistema fundamental de vizinhanças enumerável é equivalente a ter uma base local enumerável.

**Definição 1.4.1.** Dizemos que um espaço topológico  $(X, \tau)$  satisfaz o **primeiro axioma de enumerabilidade** (*1st countable*) se, para todo  $x \in X$ , existe um sistema fundamental de vizinhanças enumerável. Neste caso, também dizemos que  $(X, \tau)$  tem **bases locais enumeráveis**.

**Exemplo 1.4.2.** Todo espaço métrico  $(X, d)$  satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade. Para isso, basta notar que  $\{B_{\frac{1}{n}}(x) : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças para cada  $x \in X$ .

**Exemplo 1.4.3.** A reta de Sorgenfrey satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade, já que  $\{[x, x + \frac{1}{n}[ : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças para cada  $x \in X$ .

O primeiro axioma de enumerabilidade tem bastante em comum com o conceito de sequência convergente:

Note que esta definição permanece equivalente se trocarmos vizinhança por aberto contendo o ponto (veja o Alongamento 1.4.25).

**Definição 1.4.4.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Seja  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de pontos de  $X$ . Dizemos que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **converge** para  $x \in X$  se, para toda vizinhança  $V$  de  $x$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_0$ ,  $x_n \in V$ . Notação:  $x_n \rightarrow x$ .

**Proposição 1.4.5.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $x_n \rightarrow x$ . Então,  $x \in \overline{\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}$ .*

*Demonstração.* Seja  $V$  vizinhança de  $x$ . Seja  $n_0$  da definição de convergência. Note que  $x_{n_0} \in V \cap \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ . □

**Corolário 1.4.6.** *Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $Y \subset X$ . Sejam  $x \in X$  e  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de pontos de  $Y$ . Se  $y_n \rightarrow x$ , então  $x \in \overline{Y}$ .*

Para espaços que satisfazem o primeiro axioma de enumerabilidade, ser ponto aderente pode ser caracterizado por limite de seqüências:

A hipótese sobre as bases locais é necessária. Veja o Exemplo 1.4.9.

**Proposição 1.4.7.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico com bases locais enumeráveis. Sejam  $Y \subset X$  e  $x \in X$ . Então,  $x \in \overline{Y}$  se, e somente se, existe  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sequência de pontos de  $Y$  tal que  $y_n \rightarrow x$ .*




Figura 1.4: Aderência em termos de convergência

*Demonstração.* Um lado já está feito (vale mesmo sem a hipótese sobre as bases).

Suponha que  $x \in \bar{Y}$  e seja  $\mathcal{V} = \{V_n : n \in \mathbb{N}\}$  sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , escolha  $y_n \in \left(\bigcap_{k \leq n} V_k\right) \cap Y$ . Mostremos que  $y_n \rightarrow x$ . Seja  $V$  vizinhança de  $x$ . Como  $\mathcal{V}$  é sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $V_{n_0} \subset V$ . Seja  $n \geq n_0$ . Note que  $y_n \in \bigcap_{k \leq n} V_k \subset V_{n_0} \subset V$ .  $\square$

Espaços de Hausdorff tem a propriedade da unicidade de limites:

**Proposição 1.4.8.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico de Hausdorff. Se  $x_n \rightarrow x$  e  $x_n \rightarrow y$ , então  $x = y$ .*

*Demonstração.* Suponha, por contradição, que  $x \neq y$ . Sejam  $U$  e  $V$  abertos disjuntos tais que  $x \in U$  e  $y \in V$ . Então, existem  $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$  tais que para todo  $n \geq n_1$ ,  $x_n \in U$  e para todo  $n \geq n_2$ ,  $x_n \in V$ . Seja  $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ , segue que  $x_{n_0} \in U \cap V$ , que é uma contradição.  $\square$

**Exemplo 1.4.9.** Na reta esburacada, se uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é tal que  $x_n \rightarrow x$  para algum  $x$ , então existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $x_n = x$ . De fato, temos que  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  é fechado por ser enumerável (veja o Exercício 1.3.30). Em particular, note que  $0 \in \overline{]0, 1[}$  mas não existe sequência em  $]0, 1[$  que




Figura 1.5: A unicidade de limites de sequências

converge para 0. Com isso, temos que a reta esburacada não tem bases locais enumeráveis.

**Definição 1.4.10.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico. Dizemos que uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de pontos de  $X$  é uma **sequência de Cauchy** se, para todo  $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para  $n, m \geq n_0$ ,  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ .

**Proposição 1.4.11.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de pontos de  $X$  tal que  $x_n \rightarrow x$ . Então,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência de Cauchy.

*Demonstração.* Seja  $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ . Seja  $n_0$  tal que, para todo  $n \geq n_0$ ,  $d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$ . Assim, dados  $n, m \geq n_0$ , temos

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \varepsilon$$

□

**Definição 1.4.12.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico.  $(X, d)$  é dito **espaço métrico completo** se toda sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de Cauchy é convergente.

O segundo axioma de enumerabilidade é uma versão global do primeiro:

**Definição 1.4.13.** Dizemos que  $(X, \tau)$  satisfaz o **segundo axioma de enumerabilidade** (*2nd countable*) se admite uma base enumerável.

**Exemplo 1.4.14.** A reta real satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, já que  $\{]a, b[ : a, b \in \mathbb{Q}\}$  é uma base.

**Proposição 1.4.15.** *Se um espaço topológico  $(X, \tau)$  satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, então também satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade.*

*Demonstração.* Seja  $\mathcal{B}$  uma base para  $(X, \tau)$ . Então,  $\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$  é uma base local para  $x$ .  $\square$

**Exemplo 1.4.16.** A reta de Sorgenfrey não satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade. De fato, suponha, por contradição, que satisfaça. Seja  $\mathcal{B}$  uma base enumerável. Para cada  $x \in X$ , seja  $B_x \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B_x \subset [x, x + 1[$ . Note que se  $x \neq y$ , então  $B_x \neq B_y$ . De fato, sem perda de generalidade, suponha que  $x < y$  e note que  $x \notin B_y$ , pois  $B_y \subset [y, y + 1[$ . Logo,  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{B}$  definida por  $f(x) = B_x$  é injetora, o que é uma contradição, pois  $\mathcal{B}$  é enumerável e  $\mathbb{R}$  não.

**Definição 1.4.17.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Dizemos que  $D \subset X$  é denso em  $X$  se  $\overline{D} = X$ .

**Definição 1.4.18.** Dizemos que  $(X, \tau)$  satisfaz o **terceiro axioma de enumerabilidade** (*3rd countable*) se admite um subconjunto denso enumerável. Neste caso, dizemos também que  $(X, \tau)$  é um **espaço separável**.

**Exemplo 1.4.19.** Temos que a reta real e a reta de Sorgenfrey são separáveis pois em ambos os casos  $\mathbb{Q}$  é denso.

O segundo axioma de enumerabilidade implica no terceiro (e já vimos que ele implica no primeiro também):

**Proposição 1.4.20.** *Se um espaço topológico  $(X, \tau)$  satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, então ele é separável.*

*Demonstração.* Seja  $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma base para  $(X, \tau)$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , seja  $x_n \in B_n$  (podemos supor sem perda de generalidade que  $B_n \neq \emptyset$ ). Vamos mostrar que  $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  é denso. Sejam  $x \in X$  e  $V$  vizinhança de  $x$ . Como  $\mathcal{B}$  é base, existe  $B_n \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B_n \subset V$ . Note que  $x_n \in B_n$ . Portanto,  $x_n \in V \cap D$ .  $\square$

No caso de métricos, vale a volta:

**Proposição 1.4.21.** *Se  $(X, d)$  é um espaço métrico e separável, então  $(X, d)$  satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade.*

Note que a reta de Sorgenfrey nos dá que a hipótese de metrizabilidade é necessária.

*Demonstração.* Seja  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  denso em  $X$ . Considere

$$\mathcal{B} = \{B_{\frac{1}{m}}(x_n) : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

Vamos mostrar que  $\mathcal{B}$  é base. Sejam  $A$  aberto e  $x \in A$ . Seja  $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$  tal que  $B_\varepsilon(x) \subset A$ . Seja  $m \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2}$ . Como  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  é denso em  $X$ , existe  $x_n \in B_{\frac{1}{m}}(x)$ . Vamos mostrar que  $x \in B_{\frac{1}{m}}(x_n) \subset B_\varepsilon(x)$ . Primeiramente, note que  $x \in B_{\frac{1}{m}}(x_n)$ , pois  $d(x, x_n) < \frac{1}{m}$ . Temos também que  $B_{\frac{1}{m}}(x_n) \subset B_\varepsilon(x)$ , pois, dado  $a \in B_{\frac{1}{m}}(x_n)$ , temos

$$d(a, x) \leq d(a, x_n) + d(x_n, x) < \frac{1}{m} + \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

**Definição 1.4.22.** Dizemos que o espaço topológico  $(X, \tau)$  é um **espaço metrizável** se existe uma métrica sobre  $X$  que induz a topologia  $\tau$ .

Com o que temos até o momento, já conseguimos dizer em alguns casos quando um espaço não é metrizável:

**Exemplo 1.4.23.** A reta de Sorgenfrey não é um espaço metrizável. De fato, temos que este é um espaço separável mas que não admite uma base enumerável. Assim, pela Proposição 1.4.21, que ele não é metrizável.

Veremos outros critérios ao longo do texto.

## Alongamentos

**Alongamento 1.4.24.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $x \in X$ . Mostre que são equivalentes:

- (i)  $x$  admite um sistema fundamental de vizinhanças enumerável;
- (ii)  $x$  admite uma base local enumerável.

**Alongamento 1.4.25.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico,  $x \in X$  e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sequência de pontos de  $X$ . Mostre que são equivalentes:

- (i)  $x_n \rightarrow x$ .
- (ii) para todo  $V$  aberto tal que  $x \in V$ , existe  $n_0$  tal que, se  $n \geq n_0$ , então  $x_n \in V$ .

- (iii) dado  $\mathcal{V}$  sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ , para todo  $V \in \mathcal{V}$ , existe  $n_0$  tal que, se  $n \geq n_0$ , então  $x_n \in V$ .

**Alongamento 1.4.26.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Mostre que  $D \subset X$  é denso se, e somente se, para todo aberto não vazio  $A$ ,  $A \cap D \neq \emptyset$ .

**Alongamento 1.4.27.** Mostre que se  $(X, \tau)$  é um espaço topológico enumerável que satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade, então  $(X, \tau)$  também satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade.

**Alongamento 1.4.28.** Mostre que todo subespaço de um espaço que satisfaça o primeiro axioma de enumerabilidade também satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade.

**Alongamento 1.4.29.** Mostre que todo subespaço de um espaço com base enumerável tem base enumerável.

**Alongamento 1.4.30.** Mostre que se  $(X, \tau)$  satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade, então todo  $x \in X$  admite um sistema fundamental de vizinhanças abertas enumerável e decrescente, isto é,  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é tal que  $V_{n+1} \subset V_n$ .

## Exercícios

**Exercício 1.4.31.** Mostre que a reta esburacada não é metrizável.

**Exercício 1.4.32.** Mostre que na reta esburacada as únicas sequências convergentes são as quase constantes. Uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é dita uma **sequência quase constante** se existem  $x$  e  $n_0$  tais que  $x_n = x$  para todo  $n \geq n_0$ .

**Exercício 1.4.33.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Seja  $D \subset X$  denso. Considerando  $D$  como subespaço, mostre que se  $E \subset D$  é denso em  $D$ , então  $E$  é denso em  $X$ .

**Exercício 1.4.34.** Mostre que todo subespaço de um espaço que tenha base enumerável é separável.

**Exercício 1.4.35.** O exemplo deste exercício é chamado de **plano de Niemytski**.

Considere  $X = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, y \geq 0\}$  com a topologia de forma que:

- (i) se  $(x, y)$  é tal que  $y > 0$ , então uma vizinhança básica de  $(x, y)$  é da forma de uma bola aberta centrada em  $(x, y)$  que não intercepta o eixo  $x$ , isto é  $B_\varepsilon((x, y))$  com  $0 < \varepsilon < y$ ;

- (ii) Para os pontos da forma  $(x, 0)$ , uma vizinhança de tal ponto é da forma de uma bola aberta contida em  $\{(a, b) : b > 0\}$  e que tangencie o eixo  $x$  no ponto  $(x, 0)$  (inclua o ponto em tal vizinhança). Ou seja,  $B_y((x, y)) \cup \{(x, 0)\}$ .

onde  $B_r((x, y))$  é a bola com a métrica usual do  $\mathbb{R}^2$ .

- (a) Mostre que isso define uma topologia.  
 (b) Mostre que tal espaço é de Hausdorff.  
 (c) Mostre que tal espaço é regular.  
 (d) Mostre que tal espaço é separável.  
 (e) Mostre que o eixo  $x$  ( $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ ) com a topologia de subespaço tem a topologia discreta.  
 (f) Mostre que tal espaço não tem base enumerável.  
 (g) Mostre que tal espaço não é metrizável.  
 (h) Mostre que não é verdade que todo subespaço de um espaço separável é separável (compare com o Exercício 1.4.34).

**Exercício 1.4.36.** Mostre que a reta esburacada não é separável.

**Exercício 1.4.37.** Mostre que, se  $(X, \tau)$  é um espaço regular que satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, então  $(X, \tau)$  é um espaço normal.

**Exercício 1.4.38.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico,  $\mathcal{B}$  uma base enumerável para  $(X, \tau)$  e seja  $\mathcal{C}$  uma base qualquer para  $(X, \tau)$ . Então, existe uma família enumerável  $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$  que é base para  $(X, \tau)$ .



# Capítulo 2

## Funções

### 2.1 Funções contínuas

Uma maneira de entender a definição de função contínua é a seguinte: imagine que  $f$  seja uma máquina de transformar algo em outra coisa. Para exemplificar, imaginemos que  $f$  transforma farinha em pizza. Assim, se queremos obter “ $y$   $m^2$  de pizza”, precisamos fornecer  $x$   $kg$  de farinha, de forma que  $f(x) = y$ . Mas, como toda medição acarreta em erros, este processo não tem precisão absoluta. Desta forma, para obtermos “ $y$   $m^2$  de pizza” dentro de uma margem de erro  $T$  (tolerância), precisamos fornecer  $x$   $kg$  dentro de uma precisão  $P$  (exigida pela  $f$ ). Vamos dizer que  $f$  é contínua se dada uma tolerância qualquer, sempre podemos encontrar uma precisão que satisfaça o processo.

O que não seria nada ruim. Mas não sei de onde viria o molho.

Traduzindo para a nossa linguagem, dados  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos,  $f$  será contínua no ponto  $x$  se para toda tolerância  $T$  em torno de  $f(x)$ , existe uma precisão  $P$  em torno de  $x$  de forma que  $f[P] \subset T$ . Note que essa última condição simplesmente quer dizer que todo os pontos que satisfazem a precisão tem imagem dentro da tolerância. Finalmente, note que estar dentro de uma precisão ou de uma tolerância é simplesmente estar “próximo” de um determinado ponto. Ou seja, basta trabalharmos com estes dois conceitos como sendo vizinhanças:

**Definição 2.1.1.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos e seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Seja também  $x \in X$ . Dizemos que  $f$  é uma função **função contínua no ponto**  $x$  se, para toda vizinhança  $A$  de  $f(x)$  existe uma vizinhança  $B$  de  $x$  tal que  $f[B] \subset A$ .

Veja o Alongamento 2.1.17 para ver que esse conceito de fato generaliza aquele normalmente visto em cursos de Cálculo.

Da mesma forma que vizinhança tinha uma tradução mais simples quando vista globalmente, a continuidade também tem:

**Definição 2.1.2.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos e seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Dizemos que  $f$  é uma **função contínua** se, para todo aberto  $A$  de  $Y$ , temos que  $f^{-1}[A]$  é aberto em  $X$  (i.e.,  $\forall A \in \rho \ f^{-1}[A] \in \tau$ ).

De fato, os conceitos apresentados são versões globais e locais de uma mesma coisa:

**Proposição 2.1.3.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos e  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Então  $f$  é contínua se, e somente se, para todo  $x \in X$ ,  $f$  é contínua no ponto  $x$ .*

*Demonstração.* Suponha  $f$  contínua e  $x \in X$ . Seja  $A$  vizinhança de  $f(x)$  e  $A'$  aberto tal que  $f(x) \in A' \subset A$ . Assim,  $f^{-1}[A']$  é aberto, com  $x \in f^{-1}[A']$  (portanto, vizinhança de  $x$ ) e  $f[f^{-1}[A']] \subset A' \subset A$ .

Agora, suponha que para todo  $x \in X$ ,  $f$  é contínua em  $x$ . Seja  $A$  aberto em  $Y$ . Para cada  $x \in X$  tal que  $f(x) \in A$ , seja  $B_x$  vizinhança de  $x$  tal que  $f[B_x] \subset A$ . Sem perda de generalidade, podemos supor  $B_x$  aberto<sup>1</sup>. Note que  $f^{-1}[A] = \bigcup_{x \in f^{-1}[A]} B_x$  e, portanto, é aberto.  $\square$

**Exemplo 2.1.4.** Considere  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Então a função  $I : X \rightarrow X$  dada por  $I(x) = x$  para todo  $x \in X$  (**função identidade**) é contínua (a verificação é imediata).

**Exemplo 2.1.5.** Qualquer função constante é contínua. De fato, sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos e considere uma função constante  $f : X \rightarrow Y$  dada por  $f(x) = k$ . Seja  $A$  um aberto de  $(Y, \sigma)$ . Então,

$$f^{-1}[A] = \begin{cases} \emptyset, & k \notin A \\ X, & k \in A \end{cases}$$

Ou seja, em ambos os casos  $f^{-1}[A]$  é um aberto de  $(X, \tau)$ .

Com a definição global de continuidade, prova-se o seguinte resultado facilmente:

Este resultado é lido como **Proposição 2.1.6.** *Sejam  $(X_1, \tau_1)$ ,  $(X_2, \tau_2)$  e  $(X_3, \tau_3)$  espaços topológicos e sejam  $g : X_1 \rightarrow X_2$  e  $f : X_2 \rightarrow X_3$  funções contínuas. Então,  $f \circ g : X_1 \rightarrow X_3$  é contínua.* O que era de se esperar.

*Demonstração.* Seja  $A$  um aberto em  $X_3$ . Como  $f$  é contínua, temos que  $f^{-1}[A]$  é aberto em  $X_2$ . Agora, como  $g$  é contínua,  $g^{-1}[f^{-1}[A]]$  é aberto em  $X_1$ . Mas, como  $g^{-1}[f^{-1}[A]] = (f \circ g)^{-1}[A]$ , a proposição está provada.  $\square$




Figura 2.1: Composta de contínuas é contínua (vá da direita para a esquerda)

Densos são “empurrados” por funções contínuas:

**Proposição 2.1.7.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos e  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua sobrejetora. Se  $D \subset X$  é denso em  $X$ , então,  $f[D]$  é denso em  $Y$ .*

*Demonstração.* Seja  $A \subset Y$  aberto não vazio. Note que  $f^{-1}[A]$  é aberto em  $X$ . Como  $f$  é sobrejetor,  $f^{-1}[A] \neq \emptyset$ . Logo, existe  $d \in D$  tal que  $d \in f^{-1}[A]$ , ou seja,  $f(d) \in A$ . Portanto,  $f[D] \cap A \neq \emptyset$ .  $\square$


**Corolário 2.1.8.** *Imagem contínua de um espaço separável é separável.*

O seguinte exemplo será útil no estudo de sequências convergentes:

**Exemplo 2.1.9.** Considere o conjunto  $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$  com a topologia gerada pelos conjuntos

- (a)  $\{n\}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ;
- (b)  $\{\infty\} \cup A$ , em que  $A \subset \mathbb{N}$  e  $\mathbb{N} \setminus A$  é finito.

Note que, desta forma, um conjunto contendo  $\infty$  é aberto se, e somente se, apenas uma quantidade finita de elementos de  $\mathbb{N}$  não pertence a ele. Chamamos este espaço de **espaço da sequência convergente**.

Figura 2.2: Típica vizinhança de  $\infty$ 

**Proposição 2.1.10.** *Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico e seja  $f : \mathbb{N} \cup \{\infty\} \rightarrow X$  uma função  $(\mathbb{N} \cup \{\infty\})$  com a topologia do exemplo anterior). Então,  $f$  é contínua se, e somente se,  $f(n) \rightarrow f(\infty)$  (i.e., a sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , em que cada  $x_n = f(n)$ , é convergente para  $x = f(\infty)$ ).*

*Demonstração.* Suponha  $f$  contínua. Seja  $A$  aberto tal que  $f(\infty) \in A$ . Como  $f$  é contínua,  $f^{-1}[A]$  é aberto. Logo,  $\mathbb{N} \setminus f^{-1}[A]$  é finito, ou seja, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para  $n \geq n_0$ ,  $n \in f^{-1}[A]$ . Logo, para  $n \geq n_0$ ,  $f(n) \in A$ .

Agora, suponha que  $f(n) \rightarrow f(\infty)$ . É imediato que  $f$  é contínua em todo  $n \in \mathbb{N}$ . Mostremos que  $f$  é contínua em  $\infty$ . Seja  $A$  aberto tal que  $f(\infty) \in A$ . Como  $f(n) \rightarrow f(\infty)$ , existe  $n_0$  tal que para  $n \geq n_0$ ,  $f(n) \in A$ . Logo,  $\{n : n \geq n_0\} \subset f^{-1}[A]$  e  $\infty \in \{n : n \geq n_0\} \cup \{\infty\} \subset f^{-1}[A]$ .  $\square$

Funções contínuas também “empurram” sequências convergentes:

**Proposição 2.1.11.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos,  $f : X \rightarrow Y$  função contínua e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência convergente para  $x \in X$ . Então,  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .*

*Demonstração.* Considere a função  $h : \mathbb{N} \cup \{\infty\} \rightarrow X$ , com  $h(n) = x_n$  e  $h(\infty) = x$ . Note que  $h$  é contínua pela Proposição anterior. Note também

<sup>1</sup>caso contrário, basta “reduzi-lo” a um aberto que contenha  $x$

que  $f \circ h$  é contínua, pois é composta de contínuas. Note que  $(f \circ h)(n) = f(x_n)$ , para  $n \in \mathbb{N}$  e que  $(f \circ h)(\infty) = f(\infty)$ . Logo, pela Proposição anterior, aplicada a  $f \circ h$ , temos  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .  $\square$

No caso de espaços “ricos” em seqüências convergentes, também temos a volta do resultado anterior:

**Proposição 2.1.12.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos, onde  $(X, \tau)$  possui bases locais enumeráveis. Dada  $f : X \rightarrow Y$  uma função, temos que  $f$  é contínua se, e somente se, para toda seqüência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  tal que  $x_n \rightarrow x$ , temos que  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .* Veja também o Exercício 2.1.22.

*Demonstração.* Já está feito supondo  $f$  contínua.

Para a recíproca, sejam  $x \in X$  e  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  base local para  $x$ . Seja  $A$  aberto em  $Y$  tal que  $f(x) \in A$ . Mostremos que existe  $V$  aberto tal que  $x \in V \subset f^{-1}[A]$ . Suponha, por contradição, que não existe. Então, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , temos que  $\bigcap_{k \leq n} B_k \not\subset f^{-1}[A]$ . Seja  $x_n \in \bigcap_{k \leq n} B_k$  tal que  $f(x_n) \notin A$ . Agora, observe que  $x_n \rightarrow x$ . De fato, seja  $V \ni x$  aberto. Existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $x \in B_n \subset V$ . Portanto, para todo  $m \geq n$ ,  $x_m \in V$ . Note, também, que  $f(x_n) \not\rightarrow f(x)$ . De fato, veja que  $f(x) \in A$ , que é aberto e para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f(x_n) \notin A$ , que é contradição.  $\square$

**Corolário 2.1.13.** *Sejam  $(X, d_1)$  e  $(Y, d_2)$  espaços métricos e  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Então,  $f$  é contínua se, e somente se, para toda seqüência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  tal que  $x_n \rightarrow x$ , temos que  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .*

## Alongamentos

**Alongamento 2.1.14.** Mostre que  $f : X \rightarrow Y$  é contínua se, e somente se,  $f^{-1}[F]$  é fechado (em  $X$ ) para todo  $F \subset Y$  fechado.

**Alongamento 2.1.15.** Mostre que na definição de função contínua poderíamos supor os abertos sendo básicos (isto é, tanto os abertos em  $X$  como em  $Y$  serem elementos de bases  $\mathcal{B}_X$  e  $\mathcal{B}_Y$  fixadas previamente).

**Alongamento 2.1.16.** Mostre o análogo do Alongamento anterior para a definição de continuidade num ponto, trocando vizinhança por “elemento de uma base local” fixada.

**Alongamento 2.1.17.** Sejam  $(X_1, d_1)$  e  $(X_2, d_2)$  espaços métricos e  $f : X_1 \rightarrow X_2$  uma função. Mostre que, para cada  $x \in X_1$ , são equivalentes: Para aqueles que gostam de  $\varepsilon$ 's e  $\delta$ 's.

(a)  $f$  contínua em  $x$  (com as topologia induzidas pelas métricas);

(b)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in X, d_1(x, y) < \delta \rightarrow d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$ .

**Alongamento 2.1.18.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos e  $Z \subset X$  subespaço de  $X$ . Seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua. Mostre que  $(f \upharpoonright Z) : Z \rightarrow Y$  é contínua.

### Exercícios

**Exercício 2.1.19.** Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Seja  $A$  um aberto fechado em  $X$ . Mostre que a **função característica** de  $A$  é contínua. Isto é, que a função  $\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$  dada por

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

é contínua (considere em  $\{0, 1\}$  a topologia discreta (ou a induzida por  $\mathbb{R}$ , que dá na mesma)).

**Exercício 2.1.20.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos. Sejam  $F_1, \dots, F_n \subset X$  fechados tais que  $\bigcup_{i=1}^n F_i = X$ . Seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função.

- Mostre que se  $f \upharpoonright F_i$  é contínua para todo  $i = 1, \dots, n$ , então  $f$  é contínua;
- Note que a volta é imediata (mesmo que cada  $F_i$  não seja fechado).
- Dê um exemplo para mostrar que a hipótese de que cada  $F_i$  ser fechado é necessária no item (a).

**Exercício 2.1.21.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos. Seja  $(A_i)_{i \in I}$  família de abertos de  $X$  tal que  $\bigcup_{i \in I} A_i = X$ . Seja  $f : X \rightarrow Y$ .

- Mostre que se  $f \upharpoonright A_i$  é contínua para todo  $i \in I$ , então  $f$  é contínua.
- Note que a volta é imediata (mesmo que cada  $A_i$  não seja aberto).

**Exercício 2.1.22.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos, sendo que  $(X, \tau)$  satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade. Mostre que podemos melhorar a Proposição 2.1.12 para  $f : X \rightarrow Y$  é contínua se, e somente, para toda sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  convergente em  $X$ , temos que  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  é convergente.

## 2.2 Lema de Urysohn

Nesta seção veremos uma equivalência entre a normalidade e a existência de determinadas funções contínuas. Começemos com o “lado fácil”:

**Proposição 2.2.1.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico de modo que, para todos  $F, G \subset X$  fechados disjuntos, existe uma função contínua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que, para todo  $x \in F$ ,  $f(x) = 0$  e, para todo  $y \in G$ ,  $f(y) = 1$ . Então,  $(X, \tau)$  é  $T_4$ .*

*Demonstração.* Note que  $F \subset f^{-1}[[0, \frac{1}{2}[[$  e  $G \subset f^{-1}][\frac{1}{2}, 1]$  e, por  $f$  ser uma função contínua, tais conjuntos são abertos e disjuntos.  $\square$

Com este resultado, podemos mostrar facilmente a normalidade de espaços métricos:

**Definição 2.2.2.** Sejam  $(X, d)$  espaço métrico e  $A, B \subset X$  conjuntos não vazios. Definimos  $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$ . No caso  $A = \{a\}$ , denotamos  $d(A, B) = d(a, B)$  (analogamente para  $B = \{b\}$ ).

**Exemplo 2.2.3.** Sejam  $(X, d)$  espaço métrico e  $A \subset X$  um conjunto não vazio. Então, a função  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por  $f(x) = d(x, A)$  é contínua.

*Demonstração.* Seja  $a \in A$  e sejam  $x, y \in X$ . Temos que  $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$ . Logo,  $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$ . Assim,

$$d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y).$$

Analogamente, temos

$$d(y, A) - d(x, A) \leq d(y, x).$$

Portanto,  $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ . Com isso, temos que, dado  $\varepsilon > 0$ , para  $x, y \in X$ , temos  $d(x, y) < \varepsilon \rightarrow d(f(x), f(y)) < \varepsilon$ . O que mostra que tal função é contínua (ver Alongamento 2.1.17).  $\square$

**Corolário 2.2.4.** *Seja  $(X, d)$  um espaço métrico. Então,  $(X, d)$  é normal.*

*Demonstração.*  $T_1$  é imediato (já feito).

Sejam  $F, G \subset X$  fechados disjuntos. Considere a função  $f : X \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$f(x) = \frac{d(x, F)(1 - d(x, G))}{d(x, F) + d(x, G)}.$$

$f$  satisfaz as hipóteses da Proposição 2.2.1 e daí, segue o resultado.  $\square$

A continuidade segue da continuidade de operações básicas (exercício) e de que composta de funções contínuas é contínua.




Figura 2.3: Abertos intercalados

Agora vamos provar o “lado difícil” da equivalência. Nesta demonstração usaremos muitas vezes o seguinte fato: Se  $(X, \tau)$  é  $T_4$  e  $F$  é um fechado contido num aberto  $A$ , então existe um aberto  $B$  tal que  $F \subset B \subset \overline{B} \subset A$  (note que isto é, na verdade, equivalente à ser  $T_4$ , vide o Alongamento 1.3.23).

**Teorema 2.2.5 (Lema de Urysohn).** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico  $T_4$ . Sejam  $F, G \subset X$  fechados disjuntos. Então existe uma função contínua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que, para todo  $x \in F$ ,  $f(x) = 0$  e, para todo  $x \in G$ ,  $f(x) = 1$ .*

*Demonstração.* Seja  $\{q_n : n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ , de forma que  $q_0 = 0$ ,  $q_1 = 1$  e  $q_i \neq q_j$  se  $i \neq j$ . Vamos definir por indução uma família  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  de abertos de  $X$ , de forma que, para todo  $n, m \in \mathbb{N}$ :

- (a)  $F \subset U_n \subset \overline{U_n} \subset X \setminus G$ ;
- (b) se  $q_n < q_m$ , então  $\overline{U_n} \subset U_m$ .

Atenção com a ordem aqui: não estamos usando a ordem dos naturais, mas sim a ordem dos racionais. Por exemplo, suponha que

$q_0 = 0$ ;  $q_1 = 1$ ;  $q_2 = \frac{1}{2}$ ,  
 $q_3 = \frac{1}{3}$  e  $q_4 = \frac{2}{3}$ . Então teríamos que  $U_0 \subset \overline{U_0} \subset U_3 \subset \overline{U_3} \subset U_2 \subset \overline{U_2} \subset U_4 \subset \overline{U_4} \subset U_1$

Mostremos que existe tal família.

Seja  $U_0$  aberto tal que  $F \subset U_0 \subset \overline{U_0} \subset X \setminus G$  (note que  $U_0$  existe por  $(X, \tau)$  ser  $T_4$ ). Seja  $U_1$  aberto tal que  $\overline{U_0} \subset U_1 \subset \overline{U_1} \subset X \setminus G$  (novamente, tal  $U_1$  existe por  $(X, \tau)$  ser  $T_4$ ). Note que as condições (a) e (b) impostas acima estão satisfeitas.



Seja  $U_2$  aberto tal que  $\overline{U_0} \subset U_2 \subset \overline{U_2} \subset U_1$  (lembre-se que o índice 2 em  $U_2$  faz referência ao racional  $q_2$ , e este é tal que  $0 < q_2 < 1$ , em particular,  $U_2$  satisfaz (a) e (b)).

Suponha  $U_j$  definido para todo  $j \leq k$ , com  $k \geq 2$ , de forma que estejam satisfeitas as condições (a) e (b) (vamos chamar isso de “hipótese de indução” (HI)).

Seja  $i \leq k$  de forma que

$$q_i = \max\{q_n : n \leq k, q_n < q_{k+1}\}.$$

Note que  $q_i$  está bem definido, devido a  $q_0 = 0$ . Seja  $j \leq k$  de forma que

$$q_j = \min\{q_n : n \leq k, q_{k+1} < q_n\}.$$

Novamente, tal número está bem definido, devido a  $q_1 = 1$ .

Por HI, temos  $\overline{U_i} \subset U_j$ ; por  $(X, \tau)$  ser  $T_4$ , podemos tomar  $U_{k+1}$  aberto tal que  $\overline{U_i} \subset U_{k+1} \subset \overline{U_{k+1}} \subset U_j$ . Vamos mostrar  $U_{k+1}$  satisfaz (a) e (b).

De fato, temos (a) pois

$$F \subset U_i \subset \overline{U_i} \subset U_{k+1} \subset \overline{U_{k+1}} \subset U_j \subset \overline{U_j} \subset X \setminus G$$

Note que tanto a primeira quanto a última inclusão decorrem de HI.

Para a condição (b), seja  $m \leq k$ . Temos dois casos:  $q_m < q_{k+1}$  e  $q_{k+1} < q_m$ . Vamos fazer o caso em que  $q_{k+1} < q_m$  (o outro caso é análogo e é o Alongamento 2.2.9). Note que  $q_m \geq q_j$ . Temos dois subcasos aqui: se  $q_m = q_j$ , segue trivialmente de nossas hipóteses, já que

$$\overline{U_{k+1}} \subset U_j$$

Agora, se  $q_j < q_m$ , segue de (HI) que

$$\overline{U_{k+1}} \subset U_j \subset \overline{U_j} \subset U_m.$$

Agora vamos construir a função do enunciado. Seja  $f : X \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$f(x) = \inf(\{q_n : x \in U_n\} \cup \{1\}),$$

para todo  $x \in X$ . Claramente,  $f(x) \in [0, 1]$  para qualquer  $x \in X$ . Suponha que  $x \in F$ . Neste caso, temos por construção que  $x \in U_0$ , donde  $f(x) = 0$ ; se tivermos  $x \in G$ , então  $x \notin U_n$ , para todo  $n \in \mathbb{N}$  e, portanto,  $f(x) = 1$  (note que, em ambos os casos, utilizamos a condição (a)). Resta apenas mostrar que  $f$  é contínua. Considere as seguintes afirmações sobre  $\alpha \in ]0, 1[$ :

Fazendo o mesmo exemplo que apresentamos antes, quando  $k + 1 = 2$ , teríamos que  $q_i = 0$  e  $q_j = 1$ . Já quando  $k + 1 = 3$ , teríamos  $q_i = q_0$  e  $q_j = q_2$ . Os números  $q_i$  e  $q_j$  indicam o “lugar” onde  $U_{k+1}$  deve ser encaixado.

Boa parte do argumento aqui segue diretamente do fato dos  $U_n$ 's estarem encaixados na mesma ordem que os respectivos  $q_n$ 's.

- (i)  $f^{-1}[[0, \alpha[$  é aberto: Seja  $x \in X$  tal que  $0 \leq f(x) < \alpha$ . Seja  $q_n \in \mathbb{Q}$  tal que  $f(x) < q_n < \alpha$ . Vamos mostrar que

$$x \in U_n \subset f^{-1}[[0, \alpha[.$$

Primeiramente, note que  $x \in U_n$  pois, caso contrário, teríamos que  $f(x) \geq q_n$ , contrariando nossa hipótese. Agora seja  $y \in U_n$ . Assim,  $f(y) \leq q_n$  e, portanto,  $f(y) \in [0, \alpha[$  como queríamos.

- (ii)  $f^{-1}]]\alpha, 1]]$  é aberto: Seja  $x \in X$  tal que  $\alpha < f(x) \leq 1$ . Seja  $q_n \in \mathbb{Q}$  tal que  $\alpha < q_n < f(x) < 1$ . Vamos mostrar que

$$x \in X \setminus \overline{U_n} \subset f^{-1}]]\alpha, 1]].$$

Primeiramente, note que  $x \in X \setminus \overline{U_n}$ . Pois, caso contrário, teríamos que  $x \in \overline{U_n} \subset U_m$  para todo  $m$  tal que  $q_m > q_n$ . Logo,  $f(x) \leq q_n$  contrariando nossa hipótese. Agora seja  $y \in X \setminus \overline{U_n}$ . Note que  $f(y) \geq q_n$  e, portanto,  $f(y) \in ]q_n, 1]$  como queríamos.

Note que abertos da forma  $] \alpha, \beta[$ ,  $[0, \alpha[$ ,  $] \beta, 1]$  formam uma base para  $[0, 1]$  e que  $] \alpha, \beta[ = [0, \beta[ \cap ] \alpha, 1]$ . Como  $f^{-1}[A \cap B] = f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$  em geral, concluímos que a imagem inversa de um aberto de uma base fixada é aberta. Logo,  $f$  é contínua.  $\square$

**Corolário 2.2.6.** *Um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_4$  se, e somente se, para quaisquer fechados  $F, G \subset X$  disjuntos existir uma função contínua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(x) = 0$  para todo  $x \in F$  e  $f(x) = 1$  para todo  $x \in G$ .*

**Corolário 2.2.7.** *Um espaço topológico  $(X, \tau)$   $T_1$  é normal se, e somente se, para quaisquer fechados  $F, G \subset X$  disjuntos existir uma função contínua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(x) = 0$  para todo  $x \in F$  e  $f(x) = 1$  para todo  $x \in G$ .*

Podemos pensar que espaços normais são aqueles em que funções contínuas separam fechados disjuntos. Ao tentarmos fazer o análogo para separação entre pontos e fechados, obtemos um novo axioma de separação:

**Definição 2.2.8.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é  $T_{3\frac{1}{2}}$  se, para todo  $x \in X$  e  $F \subset X$  fechado tal que  $x \notin F$  existir  $f : X \rightarrow [0, 1]$  contínua, tal que  $f(x) = 0$  e  $f(y) = 1$ , para todo  $y \in F$ . No caso que  $(X, \tau)$  também é  $T_1$ , dizemos que  $(X, \tau)$  é um espaço **completamente regular**.

### Alongamentos

**Alongamento 2.2.9.** Complete a demonstração do Lema de Urysohn, para o caso em que  $m \leq k$  e  $q_m < q_{k+1}$ .

**Alongamento 2.2.10.** Mostre que todo espaço completamente regular é um espaço regular.

### Exercícios

**Exercício 2.2.11.** Seja  $(X, d)$  espaço métrico. Sejam  $F \subset X$  fechado. Mostre que, dado  $x \in X$ ,  $d(x, F) = 0$  se, e somente se,  $x \in F$ .

**Exercício 2.2.12.** Mostre que subespaços de espaços  $T_{3\frac{1}{2}}$  são  $T_{3\frac{1}{2}}$ .

**Exercício 2.2.13.** Seja  $X$  um conjunto não vazio. Dizemos que  $\preceq$  é uma **ordem parcial** sobre  $X$  se, dados  $a, b, c \in X$  temos:

- (i)  $a \preceq a$ ;
- (ii) se  $a \preceq b$  e  $b \preceq a$ , então  $a = b$ ;
- (iii) se  $a \preceq b$  e  $b \preceq c$ , então  $a \preceq c$ .

Mostre que a seguinte relação é uma ordem parcial sobre subconjuntos de um espaço topológico:  $A \preceq B$  se, e somente se,  $\overline{A} \subset B$  ou  $A = B$ .

**Exercício 2.2.14.** Considere  $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$  como na demonstração do Teorema 2.2.5 e  $\preceq$  como definida no exercício anterior.

- (a) Mostre que  $\preceq$  é uma **ordem total** (isto é, dados  $a, b$ , temos que  $a \preceq b$  ou  $b \preceq a$ ) sobre  $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ ;
- (b) Mostre que existe um **isomorfismo de ordem**<sup>2</sup> entre  $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$  com a ordem  $\preceq$  e  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$  com a ordem usual.

## 2.3 Extensões de funções

**Definição 2.3.1.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos. Seja  $A \subset X$ . Dadas  $f : A \rightarrow Y$  e  $g : X \rightarrow Y$  funções contínuas, dizemos que  $g$  é uma **extensão contínua** de  $f$  se  $f(a) = g(a)$  para todo  $a \in A$ .

<sup>2</sup> $(X, \preceq)$  é isomorfo a  $(Y, \leq)$  se existe  $f : X \rightarrow Y$  bijetora tal que, para todo  $a, b \in X$ ,  $f(a) \leq f(b)$  se, e somente se,  $a \preceq b$ .

Os valores num denso determinam, no máximo, uma função contínua:

**Proposição 2.3.2.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos, onde  $(Y, \rho)$  é de Hausdorff. Se  $D \subset X$  é denso e  $f : X \rightarrow Y$  e  $g : X \rightarrow Y$  são duas funções contínuas tais que  $f(d) = g(d)$  para todo  $d \in D$ , então  $f = g$ .*

*Demonstração.* Suponha que não. Seja  $x \in X$  tal  $f(x) \neq g(x)$ . Sejam  $A$  e  $B$  abertos disjuntos tais que  $f(x) \in A$  e  $g(x) \in B$ . Note que  $f^{-1}[A] \cap g^{-1}[B]$  é um aberto contendo  $x$ . Logo, existe  $d \in f^{-1}[A] \cap g^{-1}[B]$ . Note que  $f(d) = g(d) \in A \cap B$ , contradição.  $\square$

Dissemos “no máximo” pois existem casos que uma função contínua num denso não admite qualquer extensão contínua:

**Exemplo 2.3.3.** Considere  $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ é par} \\ 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Note que  $f$  é contínua,  $\mathbb{N}$  é denso em  $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$  (espaço da sequência convergente) e não existe  $g : \mathbb{N} \cup \{\infty\} \rightarrow [0, 1]$  contínua que estenda  $f$ .

Note que no mesmo exemplo, temos que  $f$  está definida num aberto e não pode ser estendida continuamente ao espaço todo. Vamos agora apresentar um resultado sobre quando podemos estender uma função definida num fechado:

**Teorema 2.3.4 (Teorema da Extensão de Tietze).** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço  $T_4$ . Sejam  $M \subset X$  fechado e  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua. Então existe  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  uma extensão contínua de  $f$ .*

Note que vale a volta, isto é, se  $(X, \tau)$  for um espaço topológico tal que para qualquer função contínua  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ , com  $M \subset X$  fechado, existir uma extensão contínua  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ , então  $(X, \tau)$  é  $T_4$ . De fato, dados  $F, G \subset X$  fechados disjuntos, a função  $f : F \cup G \rightarrow \{0, 1\}$  dada por  $f(x) = 1$  se  $x \in F$  e  $f(x) = 0$  caso  $x \in G$ ; é contínua, donde segue que existe  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  contínua com  $g(x) = 1$  se  $x \in F$  e  $g(x) = 0$  caso  $x \in G$ ; note que  $g^{-1} \left[ \left] 0, \frac{1}{2} \right[ \right] \supset G$  e  $g^{-1} \left[ \left] \frac{1}{2}, 1 \right[ \right] \supset F$  são abertos disjuntos.

Antes de demonstrarmos o teorema, vamos provar alguns lemas auxiliares.

**Lema 2.3.5.** *Sejam  $(X, \tau)$   $T_4$ ,  $M \subset X$  fechado e  $f_0 : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua tal que  $|f_0(x)| \leq c$ , para todo  $x \in M$  (com  $c \in \mathbb{R}_{>0}$  fixado). Então existe  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  contínua, tal que*




Figura 2.4: A ideia para o Lema 2.3.5

$$(a) |g(x)| \leq \frac{1}{3}c, \text{ para todo } x \in X;$$

$$(b) |f_0(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}c, \text{ para todo } x \in M.$$

*Demonstração.* Sejam  $A = f_0^{-1} [[-c, -\frac{1}{3}c]]$  e  $B = f_0^{-1} [[\frac{1}{3}c, c]]$ . Note que  $A$  e  $B$  são disjuntos e fechados de  $M$ , pois são imagens inversas de fechados via função contínua. Como  $M$  é fechado em  $X$ , temos  $A$  e  $B$  são disjuntos e fechados em  $X$ .

Pelo Lema de Urysohn, existe  $h : X \rightarrow [0, 1]$  contínua tal que  $h[A] = \{0\}$  e  $h[B] = \{1\}$ . Note que a função  $g(x) = \frac{2}{3}c \cdot (h(x) - \frac{1}{2})$  satisfaz as condições (a) e (b) desejadas (ver Alongamento 2.3.8).  $\square$

**Lema 2.3.6.** *Sejam  $(X, \tau)$   $T_4$ ,  $M \subset X$  fechado e  $f : M \rightarrow [-1, 1]$  contínua. Então existe  $g : X \rightarrow [-1, 1]$  uma extensão contínua de  $f$ .*

*Demonstração.* Vamos definir  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  funções contínuas de  $X$  em  $[-1, 1]$  satisfazendo

$$(a) |g_i(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^i, \text{ para todo } x \in X;$$

$$(b) \left| f(x) - \sum_{j=0}^i g_j(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^i, \text{ para todo } x \in M.$$

Para definir  $g_0$ , aplicamos o Lema 2.3.5 para  $f$  e  $c = 1$  (note que tal valor de  $c$  se deve ao fato de  $f$  ser limitada por 1 pela hipótese deste lema). Suponha definidas  $g_0, \dots, g_i$ , de modo a valer (a) e (b). Vamos definir  $g_{i+1}$ .

Aplique o Lema anterior para  $f - \sum_{j=0}^i (g_j \upharpoonright M)$  e  $c = (\frac{2}{3})^i$ . Note que  $f - \sum_{j=0}^i (g_j \upharpoonright M)$  é contínua (por ser soma de funções contínuas) e limitada pela constante  $c$  escolhida (pois  $g_0, \dots, g_i$  satisfazem b). É imediato verificar que  $g_{i+1}$  satisfaz (a) e (b).

Defina  $g : X \rightarrow [-1, 1]$  como  $g(x) = \sum_{j=0}^{\infty} g_j(x)$ , para todo  $x \in X$  (note que tal definição faz sentido devido à condição (a)). Pela condição (b), temos que  $g$  estende  $f$ . Resta apenas mostrar que  $g$  é contínua.

Sejam  $\varepsilon > 0$  e  $x \in X$ . Tome  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\sum_{i=n_0+1}^{\infty} (\frac{2}{3})^{i+1} < \frac{\varepsilon}{2}$ . Como cada  $g_i$  é contínua, existe  $A_i$  vizinhança de  $x$  tal que para todo  $y \in A_i$ ,  $|g_i(x) - g_i(y)| < \frac{\varepsilon}{2(n_0+1)}$ . Seja  $A = \bigcap_{i=0}^{n_0} A_i$  (note que  $A$  é vizinhança de  $x$ ). Seja  $y \in A$ . Temos

$$\begin{aligned}
|g(x) - g(y)| &\leq \sum_{i=0}^{\infty} |g_i(x) - g_i(y)| \\
&= \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} |g_i(x) - g_i(y)| \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} (|g_i(x)| + |g_i(y)|) \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} \left( \frac{1}{3} \left( \frac{2}{3} \right)^i + \frac{1}{3} \left( \frac{2}{3} \right)^i \right) \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^i \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^{i+1} \\
&< (n_0 + 1) \frac{\varepsilon}{2(n_0+1)} + \frac{\varepsilon}{2} \\
&= \varepsilon
\end{aligned}$$

□

Finalmente, podemos passar à demonstração do Teorema:

*Demonstração do Teorema da Extensão de Tietze (2.3.4).* Note que basta mostrarmos o resultado para  $f : M \rightarrow ]-1, 1[$  (pois existe  $\varphi : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  bijetora contínua com inversa contínua e, portanto, o argumento segue via composições adequadas - veremos mais sobre isso em 2.4.14).

Pelo Lema 2.3.6, existe  $g : X \rightarrow [-1, 1]$  contínua que estende  $f$ . Seja  $M' = g^{-1}[\{-1, 1\}]$ . Note que  $M$  e  $M'$  são fechados disjuntos. Pelo Lema de Urysohn, existe  $h : X \rightarrow [0, 1]$  contínua tal que  $h[M] = \{1\}$  e  $h[M'] = \{0\}$ . Finalmente, note que a função desejada é  $F : X \rightarrow ]-1, 1[$  dada por  $F(x) = g(x)h(x)$ . □

**Exemplo 2.3.7.** Considere  $(X, \tau)$  como o plano de Niemytski (ver Exercício 1.4.35). Vamos mostrar que tal espaço não é normal. Faremos isso de duas maneiras (ambas usam um argumento de cardinalidade - escolha a que deixar você mais confortável).

Por ser  $T_1$ , afirmar que  $X$  não é normal equivale a afirmar que  $X$  não é  $T_4$ . Suponha, por absurdo, que  $X$  seja  $T_4$ . Note primeiramente que  $R = \mathbb{R} \times \{0\} = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$  é fechado em  $X$  e, como  $R$  é discreto, qualquer subconjunto  $F \subset R$  é fechado em  $R$  e, por conseguinte, também é fechado em  $X$ . Note que  $F$  e  $R \setminus F$  são disjuntos e fechados em  $X$ . Vamos agora terminar de duas maneiras diferente:

- Aplicando o Teorema de Tietze, temos que, para cada  $F \subset R$ , existe  $f_F : X \rightarrow \mathbb{R}$  contínua tal que  $f_F[F] = \{0\}$  e  $f_F[R \setminus F] = \{1\}$ . Note que, se  $F \neq G$ , então  $f_F \neq f_G$ . Logo, temos uma quantidade maior igual que  $|\wp(R)|$  de funções contínuas saindo de  $X$  e chegando em  $\mathbb{R}$ . Por outro lado, seja  $D \subset X$  denso enumerável. Então existem  $|\wp(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$  funções (contínuas ou não) saindo de  $D$  e chegando em  $\mathbb{R}$ . Logo, pela Proposição 2.3.2, existem, no máximo  $|\mathbb{R}|$  funções contínuas saindo de  $X$  e chegando em  $\mathbb{R}$ . Como  $|\wp(\mathbb{R})| > |\mathbb{R}|$ , temos uma contradição.
- Aplicando diretamente o definição de  $T_4$ , para cada  $F \subset R$ , existem abertos (em  $X$ )  $A(F)$  e  $B(F)$  disjuntos tais que  $F \subset A(F)$  e  $R \setminus F \subset B(F)$ .

Isso é um fato que poder ser facilmente provado usando-se um pouco de teoria dos conjuntos.

Vamos mostrar que, se  $F \neq G$ , então  $A(F) \neq A(G)$ . Sejam  $F, G \subset R$  com  $F \neq G$ . Sem perda de generalidade, suponha  $F \setminus G \neq \emptyset$ . Como  $F \setminus G = F \cap (R \setminus G)$ , segue que  $B(G) \cap A(F) \neq \emptyset$ , mas como  $A(G) \cap B(G) = \emptyset$ , temos necessariamente  $A(F) \neq A(G)$ .

Seja  $D$  denso enumerável em  $X$ . Defina  $A'(F) = A(F) \cap D$  e  $B'(F) = B(F) \cap D$ . Por argumentação análoga à anterior, vemos que se  $F \neq G$ , então  $A'(F) \neq A'(G)$ . Assim, obtemos  $\varphi : \wp(R) \rightarrow \wp(D)$  dada por  $\varphi(F) = A'(F)$ , uma função injetora, o que é absurdo, uma vez que  $|\wp(R)| > |\wp(D)|$ .

Estas duas demonstrações apresentadas aqui podem ser generalizadas pelo Lema de Jones (ver Exercício 2.3.10).

## Alongamentos

**Alongamento 2.3.8.** Prove que a função  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  dada na demonstração do Lema 2.3.5 satisfaz as condições (a) e (b).

**Alongamento 2.3.9.** Mostre o Lema de Urysohn a partir do Teorema de Tietze.

### Exercícios

**Exercício 2.3.10.** Prove o seguinte caso particular do **Lema de Jones**: Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico separável. Se existe  $D \subset X$  discreto fechado tal que  $|D| = \mathfrak{c}$  (cardinalidade do contínuo), então  $(X, \tau)$  não é  $T_4$ .

## 2.4 Homeomorfismos

Nesta seção vamos apresentar como formalizar a ideia que dois espaços são o mesmo do ponto de vista topológico.

**Definição 2.4.1.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos. Dizemos que uma função  $f : X \rightarrow Y$  é um **homeomorfismo**, se  $f$  é bijetora, contínua e  $f^{-1}$  é contínua. Neste caso, dizemos que  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  são **homeomorfos**.

**Definição 2.4.2.** Chamamos uma propriedade  $P$  de **propriedade topológica**, se ela é preservada por homeomorfismos (isto é, se  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  são espaços homeomorfos, então  $(X, \tau)$  tem a propriedade  $P$  se, e somente se,  $(Y, \sigma)$  tem).

**Exemplo 2.4.3.** Todos os axiomas de separação e de enumerabilidade que apresentamos são propriedades topológicas. Por exemplo, provamos no Corolário 2.1.8 que se  $X$  é separável e  $f : X \rightarrow Y$  é contínua e sobrejetora, então  $Y$  também é separável. Assim, se  $f$  é um homeomorfismo entre  $X$  e  $Y$ , temos que o fato de  $X$  ser separável implica  $Y$  ser separável. Já a função  $f^{-1}$  nos dá que  $Y$  ser separável implica que  $X$  também é. Veja também o Exercício 2.4.23.

**Exemplo 2.4.4.** Seja o conjunto  $X = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ . Sobre este conjunto podemos ter a métrica  $d_1$ , herdada da métrica usual em  $\mathbb{R}$  e, também, podemos ter a métrica discreta  $d_2$ , dada por

$$d_2(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

O espaço  $(X, d_1)$  não é completo, pois  $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$  é uma sequência de Cauchy que não converge em  $(X, d_1)$ . Por outro lado,  $(X, d_2)$  é completo, pois com a métrica discreta, qualquer espaço é completo.



A métrica  $d_1$  induz a topologia  $\tau$  sobre  $X$  que é a topologia induzida de  $\mathbb{R}$  sobre  $X$ . Por outro lado, a métrica  $d_2$  induz a topologia discreta  $\sigma$  sobre  $X$ . Note que, neste caso,  $\tau = \sigma$ . Portanto, a função  $f : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ , dada por  $f(x) = x$  é um homeomorfismo.

Logo, apesar da propriedade “ser sequência convergente” ser uma propriedade topológica, a propriedade “ser sequência de Cauchy” não é. Veja o Alongamento 2.4.16

**Definição 2.4.5.** Seja  $(X, \leq)$  um conjunto ordenado. Dizemos que  $\leq$  é uma **ordem total** se para  $x, y \in X$ , vale  $x \leq y$  ou  $y \leq x$ .

**Definição 2.4.6.** Seja  $(X, \leq)$  um conjunto totalmente ordenado. Chamamos de **topologia da ordem** sobre  $(X, \leq)$  a topologia gerada pelos seguintes conjuntos (para todo  $a, b \in X$ ):

- (a)  $]a, b[ = \{x \in X : a < x < b\}$ ;
- (b)  $[a, b[ = \{x \in X : a \leq x < b\}$ , caso  $a = \min X$ ;
- (c)  $]a, b] = \{x \in X : a < x \leq b\}$ , caso  $b = \max X$ .

**Exemplo 2.4.7.** As topologias usuais sobre  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{N}$  e  $[0, 1]$  são as topologias induzidas pelas ordens usuais dos respectivos conjuntos.

**Definição 2.4.8.** Sejam  $(X, \leq)$  e  $(Y, \preceq)$  espaços ordenados. Dizemos que  $f : X \rightarrow Y$  é um **isomorfismo de ordem** se  $f$  é bijetora e, para todo  $a, b \in X$ , temos  $a \leq b$  se, e somente se,  $f(a) \preceq f(b)$ .

**Proposição 2.4.9.** *Uma topologia da ordem sempre é de Hausdorff.*

*Demonstração.* Sejam  $(X, \leq)$  um conjunto totalmente ordenado e  $x, y \in X$  tais que  $x \neq y$ . Suponha, sem perda de generalidade, que  $x < y$ . Então, se  $x \neq \min X$  e  $y \neq \max X$ , temos que existem  $\tilde{x}, \tilde{y} \in X$  de modo que  $\tilde{x} < x < y < \tilde{y}$ . Primeiramente, vamos fazer o caso em que existe  $c \in X$  tal que  $x < c < y$ . Neste caso, temos que  $x \in ]\tilde{x}, c[, y \in ]c, \tilde{y}[$  e  $]\tilde{x}, c[ \cap ]c, \tilde{y}[ = \emptyset$ . Já no caso em que não existe tal  $c$ , temos  $x \in ]\tilde{x}, y[, y \in ]x, \tilde{y}[$  e  $]\tilde{x}, y[ \cap ]x, \tilde{y}[ = \emptyset$ .

Para os casos  $x = \min X$  ou  $y = \max X$ , basta tomar conjuntos como  $[x, y[$  e  $]x, y]$  e trabalhar como anteriormente. □

**Definição 2.4.10.** Seja  $(X, \leq)$  um conjunto totalmente ordenado. Dizemos que  $\leq$  é uma **ordem densa** se para todo  $x, y \in X$ , com  $x < y$ , existe  $z \in X$  tal que  $x < z < y$ .

**Exemplo 2.4.11.** Os conjuntos  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$  e  $[0, 1]$  têm as ordens usuais densas enquanto  $\mathbb{N}$  não tem.




Figura 2.5: Construindo o isomorfismo

**Teorema 2.4.12.** *Todo conjunto enumerável, totalmente ordenado com uma ordem densa e sem maior nem menor elementos é isomorfo (e, portanto, homeomorfo) a  $\mathbb{Q}$ .*

Veja o Exercício 2.4.18

*Demonstração.* Seja  $(X, \leq)$  como no enunciado e  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma enumeração para  $X$ . Seja, também,  $\{q_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma enumeração para  $\mathbb{Q}$ . Vamos definir indutivamente  $f : X \rightarrow \mathbb{Q}$  um isomorfismo de ordem: primeiro, definimos  $f(x_0) = q_0$ .

Agora, caso  $x_1 < x_0$ , tomamos  $n = \min\{m : q_m < q_0\}$  e, caso  $x_1 > x_0$ , tomamos  $n = \min\{m : q_0 < q_m\}$  e definimos  $f(x_1) = q_n$ .

Suponha definidos  $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$  e tratemos os casos:

- CASO 1: se  $x_{n+1} < x_i$ , para todo  $i \leq n$ , tomamos  $k = \min\{m : q_m < f(x_i), \forall i \leq n\}$ ;
- CASO 2: se  $x_{n+1} > x_i$ , para todo  $i \leq n$ , tomamos  $k = \min\{m : q_m > f(x_i), \forall i \leq n\}$ ;
- CASO 3: se existem  $i, j \leq n$  tais que  $x_i < x_{n+1} < x_j$ , sejam  $I = \max\{x_m : x_m < x_{n+1}, m \leq n\}$  e  $J = \min\{x_m : x_m > x_{n+1}, m \leq n\}$ . Agora, tomamos  $k = \min\{m : f(I) < q_m < f(J)\}$ .

Definimos  $f(x_{n+1}) = q_k$ . Pela construção,  $f$  preserva a ordem e é injetora.

Vejam que  $f$  é, também, sobrejetora. Para isso, precisamos mostrar que todo  $q_n$  pertence à imagem de  $f$ . Suponha que não. Seja  $m$  o menor índice tal que  $q_m$  não esteja na imagem de  $f$ . Seja

$$n = \min\{p : \forall k < m, \exists s < p \ f(x_s) = q_k\}$$

Temos 3 casos:  $x_n < x_s$  para todo  $s < n$ ,  $x_n > x_s$  para todo  $s < n$  ou existem  $a, b < n$  tais que  $x_a < x_n < x_b$ . Vamos analisar este último caso (os outros são análogos). Sem perda de generalidade, suponha  $x_a$  o maior possível como acima e  $x_b$  o menor possível. Note que, pelo CASO 3 da construção,  $f(x_n) = q_m$  contrariando o fato de  $q_m$  não estar na imagem de  $f$ .  $\square$

A ideia aqui é pegar o primeiro momento em que todos os  $q_k$ 's antes de  $q_m$  já apareceram na imagem.

**Teorema 2.4.13.** *Todo espaço totalmente ordenado, com ordem densa, sem maior nem menor elementos, completo e separável é homeomorfo a  $\mathbb{R}$ .*

*Demonstração.* Seja  $(X, \leq)$  como no enunciado. Seja  $D \subset X$  denso e enumerável. Vamos mostrar que  $D$  satisfaz as hipóteses do teorema anterior (Teorema 2.4.12).

Suponha que  $m$  seja o maior elemento de  $D$ . Sejam  $x_1, x_2 \in X$  tais que  $m < x_1 < x_2$  (tais elementos existem pois  $X$  não possui maior elemento). Note que  $]m, x_2[ \neq \emptyset$  e  $]m, x_2[ \cap D = \emptyset$ . Mas isso é uma contradição pois  $D$  é denso em  $X$ . Analogamente,  $D$  não tem menor elemento.

Suponha que a ordem de  $D$  não seja densa. Então, existem  $d_1, d_2 \in D$  tais que  $d_1 < d_2$  e  $]d_1, d_2[ \cap D = \emptyset$ . Mas, como a ordem em  $X$  é densa,  $]d_1, d_2[ \neq \emptyset$ , o que é, novamente, uma contradição com o fato de  $D$  ser denso em  $X$ .

Seja  $f : D \rightarrow \mathbb{Q}$  o isomorfismo dado pelo teorema anterior. Vamos estender  $f$  para  $X$ , por

$$\tilde{f}(x) = \sup\{f(d) : d \in D, d \leq x\}$$

Note que, pela densidade de  $D$ ,  $\tilde{f}$  preserva a ordem. Pela completude de  $X$ , temos que  $\tilde{f}$  é bijetora (veja o Exercício 2.4.17).  $\square$

**Corolário 2.4.14.** *Sejam  $a, b \in \mathbb{R}$ , com  $a < b$ . Então,  $]a, b[$  é homeomorfo a  $\mathbb{R}$ .*

## Alongamentos

**Alongamento 2.4.15.** Mostre que composição de homeomorfismos é um homeomorfismo.

**Alongamento 2.4.16.** Mostre que “ser uma sequência convergente” é uma propriedade topológica.

**Exercícios**

**Exercício 2.4.17.** Mostre que a função  $\tilde{f}$  construída na demonstração de 2.4.13 é bijetora.

**Exercício 2.4.18.** Se  $X$  e  $Y$  são conjuntos totalmente ordenados e com a topologia da ordem, mostre que se  $f : X \rightarrow Y$  é um isomorfismo de ordem, então  $f$  é um homeomorfismo (quando  $X$  e  $Y$  são considerados com as topologias da ordem).

**Exercício 2.4.19.** Seja  $(X, \leq)$  conjunto totalmente ordenado e com a topologia da ordem. Mostre que se  $X$  tem um **ponto isolado** ( $x$  é isolado se  $\{x\}$  é aberto) então  $\leq$  não é uma ordem densa. Dê um exemplo de que não vale a volta.

**Exercício 2.4.20.** Mostre que  $\mathbb{Q}$  e  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$  são homeomorfos.

**Exercício 2.4.21.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é um **espaço homogêneo** se para todo  $x, y \in X$ , existe  $f : X \rightarrow X$  homeomorfismo de forma que  $f(x) = y$ .

- (a) Mostre que  $\mathbb{R}$  é homogêneo.
- (b) Mostre que  $]a, b[$  é homogêneo.
- (c) Mostre que  $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$  como em 2.1.9 não é homogêneo.

**Exercício 2.4.22.** Dizemos que  $f : X \rightarrow Y$  é uma **função aberta** se  $f[A]$  é aberto para todo  $A$  aberto em  $X$  (definimos uma **função fechada** de maneira análoga). Mostre que, se  $f$  é um homeomorfismo, então  $f$  é aberta.

**Exercício 2.4.23.** Seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua, injetora e aberta. Mostre que, se  $\mathcal{B}$  é uma base em  $Y$ , então  $\{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$  é uma base em  $X$ .

# Capítulo 3

## Produto

### 3.1 Definição e conceitos básicos

Nesta seção, vamos apresentar como fazer o produto entre espaços topológicos. Vamos começar com o produto finito e provar algumas propriedades básicas. Depois, quando fizermos o produto geral, veremos que esses resultados são casos particulares. Mas optamos por esta ordem para acostumar o leitor com algumas notações e ideias.

**Definição 3.1.1.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos. Definimos a **topologia produto** sobre  $X \times Y$  como a topologia gerada pelos conjuntos da forma  $A \times B$ , onde  $A \in \tau$  e  $B \in \sigma$ .

**Observação 3.1.2.** Se  $\mathcal{B}_1$  e  $\mathcal{B}_2$  são bases para  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  respectivamente, então  $\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 : B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$  é base para  $X \times Y$  (veja o Alongamento 3.1.10).

**Proposição 3.1.3.** *Se  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  são espaços de Hausdorff, então  $X \times Y$  também é.*

*Demonstração.* Sejam  $(a, b), (x, y) \in X \times Y$  distintos. Suponha, sem perda de generalidade,  $x \neq a$ . Então, existem  $U, V \in \tau$  disjuntos tais que  $x \in U$  e  $a \in V$ . Note que  $(x, y) \in U \times Y$ ,  $(a, b) \in V \times Y$  e tanto  $U \times Y$ , quanto  $V \times Y$ , são abertos disjuntos.  $\square$

**Proposição 3.1.4.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos, sendo  $(Y, \sigma)$  espaço de Hausdorff e  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua. Então, o gráfico de  $f$  ( $G = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ ) é fechado em  $X \times Y$ .*

*Demonstração.* Seja  $(x, y) \notin G$ . Então,  $y \neq f(x)$ . Sejam  $A, B \in \sigma$  disjuntos tais que  $y \in A$  e  $f(x) \in B$ . Como  $f$  é contínua, seja  $V$  aberto de  $X$  tal que  $x \in V$  e  $f[V] \subset B$ . Note que  $(x, y) \in V \times A$  e  $(V \times A) \cap G = \emptyset$ . De fato, se  $z \in V$ , então  $f(z) \in B$ . Portanto,  $f(z) \notin A$  e  $(z, f(z)) \notin V \times A$ .  $\square$

Considere a função  $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$  dada por  $\pi_X(x, y) = x$ . Note que  $\pi_X$  é contínua ( $\pi_X^{-1}[A] = A \times Y$ ). Esta função é chamada de **função projeção** em  $X$ . O fato de querermos que este tipo de função seja contínua motiva a definição da topologia produto em geral: faremos a “menor” topologia que faz com que estas funções sejam contínuas.

**Definição 3.1.5.** Seja  $\mathcal{F}$  uma família de funções da forma  $f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha$ ,  $\alpha \in A$ , em que  $X$  é um conjunto e cada  $(Y_\alpha, \tau_\alpha)$  é um espaço topológico. Chamamos de **topologia fraca** induzida por  $\mathcal{F}$  a topologia sobre  $X$  gerada pelos conjuntos da forma  $f_\alpha^{-1}[V]$ , onde  $\alpha \in A$  e  $V \in \tau_\alpha$ . Note que, desta forma, cada  $f_\alpha$  é contínua (veja o Alongamento 3.1.13).

**Definição 3.1.6.** Seja  $((X_\alpha, \tau_\alpha))_{\alpha \in A}$  uma família de espaços topológicos. Defina o **produto** dos  $((X_\alpha, \tau_\alpha))_{\alpha \in A}$  como

$$\prod_{\alpha \in A} X_\alpha = \{(x_\alpha)_{\alpha \in A} : x_\alpha \in X_\alpha\}$$

com a topologia fraca induzida pelas funções  $(\pi_\alpha)_{\alpha \in A}$  onde cada  $\pi_\alpha : \prod_{\beta \in A} X_\beta \rightarrow X_\alpha$  é dada por  $\pi_\alpha((x_\alpha)_{\alpha \in A}) = x_\alpha$  (chamamos  $x_\alpha$  de  $\alpha$ -ésima **coordenada** de  $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$ ).

Esta topologia é chamada de **topologia produto** sobre  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  (ou **topologia de Tychonoff**).

**Observação 3.1.7.** Note que tal topologia é gerada pelos conjuntos da forma  $\prod_{\beta \in A} V_\beta$ , onde

$$V_\beta = \begin{cases} V & \text{se } \beta = \alpha \\ X_\beta & \text{se } \beta \neq \alpha \end{cases}$$

onde  $V$  é um aberto de  $X_\alpha$ . Isso é verdade pois  $\pi_\alpha^{-1}[V] = \prod_{\beta \in A} V_\beta$ .

Fechando tal família por interseções finitas, temos uma base para a topologia. Ou seja, uma base para tal espaço é formada por conjuntos da forma:

$$\prod_{\alpha \in A} V_\alpha$$

onde  $\{\alpha \in A : V_\alpha \neq X_\alpha\}$  é finito e cada  $V_\alpha$  é aberto em  $X_\alpha$ . Chamaremos tais abertos de **abertos básicos** do produto.

**Proposição 3.1.8.** *Se  $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$  é uma família tal que cada  $F_\alpha$  é um fechado em  $X_\alpha$ , então  $\prod_{\alpha \in A} F_\alpha$  é fechado em  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ .*

*Demonstração.* Seja  $x = (x_\alpha)_{\alpha \in A} \in \prod_{\alpha \in A} X_\alpha \setminus \prod_{\alpha \in A} F_\alpha$ . Logo, existe  $\alpha \in A$  tal que  $x_\alpha \notin F_\alpha$ . Note que  $V = \prod_{\beta \in A} V_\beta$  onde

$$V_\beta = \begin{cases} X_\alpha \setminus F_\alpha & \text{se } \beta = \alpha \\ X_\beta & \text{se } \beta \neq \alpha \end{cases}$$

é um aberto tal que  $x \in V$  e  $V \cap \prod_{\alpha \in A} F_\alpha = \emptyset$ .  $\square$

**Proposição 3.1.9.** *Se cada  $X_\alpha$  é  $T_i$ , então  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  é  $T_i$ , para  $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ .* Discutiremos as propriedades  $T_{3\frac{1}{2}}$  e  $T_4$  na próxima seção.

*Demonstração.*  $T_0$  Exercício.

$T_1$  Pela proposição anterior e pela caracterização dos unitários serem fechados.

$T_2$  Sejam  $x \neq y$  e  $\alpha \in A$  tais que  $x_\alpha \neq y_\alpha$ . Sejam  $U$  e  $V$  abertos disjuntos de  $X_\alpha$  tais que  $x_\alpha \in U$  e  $y_\alpha \in V$ . Note que  $\prod_{\beta \in A} U_\beta$  e  $\prod_{\beta \in A} V_\beta$ , onde

$$U_\beta = \begin{cases} U & \text{se } \beta = \alpha \\ X_\beta & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$V_\beta = \begin{cases} V & \text{se } \beta = \alpha \\ X_\beta & \text{caso contrário} \end{cases}$$

são abertos que separam  $x$  e  $y$ .

$T_3$  Seja  $x \in \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  e seja  $\prod_{\alpha \in A} V_\alpha$  aberto básico (i.e., cada  $V_\alpha$  é aberto em  $X_\alpha$  e  $\{\alpha \in A : V_\alpha \neq X_\alpha\}$  é finito). Para cada  $\alpha$  tal que  $V_\alpha \neq X_\alpha$  seja  $W_\alpha$  aberto em  $X_\alpha$  tal que  $x_\alpha \in W_\alpha \subset \overline{W_\alpha} \subset V_\alpha$  (usando  $T_3$ ). Note que  $\prod_{\alpha \in A} W_\alpha^*$  é uma vizinhança fechada de  $x$  onde

$$W_\alpha^* = \begin{cases} \overline{W_\alpha}, & V_\alpha \neq X_\alpha \\ X_\alpha, & V_\alpha = X_\alpha \end{cases}$$

Note, também, que  $\prod_{\alpha \in A} W_\alpha^* \subset \prod_{\alpha \in A} V_\alpha$ .  $\square$

### Alongamentos

**Alongamento 3.1.10.** Sejam  $(X_1, \tau_1)$ ,  $(X_2, \tau_2)$  espaços topológicos e sejam  $\mathcal{B}_1$  e  $\mathcal{B}_2$  bases para eles respectivamente. Mostre que  $\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 : B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$  é uma base para  $X_1 \times X_2$ .

**Alongamento 3.1.11.** Mostre que um espaço  $(X, \tau)$  é de Hausdorff se, e somente se,  $D = \{(x, x) \in X \times X : x \in X\}$  é fechado em  $X \times X$ .

**Alongamento 3.1.12.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos não vazios. Seja  $y \in Y$ .

- (a) Mostre que  $(X, \tau)$  é homeomorfo a  $X \times \{y\}$ ;
- (b) Se  $(Y, \sigma)$  é  $T_1$ , mostre que  $X \times \{y\}$  é fechado (em  $X \times Y$ ).

**Alongamento 3.1.13.** Seja  $(f_\alpha)_{\alpha \in A}$  família de funções da forma  $f_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ . Mostre que a topologia fraca em  $X$  induzida por tal família é a menor topologia sobre  $X$  tal que cada  $f_\alpha$  é contínua.

### Exercícios

**Exercício 3.1.14.** Seja  $((X_\alpha, \tau_\alpha))_{\alpha \in A}$  família de espaços topológicos. Para cada  $\alpha \in A$ , seja  $B_\alpha \subset X_\alpha$ . Mostre que  $\overline{\prod_{\alpha \in A} B_\alpha} = \prod_{\alpha \in A} \overline{B_\alpha}$ .

**Exercício 3.1.15.** Sejam  $(X_1, d_1)$  e  $(Y_1, d_1)$  espaços métricos.

O melhor para fazer esse exercício é olhar os exercícios extras abaixo.

- (a) Mostre que  $d_E : (X_1 \times X_2)^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $d_E((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$  é uma métrica sobre  $X_1 \times X_2$  (**métrica euclidiana**).
- (b) Mostre que  $d_T : (X_1 \times X_2)^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $d_T((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$  é uma métrica sobre  $X_1 \times X_2$  (**métrica do taxista**).
- (c) Mostre que  $d_M : (X_1 \times X_2)^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $d_M((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$  é uma métrica sobre  $X_1 \times X_2$  (**métrica do máximo**).
- (d) Mostre que todas as métricas dos itens anteriores induzem a topologia do produto entre  $X_1 \times X_2$  (e, portanto, são todas equivalentes).



**Exercícios extras**

**Definição 3.1.16.** Seja  $V$  um espaço vetorial sobre  $\mathbb{R}$ . Chamos uma função  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  de um **produto interno** se são satisfeitas as seguintes condições, para quaisquer  $a, b, c \in V$  e  $\lambda \in \mathbb{R}$ :

(a)  $\langle a + b, c \rangle = \langle a, c \rangle + \langle b, c \rangle;$

(b)  $\langle \lambda a, b \rangle = \lambda \langle a, b \rangle;$

(c)  $\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle;$

(d)  $\langle a, a \rangle > 0$  se  $a \neq 0$

**Exercício 3.1.17.** Mostre que  $\langle (a, b), (x, y) \rangle = ax + by$  é um produto interno em  $\mathbb{R}^2$ . Este é o produto interno usual de  $\mathbb{R}^2$ .

**Exercício 3.1.18.** Seja  $V$  espaço vetorial sobre  $\mathbb{R}$  com produto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Sejam  $a, b \in V$ .

(a) Suponha  $a \neq 0$ . Mostre que  $\langle a, b - \lambda a \rangle = 0$ , onde  $\lambda = \frac{\langle a, b \rangle}{\langle a, a \rangle}$ .

(b) Suponha  $a \neq 0$ . Mostre que  $\langle b, b \rangle = \langle b - \lambda a, b - \lambda a \rangle + \lambda^2 \langle a, a \rangle$ , onde  $\lambda$  é o mesmo acima.

(c) Suponha  $a \neq 0$ . Mostre que  $\langle b, b \rangle \geq \frac{\langle a, b \rangle^2}{\langle a, a \rangle}$ .

(d) Mostre que  $\langle a, b \rangle^2 \leq \langle a, a \rangle \langle b, b \rangle$ . Esta é a **desigualdade de Cauchy-Schwarz**.

**Definição 3.1.19.** Dado um espaço vetorial  $V$  sobre  $\mathbb{R}$ , dizemos que uma função  $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$  é uma **norma** sobre  $V$  se, dados  $u, v \in V$  e  $\lambda \in \mathbb{R}$ :

(a)  $\|v\| > 0$  se  $v \neq 0$ ;

(b)  $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$ ;

(c)  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ .

**Exercício 3.1.20.** Seja  $V$  espaço vetorial sobre  $\mathbb{R}$  com produto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Mostre que a função  $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  dada por  $\|a\| = \sqrt{\langle a, a \rangle}$  é uma norma sobre  $V$ . Chamamos tal norma de norma induzida pelo produto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ .

**Exercício 3.1.21.** Dada uma  $\|\cdot\|$ , mostre que  $d(x, y) = \|x - y\|$  é uma métrica. Esta é a métrica induzida pela norma  $\|\cdot\|$ .

**Exercício 3.1.22.** Mostre que a métrica euclidiana em  $\mathbb{R}^2$  é a métrica induzida pela norma induzida pelo produto interno usual de  $\mathbb{R}^2$ .

Vamos apresentar aqui o conceito de norma que, em particular, ajuda a provar que a métrica euclidiana é de fato uma métrica.

### 3.2 Algumas propriedades sobre produtos

Os axiomas de enumerabilidade são preservados por produtos enumeráveis. Alguns destes resultados podem ser melhorados - veja a seção de exercícios extras abaixo.

**Proposição 3.2.1.** *Seja  $((X_n, \tau_n))_{n \in \mathbb{N}}$  família de espaços que satisfazem o  $i$ -ésimo axioma de enumerabilidade. Então,  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  também satisfaz o  $i$ -ésimo axioma de enumerabilidade.*

*Demonstração.* • 1.o axioma de enumerabilidade (base local): seja  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ . Seja, também,  $\mathcal{V}_n$  base local enumerável para cada  $x_n$ . Sem perda de generalidade, suponha que  $X_n \in \mathcal{V}_n$ . Note que

$$\left\{ \prod_{n \in \mathbb{N}} V_n : V_n \in \mathcal{V}_n, \{m \in \mathbb{N} : V_m \neq X_m\} \text{ é finito} \right\}$$

é enumerável<sup>1</sup> e é uma base local para  $x$ . De fato, seja  $A = \prod_{n \in \mathbb{N}} A_n$  aberto básico tal que  $x \in A$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $A_n \neq X_n$ , seja  $V_n \in \mathcal{V}_n$  de forma que  $x_n \in V_n \subset A_n$  (existe pois  $\mathcal{V}_n$  é base local para  $x_n$ ). Para  $n$  tal que  $A_n = X_n$ , defina  $V_n = X_n$ . Note que

$$x \in \prod_{n \in \mathbb{N}} V_n \subset \prod_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

- 2.o axioma de enumerabilidade (base enumerável): análogo (veja Alongamento 3.2.15).
- 3.o axioma de enumerabilidade (separabilidade): para cada  $n \in \mathbb{N}$ , seja  $D_n$  denso enumerável em  $X_n$ . Fixe  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ . Defina

$$D = \{(y_n)_{n \in \mathbb{N}} : \exists F \subset \mathbb{N} \text{ finito tal que, para todo } n \in F, y_n \in D_n \text{ e, para todo } n \notin F, y_n = x_n\}.$$

Note que  $D$  é enumerável. Seja  $\prod_{n \in \mathbb{N}} V_n$  aberto básico não vazio. Seja  $F \subset \mathbb{N}$  finito tal que, para  $n \notin F$ ,  $V_n = X_n$ . Para cada  $n \in F$ , seja  $y_n \in V_n \cap D_n$ . Note que  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in D \cap \prod_{n \in \mathbb{N}} V_n$ , onde  $y_n = x_n$ , para  $n \notin F$ . □

O próximo resultado é um bom teste para verificação de continuidade de uma função:

**Teorema 3.2.2.** *Seja  $f : X \rightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  uma função. Então  $f$  é contínua se, e somente se, para todo  $\alpha \in A$ ,  $\pi_\alpha \circ f$  é contínua.*

Um bom teste para ver se você está entendendo é ver quem são o domínio e o contra domínio de cada  $\pi_\alpha \circ f$ .

*Demonstração.* Se  $f$  é contínua, então  $\pi_\alpha \circ f$  é contínua (composta de contínuas). Por outro lado, seja  $V = \prod_{\alpha \in A} V_\alpha$  um aberto básico e  $F = \{\alpha \in A : V_\alpha \neq X_\alpha\}$  (note que  $F$  é finito). Temos assim

$$\begin{aligned} f^{-1}[V] &= f^{-1}[\bigcap_{\alpha \in F} \pi_\alpha^{-1}[V_\alpha]] \\ &= \bigcap_{\alpha \in F} (\pi_\alpha \circ f)^{-1}[V_\alpha]. \end{aligned}$$

Note que o último termo é aberto pois é interseção finita de abertos.  $\square$

**Observação 3.2.3.** Note que o uso do resultado anterior muitas vezes se dá nesta forma:

$f(x)$  dada por  $(f_\alpha(x))_{\alpha \in A}$  é contínua se, e somente se, cada  $f_\alpha$  é contínua.

Vejamos agora o comportamento dos últimos axiomas de separação com relação ao produto:

**Proposição 3.2.4.** *Se cada  $(X_\alpha, \tau_\alpha)$  é  $T_{3\frac{1}{2}}$ , então  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  é  $T_{3\frac{1}{2}}$ .*

*Demonstração.* Seja  $x \in \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  e  $F \subset \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  fechado tal que  $x \notin F$ . Seja  $V = \prod_{\alpha \in A} V_\alpha$  um aberto básico tal que  $x \in V$  e  $V \cap F = \emptyset$ . Seja  $G = \{\alpha \in A : V_\alpha \neq X_\alpha\}$ . Para cada  $\alpha \in G$ , seja  $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow [0, 1]$  contínua tal que  $f_\alpha(x_\alpha) = 0$  e  $f_\alpha[X_\alpha \setminus V_\alpha] = \{1\}$  (estamos usando  $T_{3\frac{1}{2}}$  nas coordenadas).

Considere  $f : \prod_{\alpha \in A} X_\alpha \rightarrow [0, 1]$  dada por  $f(y) = \max\{f_\alpha(y_\alpha) : \alpha \in G\}$ . Note que  $f(x) = 0$ . Além disso,  $f[F] = \{1\}$ , pois se  $y \in F$ , então existe  $\alpha$  tal que  $y_\alpha \notin V_\alpha$ , com  $\alpha \in G$  (caso contrário, teríamos  $V \cap F \neq \emptyset$ ), donde  $f_\alpha(y_\alpha) = 1$ . Resta provar que  $f$  é contínua. De fato, para cada  $\alpha \in G$ , defina  $g_\alpha = f_\alpha \circ \pi_\alpha$ . Note que cada  $g_\alpha$  é contínua e também que  $f(x) = \max\{g_\alpha(x) : \alpha \in G\}$  e, portanto,  $f$  é contínua (ver Alongamento 3.2.13).  $\square$

**Proposição 3.2.5.**  $\mathbb{R}_S \times \mathbb{R}_S$  não é normal, onde  $\mathbb{R}_S$  é a reta de Sorgenfrey. Logo, produto de normais não é necessariamente normal.

*Demonstração.* Considere  $\mathbb{R}_S$ . Como já vimos,  $\mathbb{R}_S$  é normal. Vamos mostrar que  $\mathbb{R}_S \times \mathbb{R}_S$  não é normal. Considere  $D = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R}_S\}$ . Note que

<sup>1</sup>note que a quantidade de conjuntos finitos de  $\mathbb{N}$  é enumerável e que, para cada  $F$  finito fixado, só existe uma quantidade enumerável de possibilidades de abertos

$D$  é discreto e fechado: os conjuntos da forma  $[x, x + 1[ \cap ]-x, -x + 1[ \cap D = \{(-x, x)\}$  são abertos, donde segue que  $D$  é discreto; para verificar que é fechado, basta notar que seu complementar é aberto (Exercício 3.2.14).

Note que  $\mathbb{R}_S \times \mathbb{R}_S$  é separável. Logo,  $\mathbb{R}_S \times \mathbb{R}_S$  tem um denso enumerável e um discreto fechado de tamanho contínuo. Logo, pelo Lema de Jones (Exercício 2.3.10),  $\mathbb{R}_S \times \mathbb{R}_S$  não é normal.  $\square$

Vamos agora caminhar para um teorema que iremos usar diversas vezes no texto: o teorema da imersão.

**Definição 3.2.6.** Sejam  $((X_\alpha, \tau_\alpha))_{\alpha \in A}$  uma família de espaços topológicos,  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $(f_\alpha)_{\alpha \in A}$  uma família de funções da forma  $f_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ . Chamamos de **função diagonal** a função

$$\begin{aligned} \Delta_{\alpha \in A} f_\alpha : X &\rightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha \\ x &\mapsto (f_\alpha(x))_{\alpha \in A} \end{aligned}$$

**Observação 3.2.7.** Se cada  $f_\alpha$  é contínua, então  $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha$  é contínua (por 3.2.2).

**Definição 3.2.8.** Dizemos que  $f : X \rightarrow Y$  é uma **imersão** se  $f : X \rightarrow f[X]$  é um homeomorfismo. Dizemos neste caso que  $Y$  contém uma **cópia** de  $X$  (como subespaço).

**Definição 3.2.9.** Seja  $\mathcal{F} = \{f_\alpha : X \rightarrow X_\alpha \mid \alpha \in A\}$ . Dizemos que  $\mathcal{F}$  **separa pontos** se para quaisquer  $x, y \in X$  distintos, existe  $f \in \mathcal{F}$  tal que  $f(x) \neq f(y)$ . Dizemos que  $\mathcal{F}$  **separa pontos de fechados** se, para todo  $x \in X$  e  $F \subset X$  fechado tal que  $x \notin F$ , existe  $f \in \mathcal{F}$  tal que  $f(x) \notin \overline{f[F]}$ .

**Teorema 3.2.10 (Teorema da imersão).** *Seja  $\mathcal{F} = \{f_\alpha : X \rightarrow X_\alpha \mid \alpha \in A\}$  família de funções contínuas. Se  $\mathcal{F}$  separa pontos, então  $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha : X \rightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  é injetora. Se, além disso,  $\mathcal{F}$  separa pontos de fechados, então  $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha$  é uma imersão.*

*Demonstração.* Sejam  $x, y \in X$ , distintos. Então existe  $\beta \in A$  tal que  $f_\beta(x) \neq f_\beta(y)$ . Então

$$(\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(x))_\beta \neq (\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(y))_\beta$$

pois  $(\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(x))_\beta = f_\beta(x)$  e  $(\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(y))_\beta = f_\beta(y)$ .

Já temos que a aplicação é contínua pela Observação 3.2.7. Do parágrafo acima,  $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha$  é injetora. Resta mostrar que  $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha[F]$  é fechado para todo  $F \subset X$  fechado (pois disso segue que sua “inversa” é contínua).

Sejam  $z \in \overline{\Delta_{\alpha \in A} f_{\alpha}[F]} \cap \Delta_{\alpha \in A} f_{\alpha}[X]$  e  $x \in X$  tais que  $\Delta_{\alpha \in A} f_{\alpha}(x) = z$ . Vamos mostrar que  $x \in F$  (e, portanto, que  $z \in \Delta_{\alpha \in A} f_{\alpha}[F]$ ). Suponha que não. Logo existe  $\beta \in A$  tal que  $f_{\beta}(x) \notin \overline{f_{\beta}[F]}$  (pois tal família separa pontos de fechados). Seja  $V_{\beta} \subset X_{\beta}$  aberto tal que  $f_{\beta}(x) \in V_{\beta}$  e  $V_{\beta} \cap f_{\beta}[F] = \emptyset$ . Para todo  $\alpha \in A$ , com  $\alpha \neq \beta$ , denote  $V_{\alpha} = X_{\alpha}$ . Seja  $V = \prod_{\alpha \in A} V_{\alpha}$ . Note que  $z \in V$ , pois  $z_{\beta} = f_{\beta}(x) \in V_{\beta}$ . Note que  $V \cap \Delta_{\alpha \in A} f_{\alpha}[F] = \emptyset$ , pois  $V_{\beta} \cap f_{\beta}[F] = \emptyset$ . Logo  $z \notin \overline{\Delta_{\alpha \in A} f_{\alpha}[F]}$ , contradição.  $\square$

Já vamos mostrar uma aplicação importante (e um pouco surpreendente) de tal teorema:

**Proposição 3.2.11.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço completamente regular. Então  $\mathcal{F} = \{f : X \rightarrow [0, 1] \mid f \text{ é contínua}\}$  separa pontos de fechados.*

*Demonstração.* Decorre diretamente da forma como construímos  $\mathcal{F}$  e do fato de  $X$  ser completamente regular.  $\square$

**Corolário 3.2.12.** *Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Então  $(X, \tau)$  é completamente regular se, e somente se, existe  $A$  tal que  $(X, \tau)$  é homeomorfo a um subespaço de  $\prod_{\alpha \in A} [0, 1]$ .*

*Demonstração.* Como  $[0, 1]$  é completamente regular,  $\prod_{\alpha \in A} [0, 1]$  é completamente regular e, portanto, qualquer um de seus subespaços também é. Reciprocamente, se  $(X, \tau)$  for completamente regular, basta indexar  $\mathcal{F} = \{f : X \rightarrow [0, 1] \mid f \text{ é contínua}\}$ , donde o resultado segue pelo teorema da imersão.  $\square$

O fato de podermos “colocar”  $X$  dentro de um espaço desta forma terá muitas consequências interessantes.

## Alongamentos

**Alongamento 3.2.13.** Mostre que, se  $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$  são funções contínuas, então  $g(x) = \max\{f_1(x), \dots, f_n(x)\}$  é contínua (isso termina a demonstração da Proposição 3.2.4).

**Alongamento 3.2.14.** Mostre que o conjunto  $D$  construído na demonstração da Proposição 3.2.5 é fechado.

**Alongamento 3.2.15.** Mostre que, se cada  $(X_n, \tau_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tem base enumerável, então  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  também tem base enumerável.

**Alongamento 3.2.16.** Mostre diretamente que se  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  são separáveis, então  $X \times Y$  é separável.

### Exercícios

**Exercício 3.2.17.** Considere  $((X_n, d_n))_{n \in \mathbb{N}}$  espaços métricos. Sem perda de generalidade, podemos supor que cada  $d_n$  é limitada por 1 (ver o Exercício 1.1.53).

- (a) Mostre que  $d : \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n \times \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $d(x, y) = \sup\{d_n(x(n), y(n)) : n \in \mathbb{N}\}$  é uma métrica sobre  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ . Esta é chamada de **métrica produto**.
- (b) Mostre que não necessariamente a topologia induzida pela métrica produto é a mesma que a topologia produto (induzida pela topologia de cada uma das coordenadas). Uma delas tem mais abertos que a outra. Qual?
- (c) Mostre que se o produto tiver apenas finitas coordenadas, ambas topologias coincidem.

**Exercício 3.2.18.** O objetivo deste exercício é mostrar que  $\mathbb{R}_S$  (reta de Sorgenfrey) não tem base enumerável de uma maneira alternativa.

- (a) Suponha que  $\mathbb{R}_S$  tem base enumerável. Note que  $\mathbb{R}_S \times \mathbb{R}_S$  também tem.
- (b) Considere  $D$  o conjunto determinado em 3.2.5. Note que tal conjunto não tem base enumerável.
- (c) Lembre que subespaço de conjunto com base enumerável também tem base enumerável. Chegue numa contradição.

### 3.3 Exercícios extras

Aqui vamos apresentar o resultado que mostra que a separabilidade ainda é preservada, mesmo com produtos de comprimento contínuo. Nestes exercícios, vamos usar um pouco mais de argumentos de teoria dos conjuntos do que o usual neste texto.

**Exercício 3.3.1.** O objetivo deste exercício é mostrar que  $\prod_{\alpha \in A} \mathbb{N}$  é separável se  $|A| \leq \mathfrak{c}$  ( $\mathbb{N}$  com a topologia usual).

- (a) Note que podemos supor sem perda de generalidade que  $A \subset \mathbb{R}$ . Seja  $\mathcal{B}_0 = \{]p, q[ \cap A : p < q \in \mathbb{Q}\}$ . Note que  $\mathcal{B}_0$  é enumerável.
- (b) Para cada  $n > 0$ , defina  $\mathcal{B}_n$  o conjunto de todos os subconjuntos de  $\mathcal{B}_0$  com exatamente  $n$  elementos e que sejam 2-2 disjuntos. Note que cada  $\mathcal{B}_n$  é enumerável (use o fato que a quantidade de subconjuntos finitos de um conjunto enumerável é enumerável).

- (c) Fixe  $n \geq 1$ . Para cada  $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^n$  e cada  $\{J_1, \dots, J_n\} \in \mathcal{B}_n$  (vamos supor que  $J_i < J_j$  se  $i < j$  Isto é, todo elemento de  $J_i$  é menor que todo elemento de  $J_j$ ). Defina  $f_{(a_1, \dots, a_n), \{J_1, \dots, J_n\}} : A \rightarrow \mathbb{N}$  por

$$f_{(a_1, \dots, a_n), \{J_1, \dots, J_n\}}(\alpha) = \begin{cases} a_i & \text{se } \alpha \in J_i \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Note que o conjunto de todas estas funções é enumerável (com  $n$  fixado). Seja  $D$  o conjunto de todas essas funções (com  $n$  variando). Note que  $D$  também é enumerável.

- (d) Note que  $D \subset \prod_{\alpha \in A} \mathbb{N}$ .  
 (e) Mostre que  $D$  é denso em  $\prod_{\alpha \in A} \mathbb{N}$ .

**Exercício 3.3.2.** O objetivo deste exercício é mostrar que se cada  $(X_\alpha, \tau_\alpha)$  é separável, então  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  também é separável se  $|A| \leq \mathfrak{c}$ .

- (a) Fixe  $D_\alpha \subset X_\alpha$  denso enumerável em cada  $X_\alpha$ . Mostre que  $\prod_{\alpha \in A} D_\alpha$  é denso em  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ ;  
 (b) Para cada  $\alpha \in A$ , seja  $\varphi_\alpha : \mathbb{N} \rightarrow D_\alpha$  bijetora. Note que cada  $\varphi_\alpha$  é contínua.  
 (c) Defina  $f : \prod_{\alpha \in A} \mathbb{N} \rightarrow \prod_{\alpha \in A} D_\alpha$ . Mostre que  $f$  é contínua.  
 (d) Conclua que  $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$  é separável.





## Capítulo 4

# Compactos

### 4.1 Definição e propriedades básicas

**Definição 4.1.1.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Dizemos que  $\mathcal{A}$  é uma **cobertura** (ou **recobrimento**) de  $X$  se  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = X$ . Neste caso, chamamos  $\mathcal{A}$  de **cobertura aberta** se os elementos de  $\mathcal{A}$  são abertos.

**Definição 4.1.2.** Dizemos que o espaço topológico  $(X, \tau)$  é um **espaço compacto** se para toda cobertura aberta  $\mathcal{A}$  de  $X$  existe uma **subcobertura**  $\mathcal{A}'$  (i.e.,  $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$  e  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}'} A = X$ ) finita.

**Exemplo 4.1.3.** Qualquer espaço finito é compacto.

**Proposição 4.1.4.** *É equivalente a ser compacto: “toda cobertura formada por abertos básicos admite subcobertura finita”.*

*Demonstração.* Que compacto implica tal propriedade é imediato.

Por outro lado, seja  $\mathcal{B}$  uma base para  $(X, \tau)$  e seja  $\mathcal{A}$  cobertura aberta para  $X$ . Para cada  $x \in X$ , existe  $A_x \in \mathcal{A}$  tal que  $x \in A_x$ . Para cada  $x$ , seja  $B_x \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B_x \subset A_x$ . Sejam  $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$  tais que  $\bigcup_{i=1}^n B_{x_i} = X$  (aqui, usamos o fato que  $\{B_x : x \in X\}$  é uma cobertura por abertos básicos). Note que  $\bigcup_{i=1}^n A_{x_i} = X$  (pois cada  $A_{x_i} \supset B_{x_i}$ ).  $\square$

**Exemplo 4.1.5.**  $[0, 1]$  é compacto.

De fato, seja  $\mathcal{A}$  uma cobertura aberta para  $[0, 1]$  formada por abertos básicos (intervalos). Sejam

$$C = \{x \in [0, 1] : \exists \mathcal{A}' \subset \mathcal{A} \text{ finito, com } \bigcup_{A \in \mathcal{A}'} A \supset [0, x]\}$$

$$\alpha = \sup C$$

Tal supremo está bem definido já que  $0 \in C$  e por  $C$  ser limitado por 1. Vamos mostrar que  $\alpha = 1$ . Suponha que não. Ou seja,  $\alpha < 1$ . Seja  $]a, b[ \subset A \in \mathcal{A}$  tal que  $\alpha \in ]a, b[$ . Como  $\alpha$  é supremo, existe  $\beta \in ]a, b[ \cap C$ . Logo, existe uma subcobertura finita  $\mathcal{A}'$  para  $[0, \beta]$ . Note que  $\mathcal{A}' \cup \{A\}$  é uma subcobertura finita para  $[0, \frac{\alpha+\beta}{2}]$ , o que contraria a escolha de  $\alpha$ , pois  $\alpha < \frac{\alpha+\beta}{2}$ . Logo,  $\alpha = 1$ .

Seja  $]a, 1] \in \mathcal{A}$  (existe pois 1 é coberto por algum elemento de  $\mathcal{A}$ ). Como  $\alpha = \sup C$ , existe  $\beta \in ]a, 1] \cap C$ . Isto é, existe subcobertura finita  $\mathcal{A}'$  para  $[0, \beta]$ . Note que  $\mathcal{A}' \cup \{A\}$  é subcobertura finita para  $[0, 1]$ .

**Exemplo 4.1.6.**  $\mathbb{R}$  não é compacto. Para ver isso, basta tomar a cobertura  $\{] - n, n[ : n \in \mathbb{N}\}$ .

**Proposição 4.1.7.** *Seja  $(X, \tau)$  espaço compacto e seja  $F \subset X$  fechado. Então  $F$  é compacto.*

*Demonstração.* Suponha  $F$  fechado. Seja  $\mathcal{A}$  uma cobertura aberta para  $F$  e, para cada  $A \in \mathcal{A}$ , seja  $A^*$  aberto em  $X$  tal que  $A^* \cap F = A$ . Seja  $\mathcal{A}^* = \{A^* : A \in \mathcal{A}\}$ . Note que  $\mathcal{A}^* \cup \{X \setminus F\}$  é uma cobertura aberta para  $X$ . Como  $X$  é compacto, tal cobertura admite subcobertura finita  $\mathcal{B}$ . Note, também, que  $\mathcal{B} \setminus \{X \setminus F\}$  induz uma subcobertura finita de  $\mathcal{A}$ .  $\square$

Se um espaço é de Hausdorff, ele separa pontos de compactos (vamos ver que dá para melhorar ainda mais esse resultado depois).

**Lema 4.1.8.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço de Hausdorff. Sejam  $x \in X$  e  $K \subset X$  compacto tal que  $x \notin K$ . Então existem  $A$  e  $B$  abertos tais que  $x \in A$ ,  $K \subset B$  e  $A \cap B = \emptyset$ .*

*Demonstração.* Para cada  $y \in K$ , sejam  $A_y$  e  $B_y$  abertos tais que  $x \in A_y$ ,  $y \in B_y$  e  $A_y \cap B_y = \emptyset$ . Como  $K$  é compacto, existem  $y_1, \dots, y_n \in K$  tais que  $\bigcup_{i=1}^n B_{y_i} \supset K$ . Agora, sejam

$$A = \bigcap_{i=1}^n A_{y_i} \quad \text{e} \quad B = \bigcup_{i=1}^n B_{y_i}.$$

Veja que ambos são abertos,  $x \in A$  e  $F \subset B$ . Vamos mostrar que  $A \cap B = \emptyset$ . Suponha, por contradição, que  $z \in A \cap B$ . Seja  $i$  tal que  $z \in B_{y_i}$ . Note que, assim,  $z \in A_{y_i}$ , que é contradição com o fato que  $A_{y_i} \cap B_{y_i} = \emptyset$ .  $\square$

**Proposição 4.1.9.** *Sejam  $(X, \tau)$  espaço de Hausdorff e  $F \subset X$  compacto. Então  $F$  é fechado.*

*Demonstração.* Pelo resultado anterior, temos em particular que se  $x \notin F$ , existe  $A$  aberto tal que  $x \in A \subset X \setminus F$ .  $\square$

**Corolário 4.1.10.** *Sejam  $(X, \tau)$  um espaço compacto de Hausdorff e  $F \subset X$  um conjunto. Então,  $F$  é fechado se, e somente se,  $F$  é compacto.*

Vamos ver que, na verdade, espaços Hausdorff separam compactos disjuntos.

**Proposição 4.1.11.** *Seja  $(X, \tau)$  espaço Hausdorff. Sejam  $F, G \subset X$  compactos disjuntos. Então existem  $A, B$  abertos disjuntos tais que  $F \subset A$  e  $G \subset B$ .*

*Demonstração.* Sejam  $F, G \subset X$  compactos disjuntos. Pelo Lema 4.1.8, para cada  $y \in G$ , sejam  $A_y, B_y$  abertos tais que  $A_y \supset F$ ,  $y \in B_y$  e  $A_y \cap B_y = \emptyset$ . Como  $G$  é compacto (pois é fechado num compacto), existem  $y_1, y_2, \dots, y_n \in G$  tais que  $\bigcup_{i=1}^n B_{y_i} \supset G$ . Agora, sejam

$$A = \bigcap_{i=1}^n A_{y_i} \quad \text{e} \quad B = \bigcup_{i=1}^n B_{y_i}.$$

$A$  e  $B$  são abertos,  $F \subset A$ ,  $G \subset B$  e  $A \cap B = \emptyset$ .  $\square$

Com isso, temos que em espaços compactos, basta a propriedade de Hausdorff para termos a normalidade:

**Proposição 4.1.12.** *Todo espaço compacto de Hausdorff é normal.*

*Demonstração.* Basta notar que fechados são compactos e aplicar o resultado anterior.  $\square$

**Proposição 4.1.13.** *Sejam  $(X, \tau)$ ,  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos onde  $X$  é compacto e  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua e sobrejetora. Então  $Y$  é compacto.*

*Demonstração.* Seja  $\mathcal{A}$  uma cobertura aberta para  $Y$ . Note que  $\mathcal{B} = \{f^{-1}[A] : A \in \mathcal{A}\}$  é uma cobertura aberta para  $X$ . Então, existe  $\mathcal{B}'$  subcobertura finita. Assim, se para cada  $B \in \mathcal{B}'$  tomamos  $A_B \in \mathcal{A}$  tal que  $B = f^{-1}[A_B]$ , temos que  $\{A_B \in \mathcal{A} : B \in \mathcal{B}'\}$  é uma subcobertura finita para  $Y$ .  $\square$

**Corolário 4.1.14.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos, sendo  $Y$  espaço de Hausdorff, e seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua. Se  $F \subset X$  é compacto, então  $f[F]$  é fechado.*

*Demonstração.* Segue imediatamente do resultado anterior e da Proposição 4.1.9.  $\square$

**Corolário 4.1.15.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \tau)$  espaços de Hausdorff, sendo  $X$  compacto, e seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua e bijetora. Então,  $f$  é um homeomorfismo.*

*Demonstração.* Basta usar o resultado que se imagem inversa de fechado é fechado, então a função é contínua (Alongamento 2.1.14).  $\square$

Vamos agora olhar para uma versão “local” da compacidade:

**Definição 4.1.16.** Dizemos que o espaço topológico  $(X, \tau)$  é **localmente compacto** se todo  $x \in X$  admite um sistema fundamental de vizinhanças compactas.

**Proposição 4.1.17.** *Se  $(X, \tau)$  é um espaço compacto de Hausdorff, então  $X$  é localmente compacto.*

*Demonstração.* Note que  $X$  é regular. Portanto, todo  $x \in X$  admite um sistema fundamental de vizinhanças fechadas, logo, compactas.  $\square$

**Exemplo 4.1.18.**  $\mathbb{R}$  é localmente compacto, pois cada  $[a, b]$  é compacto.

**Proposição 4.1.19.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço localmente compacto de Hausdorff. Então,  $(X, \tau)$  é completamente regular.*

*Demonstração.* Sejam  $x \in X$  e  $F \subset X$  fechado tais que  $x \notin F$ . Então,  $x \in X \setminus F$ , que é aberto. Logo, existe  $V$  vizinhança compacta de  $x$ , tal que  $V \subset X \setminus F$ . Seja  $A$  aberto tal que  $x \in A \subset V$ . Note que  $V \setminus A$  é fechado. Como  $V$  é compacto,  $V$  é completamente regular (pois é normal). Então, existe  $g : V \rightarrow [0, 1]$  contínua tal que  $g(x) = 0$  e  $g[V \setminus A] = \{1\}$ . Defina  $f : X \rightarrow [0, 1]$  como

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x \in V \\ 1, & x \notin V \end{cases}$$

Note que  $f$  é a função desejada (veja Alongamento 4.1.25).  $\square$

## Alongamentos

**Alongamento 4.1.20.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Seja  $\mathcal{B}$  uma base para  $(X, \tau)$ . Mostre que  $\mathcal{B}$  é um recobrimento aberto para  $(X, \tau)$ .

**Alongamento 4.1.21.** Mostre que a reta de Sorgenfrey não é compacta.

**Alongamento 4.1.22.** Caracterize os compactos discretos.

**Alongamento 4.1.23.** Dizemos que uma família de subconjuntos  $\mathcal{F}$  satisfaz a **propriedade da intersecção finita (p.i.f.)** se, para todo  $F \subset \mathcal{F}$  finito, temos que  $\bigcap_{G \in F} G \neq \emptyset$ . Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Mostre que “ $X$  ser compacto” é equivalente a “toda  $\mathcal{F}$  família de fechados de  $X$  com p.i.f., é tal que  $\bigcap_{G \in \mathcal{F}} G \neq \emptyset$ ”.

**Alongamento 4.1.24.** Seja  $(X, \tau)$  espaço compacto. Seja  $(Y, \sigma)$  espaço de Hausdorff tal que  $Y \supset X$ . Mostre que  $X$  é fechado em  $Y$ .

**Alongamento 4.1.25.** Mostre que a função  $f$  da Proposição 4.1.19 é a função desejada.

**Alongamento 4.1.26.** Mostre que compacidade é uma propriedade topológica (i.e, é preservada via homeomorfismos).

**Alongamento 4.1.27.** Seja  $(X, \tau)$  espaço de Hausdorff. Mostre que  $(X, \tau)$  é localmente compacto se, e somente se, para todo  $x \in X$  existe  $V$  aberto tal que  $x \in V$  e  $\bar{V}$  é compacto.

## Exercícios

**Exercício 4.1.28.** Mostre que  $[0, 1]$  não é homeomorfo a  $\mathbb{R}$ .

**Exercício 4.1.29.** Seja  $(X, d)$  espaço métrico. Mostre que se  $F \subset X$  é compacto, então  $F$  é fechado e limitado (um conjunto  $A$  é dito **limitado** se existe  $r \in \mathbb{R}_{>0}$  tal que  $A \subset B_r(x)$  para algum  $x \in X$ ).

**Exercício 4.1.30.** Seja  $(X, \tau)$  Hausdorff. Mostre que  $X$  é localmente compacto se, e somente se, para cada  $x \in X$  existe  $\mathcal{V}$  sistema fundamental de vizinhanças para  $x$  tal que  $\bar{V}$  é compacto para cada  $V \in \mathcal{V}$ .

**Exercício 4.1.31.** Seja  $(X, \tau)$  Hausdorff. Mostre que  $X$  é localmente compacto se, para todo  $x \in X$  existe  $K$  vizinhança compacta de  $x$ .

**Exercício 4.1.32.** Seja  $(X, \tau)$  espaço de Hausdorff. Dizemos que  $(Y, \sigma)$  espaço de Hausdorff é uma **compactificação** de  $X$  se  $X$  é um subespaço denso de  $Y$  e  $(Y, \sigma)$  é compacto. Dizemos que uma compactificação  $(Y, \sigma)$  é uma **compactificação de Alexandroff** se  $Y = X \cup \{x\}$  onde  $x \notin X$ .

(a) Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico de Hausdorff que admite uma compactificação. Mostre que  $(X, \tau)$  é completamente regular.

- (b) Considere  $(X, \tau)$  espaço localmente compacto. Defina  $Y = X \cup \{x\}$  onde  $x \notin X$ . Defina  $\sigma$  topologia sobre  $Y$  de forma que  $\tau \subset \sigma$  e todo  $\{x\} \cup (X \setminus K) \in \sigma$  onde  $K \subset X$  é compacto. Mostre que  $(Y, \sigma)$  é uma compactificação de Alexandroff de  $X$ .
- (c) Seja  $(X, \tau)$  espaço de Hausdorff e suponha que exista  $(Y, \sigma)$  compactificação de Alexandroff para  $X$ . Mostre que  $(X, \tau)$  é localmente compacto.
- (d) Conclua que um espaço de Hausdorff é localmente compacto se, e somente se, admite uma compactificação de Alexandroff.

# Dicas de alguns exercícios

## 1.1.50

**d** Para o lado  $\bar{A} \subset A \cup \partial A$ , considere  $x \in \bar{A}$ . Note que se  $x \in A$ , é trivial. No caso que  $x \notin A$ , mostre que  $x \in \partial A$ .

## 1.1.60

**e** Suponha que não e use os itens anteriores.

## 1.2.16

**a** Comece com  $A \in \tau$  e  $x \in A$ . Use o fato que  $\mathcal{B}$  é base. Depois use a propriedade do enunciado. Mostre que  $A \in \sigma$ .

**1.3.21** Veja a Proposição **1.1.15**.

## 1.3.30

**a** Mostre que tal conjunto é fechado por intersecções finitas.

**d** Considere o conjunto  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ . Mostre que tal conjunto não pode ser separado do ponto 0.

**1.3.31** Lembre que os racionais são enumeráveis.

**1.4.27** Fixe uma base local enumerável para cada ponto, mostre que a união de todas elas forma uma base.

**1.4.37** Veja a demonstração da proposição **1.3.20**. Use o fato da existência de uma base enumerável para construir o análogo das famílias  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  e  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**1.4.38** Considere  $\mathcal{A} = \{(B_1, B_2) \in \mathcal{B}^2 : B_1 \subset B_2\}$ . Fixe  $C' \in \mathcal{C}$ . Para cada  $(B_1, B_2) \in \mathcal{A}$ , se existir  $C \in \mathcal{C}$  de forma que  $B_1 \subset C \subset B_2$ , então escolha  $C_{B_1, B_2}$  como um destes elementos. Se não existir, simplesmente faça  $C_{B_1, B_2} = C'$ . Note que  $\mathcal{C}' = \{C_{B_1, B_2} : (B_1, B_2) \in \mathcal{A}\}$  é enumerável. Mostre que  $\mathcal{C}'$  é base.

**2.1.20**

a Use o Alongamento 2.1.14.

c Considere  $X = [0, 1]$ ,  $F_1 = \{0\}$  e  $F_2 = ]0, 1]$ .

**2.1.22** Suponha  $x_n \rightarrow x$ . Note que a sequência  $y_{2n} = x_n$  e  $y_{2n+1} = x$  também é convergente.

**2.4.16** Mostre que se  $f : X \rightarrow Y$  é um homeomorfismo, então  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência convergente em  $X$  se, e somente se,  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência convergente em  $Y$ . Lembre que funções contínuas levam sequências convergentes em sequências convergentes (Proposição 2.1.11).

**2.4.17** Para mostrar que  $\tilde{f}$  é bijetora, considere  $x \in \mathbb{R}$ , mostre que  $f(a) = x$ , onde  $a = \sup\{d \in D : f(d) \leq x\}$ .

**2.4.19** Considere  $[0, 1] \cup [2, 0]$ .

**2.4.21**

b Use o Corolário 2.4.14 e o item (a).

**3.1.13** Mostre que em tal topologia, cada uma das  $f_\alpha$ 's é contínua. Mostre que se um dos abertos da definição da topologia fraca não estiver na topologia, então alguma das  $f_\alpha$ 's não é contínua.

**3.2.14** Considere  $(x, y) \notin D$ . Mostre que existe uma vizinhança básica de  $(x, y)$  que não intercepta  $D$ . Faça um desenho e separe em casos que fica mais fácil.

**3.2.15** Considere conjuntos da forma  $\prod_{n \in \mathbb{N}} B_n$  onde  $B_n$  é elemento de alguma base se  $n < n_0$  e  $B_n = X_n$  caso contrário.

b Primeiro tome o conjunto de todos os subconjuntos com  $n$  elementos. Tal conjunto é enumerável pelo resultado do enunciado. Depois tome o subconjunto deste cujo os elementos sejam 2-2 disjuntos.



c Elas são indexadas por coisas enumeráveis (com  $n$  fixado).

e Fixe um aberto básico. Olhe as coordenadas em que ele é diferente de  $\mathbb{N}$ . Escolha intervalos abertos disjuntos (de  $\mathbb{R}$ ) em torno de tais coordenadas (que são finitas). Construa uma  $f \in D$  com tais intervalos e que esteja no aberto básico.

### 3.3.2

b Basta notar que  $\mathbb{N}$  é discreto.

d Use o fato que imagem contínua de separável é separável e que denso em denso é denso.

4.1.28 Use o fato que  $[0, 1]$  é compacto.

### 4.1.32

a Basta notar que é subespaço de um compacto Hausdorff.

c Escreva  $Y = X \cup \{x\}$ . Seja  $a \in X$ . Sejam  $A, B$  abertos (em  $Y$ ) disjuntos tais que  $a \in A$ ,  $x \in B$ . Note que  $\bar{A} \subset X$  é compacto.



# Soluções de alguns exercícios

## 1.1.47

b Vamos mostrar que  $X \setminus (F \cup G)$  é aberto. Se mostrarmos que  $X \setminus (F \cup G) = (X \setminus F) \cap (X \setminus G)$ , seguirá que o complementar de  $F \cup G$  é aberto por ser a interseção (finita) de abertos, o que acarretará que  $F \cup G$  é fechado. De fato, se  $x \in X \setminus (F \cup G)$ , segue que  $x \in X$  e  $x \notin F$  e  $x \notin G$ , e daí decorre que  $x \in (X \setminus F) \cap (X \setminus G)$ . Reciprocamente, se  $x \in (X \setminus F) \cap (X \setminus G)$ , segue que  $x \in X$  e  $x \notin F$  e  $x \notin G$ , ou equivalentemente,  $x \in X$  e  $x \notin F \cup G$ , acarretando a igualdade desejada.

c Note que se  $\mathcal{A}$  é uma família não vazia de conjuntos, então

$$X \setminus \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} X \setminus A$$

Da igualdade acima, e do fato de que cada membro de  $\mathcal{F}$  possui o complementar aberto, o temos (c).

1.1.48 Por definição,  $\overset{\circ}{A}$  é a reunião dos abertos contidos em  $A$ . Daí, se  $x \in V$  para algum  $V$  aberto contido em  $A$ , temos  $x \in \overset{\circ}{A}$ . A recíproca é imediata.

1.1.56 Seja  $F \subset Y$  fechado em  $Y$ . Então  $Y \setminus F$  é aberto em  $Y$ . Logo, existe  $A \subset X$  um aberto em  $X$  tal que  $A \cap Y = Y \setminus F$ . Vamos mostrar que  $F' = X \setminus A$  satisfaz o que desejamos. Primeiramente, note que  $F'$  é fechado em  $X$  (pois é complementar de um aberto). Agora só precisamos mostrar que, de fato,

$$F = F' \cap Y$$

Seja  $y \in F$ . Então  $y \notin Y \setminus F$  e, portanto,  $y \notin A$ . Assim,  $y \in X \setminus A$  e, portanto,  $y \in Y \cap (X \setminus A) = F'$ . A outra inclusão segue de maneira análoga (e é um bom alongamento para o leitor).

Agora precisamos mostrar que, dado  $F'$  fechado em  $X$ ,  $F' \cap Y$  é fechado em  $Y$ . Isso decorre imediatamente do fato que  $Y \setminus (Y \cap F') = Y \cap (X \setminus F')$ . Logo,  $Y \setminus (Y \cap F')$  é aberto em  $Y$  e, portanto,  $Y \cap F'$  é fechado em  $Y$ .

**1.1.57** Suponha  $F \subset Y$  fechado em  $Y$ . Então existe  $F' \subset X$  fechado em  $X$  tal que  $F' \cap Y = F$ . Logo,  $F'$  é fechado em  $X$  (por ser interseção de fechados). Agora suponha  $F \subset Y$  fechado em  $X$ . Note que  $F = F \cap Y$  e, portanto,  $F$  é fechado em  $Y$ .

**1.1.58** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $Y \subset X$  um subespaço aberto. Então  $A \subset Y$  é aberto em  $Y$  se, e somente se, for aberto em  $X$ .

A demonstração é análoga a da Proposição **1.1.57**.

**1.2.15** Suponha  $x \in \bar{A}$ . Seja  $V \in \mathcal{V}$ , então existe  $U \subset V$  aberto tal que  $x \in U$ . Como  $x \in \bar{A}$ , obtemos  $U \cap A \neq \emptyset$  e, portanto,  $V \cap A \neq \emptyset$ .

Suponha que para todo  $V \in \mathcal{V}$ ,  $V \cap A \neq \emptyset$ . Seja  $U \subset X$  aberto tal que  $x \in U$ . Como  $\mathcal{V}$  é sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ , existe  $V \in \mathcal{V}$  tal que  $x \in V \subset U$ . Logo, como  $V \cap A \neq \emptyset$ , segue que  $U \cap A \neq \emptyset$ .

**1.3.22** Supondo  $(X, \tau)$   $T_3$  e fixando  $x \in X$ , a família  $\mathcal{V}_x = \{\bar{A} : A \in \tau \text{ e } x \in A\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças fechadas para  $x$ . Reciprocamente, supondo a existência de um sistema fundamental de vizinhanças fechadas, basta aplicar a Proposição ?? para concluir que  $(X, \tau)$  é  $T_3$ .

**1.3.25** Procedamos pela contrapositiva.

Suponha  $\overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$ , para quaisquer  $x, y \in X$  distintos. Isso equivale a afirmar que  $a$  é ponto de acumulação de  $\{x\}$  se, e somente se,  $a$  é ponto de acumulação de  $\{y\}$  ou, equivalentemente, todo aberto que contém  $x$  também contém  $y$ , isto é,  $(X, \tau)$  não é  $T_0$ .

**1.3.26** Supondo  $(X, \tau)$   $T_1$ , provemos (b). Basta considerar  $\mathcal{A} = \{A \in \tau : x \in A\}$ . Por construção, vale que  $\{x\} \subset \bigcap \mathcal{A}$ . Por outro lado, se existisse  $y \neq x$  tal que  $y \in \bigcap \mathcal{A}$ , então todo aberto de  $A$  que contém  $x$  também conteria  $y$ , o que contraria a hipótese de estarmos supondo  $(X, \tau)$   $T_1$ .

Agora suponha que para todo  $x \in X$ , existe uma coleção  $\mathcal{A}_x$  de abertos tal que  $\bigcap \mathcal{A}_x = \{x\}$ . Defina  $B_x = \{A \in \tau | x \in A\}$  e  $\mathcal{V}_x = \{U \in \tau : (\exists A, B)(A \in \mathcal{A}_x \text{ e } B \in B_x)(U = A \cap B)\}$ . Claramente,  $\mathcal{V}_x$  é sfv para  $x$  e  $\bigcap \mathcal{V}_x = \{x\}$ .

Finalmente, se para cada  $x \in X$  existir um sfv  $\mathcal{V}_x$  para  $x$  tal que  $\bigcap \mathcal{V}_x = \{x\}$ , então para  $x \neq y$ , segue que existem sistemas de vizinhanças  $\mathcal{V}_x$  e  $\mathcal{V}_y$  para  $x$  e  $y$ , respectivamente, tais que  $\{x\} = \bigcap \mathcal{V}_x \neq \bigcap \mathcal{V}_y = \{y\}$ , ou seja,

existem abertos  $A_y \in \mathcal{V}_y$  e  $A_x \in \mathcal{V}_x$  tais que  $x \in A_x$  mas  $y \notin A_x$  e  $y \in A_y$  mas  $x \notin A_y$ , donde  $(X, \tau)$  é  $T_1$ .

**1.3.27** Se  $(X, \tau)$  é normal, então em particular  $\{x\}$  é fechado. Assim, sejam  $F$  um fechado e  $x \in X$  tais que  $x \notin F$ , isto é,  $\{x\}$  e  $F$  são fechados disjuntos. Por  $X$  ser  $T_4$ , existem abertos  $A$  e  $B$  disjuntos tais que  $\{x\} \subset A$  e  $F \subset B$ , isto é,  $(X, \tau)$  é  $T_3$  e, por ser  $T_1$ ,  $X$  é regular.

Se  $(X, \tau)$  for regular, novamente  $\{x\}$  é fechado, para qualquer  $x \in X$ . Em particular, se  $x \neq y$ ,  $x \notin \{y\}$ , logo existem abertos disjuntos  $A, B$  tais que  $x \in A$  e  $\{y\} \subset B$ , logo  $(X, \tau)$  é de Hausdorff.

Daí, se  $(X, \tau)$  é Hausdorff, dados  $x \neq y$  elementos de  $X$ , existem abertos disjuntos  $A, B$  tais que  $x \in A$  e  $y \in B$ , em particular, por serem disjuntos,  $x \in A$  e  $y \notin A$  e  $y \in B$  e  $x \notin B$ , implicando em  $(X, \tau)$  ser  $T_1$ .

Se  $(X, \tau)$  é  $T_1$ , então claramente também é  $T_0$ .

**1.4.26** Suponha que exista um aberto não vazio  $A$  tal que  $A \cap D = \emptyset$ . Então,  $X \setminus A$  é um fechado diferente de  $X$  de modo que  $D \subset (X \setminus A)$ . Então, como  $\overline{D}$  é a interseção de todos os fechados que contém  $D$ , segue que  $\overline{D} \neq X$  e  $D$  não é denso.

Agora, suponha que para qualquer aberto não vazio  $A$ , temos que  $A \cap D \neq \emptyset$ . Seja  $F$  um fechado tal que  $D \subset F$ , segue que  $X \setminus F$  é um aberto tal que  $(X \setminus F) \cap D = \emptyset$ . Logo  $X \setminus F = \emptyset$  e, então,  $F = X$ . Portanto,  $X$  é o único fechado que contém  $D$  e  $\overline{D} = X$ .

**2.1.18** Seja  $A$  um aberto em  $Y$ . Então, como  $f$  é contínua,  $f^{-1}[A]$  é um aberto em  $X$ , e portanto,  $f^{-1}[A] \cap Z$  é um aberto de  $Z$ . Por outro lado, como  $(f \upharpoonright Z)^{-1}[A] = f^{-1}[A] \cap Z$ , temos que  $f \upharpoonright Z$  é contínua.

**3.1.11** Suponha que  $(X, \tau)$  seja espaço de Hausdorff. Seja  $(a, b) \in X \times X$ , com  $a \neq b$ . Sejam, também,  $A, B \in \tau$  disjuntos tais que  $a \in A$  e  $b \in B$ . Note que  $(A \times B) \cap D = \emptyset$  e  $(a, b) \in A \times B$ .

Suponha que  $D$  seja fechado. Sejam  $a, b \in X$ , com  $a \neq b$ . Logo,  $(a, b) \notin D$  e existem  $A, B \in \tau$  tais que  $(a, b) \in A \times B$  e  $(A \times B) \cap D = \emptyset$ . Portanto,  $A \cap B = \emptyset$ .

**3.2.13** Basta mostrar para  $n = 2$ . Seja  $x \in X$  e  $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ . Como cada  $f_i$  é contínua, existe  $V_i$  tal que  $f_i[V_i] \subset ]f_i(x) - \varepsilon, f_i(x) + \varepsilon[$ . Seja  $V = V_1 \cap V_2$ . Sem perda de generalidade, vamos supor que  $f_1(x) \leq f_2(x)$  (e, portanto,  $g(x) = f_2(x)$ ). Assim, dado  $y \in V$ , temos:

$$\begin{aligned}g(y) &= \max\{f_1(y), f_2(y)\} \\ &< \max\{f_1(x) + \varepsilon, f_2(x) + \varepsilon\} \\ &\leq f_2(x) + \varepsilon \\ &= g(x) + \varepsilon\end{aligned}$$

Analogamente, provamos que  $g(y) > g(x) - \varepsilon$  e, portanto,  $g$  é contínua no ponto  $x$ .

## Notação

$B_r(x)$ , 10

$T_0$ , 19

$T_1$ , 20, 39, 42

$T_2$ , 21

$T_3$ , 21

$T_4$ , 23, 39, 42, 47

$T_{3\frac{1}{2}}$ , 42

$\chi_A$ , 38

$\mathbb{R}$ , 8, 10, 12, 13, 16, 17, 22

$\wp(X)$ , 8

$d(x, A)$ , 15

## Índice Remissivo

- aberta
  - função, 52
- aberto, 8, 9
- aderente
  - ponto, 11
- assimétrica, 14
  
- base, 15
- base local, 17
- bases locais
  - enumeráveis, 25, 26
  
- caótica
  - topologia, 9
- característica
  - função, 38
- Cauchy
  - sequência de, 28
- cofinita
  - topologia, 9, 21
- completamente
  - regular, 42
- completo
  - espaço métrico, 28
- conjunto
  - fechado, 10
- contínua
  - extensão, 43
  - função, 34
- converge, 26
  
- de
  - Urysohn, Lema, 40
- densa
  - ordem, 49
- denso, 44
- discreta
  - topologia, 9, 10, 16, 17
  
- distância
  - ponto a conjunto, de, 15
  
- enumeráveis
  - bases locais, 25, 26
- enumerabilidade
  - primeiro axioma de, 25
  - segundo axioma de, 28
  - terceiro axioma de, 29
- equivalentes
  - métricas, 14
- esburacada
  - reta, 25, 27, 31, 32
- espaço
  - completo, métrico, 28
  - Hausdorff, de, 21
  - homogêneo, 52
  - métrico, 5, 10, 21, 25, 28, 39
  - metrizável, 29
  - normal, 23
  - regular, 21
  - separável, 29
  - sequência convergente, da, 35
  - sequencia convergente, da, 44
  - topológico, 7, 8
  - zero-dimensional, 18
- extensão
  - contínua, 43
- Extensão de Tietze
  - Teorema da, 44
  
- fechada
  - função, 52
- fechado
  - conjunto, 10
- fecho, 11
- filtro, 6



- fronteira
  - ponto de, 12
- função
  - aberta, 52
  - característica, 38
  - contínua, 34
  - fechada, 52
  - identidade, 34
  - no ponto  $x$ , contínua, 33
- gerada
  - topologia, 18
- Hausdorff, 44, 49
- Hausdorff
  - espaço de, 21
- homeomorfismo, 48
- homeomorfos, 48
- homogêneo
  - espaço, 52
- identidade
  - função, 34
- induzida pela métrica
  - topologia, 10
- interior, 11
- interior
  - ponto, 13
- isolado
  - ponto, 52
- isomorfismo
  - ordem, de, 43, 49
- Jones
  - Lema de, 48
- Lema
  - de Urysohn, 40
  - Jones, de, 48
- métricas
  - equivalentes, 14
- métrico
  - espaço, 5, 10, 21, 25, 28, 39
- metrizável, 31
- metrizável
  - espaço, 29
- Niemytski
  - plano de, 31
- no ponto  $x$ 
  - função contínua, 33
- normal, 39, 42
- normal
  - espaço, 23
- ordem
  - densa, 49
  - isomorfismo de, 43, 49
  - parcial, 43
  - topologia da, 49
  - total, 43, 49
- parcial
  - ordem, 43
- plano
  - Niemytski, de, 31
- ponto
  - aderente, 11
  - fronteira, de, 12
  - interior, 13
  - isolado, 52
- ponto a conjunto
  - distância de, 15
- primeiro axioma
  - enumerabilidade, de, 25
- propriedade
  - topológica, 48
- quase constante
  - sequência, 31
- quasi-métrica, 14

- reais, 5, 13
- real
  - reta, 28, 29
- regular
  - completamente, 42
  - espaço, 21
- reta
  - esburacada, 25, 27, 31, 32
  - real, 28, 29
  - Sorgenfrey, de, 7, 8, 10, 12–14, 16–18, 22, 23, 25, 28–30
- segundo axioma
  - enumerabilidade, de, 28
- separável
  - espaço, 29
- sequência
  - Cauchy, de, 28
  - quase constante, 31
- sequência convergente
  - espaço da, 35
- sequencia convergente
  - espaço da, 44
- sistema
  - vizinhanças, de, 6
- sistema fundamental
  - vizinhanças, de, 17
- Sorgenfrey
  - reta de, 7, 8, 10, 12–14, 16–18, 22, 23, 25, 28–30
- subespaço
  - topologia de, 9
- Teorema
  - Extensão de Tietze, da, 44
- terceiro axioma
  - enumerabilidade, de, 29
- topológica
  - propriedade, 48
- topológico
  - espaço, 7, 8
- topologia, 9
- topologia
  - caótica, 9
  - cofinita, 9, 21
  - discreta, 9, 10, 16, 17
  - gerada, 18
  - induzida pela métrica, 10
  - ordem, da, 49
  - subespaço, de, 9
  - usual em  $\mathbb{R}$ , 9
- total
  - ordem, 43, 49
- Urysohn
  - Lema de, 40
- usual em  $\mathbb{R}$ 
  - topologia, 9
- vizinhança, 6, 10
- vizinhanças
  - sistema de, 6
  - sistema fundamental de, 17
- zero-dimensional
  - espaço, 18