

# Notas de Aula

Leandro F. Aurichi <sup>1</sup>

30 de março de 2016

<sup>1</sup>Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - USP



# Sumário

<b>1</b>	<b>Espaços topológicos</b>	<b>5</b>
1.1	Definições básicas . . . . .	5
	Alguns exemplos de espaços topológicos . . . . .	9
	Fechados . . . . .	11
	Fecho, interior e fronteiras . . . . .	11
	Bases . . . . .	13
	Alongamentos . . . . .	16
	Exercícios . . . . .	18
1.2	Axiomas de Separação . . . . .	20
	Alongamentos . . . . .	25
	Exercícios . . . . .	26
1.3	Axiomas de Enumerabilidade . . . . .	27
	Alongamentos . . . . .	31
	Exercícios . . . . .	32
<b>2</b>	<b>Funções</b>	<b>35</b>
2.1	Funções contínuas . . . . .	35
	Alongamentos . . . . .	39
	Exercícios . . . . .	40
2.2	Lema de Urysohn . . . . .	41
	Alongamentos . . . . .	45
	Exercícios . . . . .	45
2.3	Extensões de funções . . . . .	45
	Alongamentos . . . . .	49
	Exercícios . . . . .	50
2.4	Homeomorfismos . . . . .	50
	Alongamentos . . . . .	54
	Exercícios . . . . .	54

<b>Índices</b>	<b>64</b>
Notação . . . . .	64
Índice Remissivo . . . . .	65

# Capítulo 1

## Espaços topológicos

### 1.1 Definições básicas

Um espaço topológico é um espaço dotado de uma noção de proximidade. Uma maneira de dar uma noção de proximidade é de modo quantitativo, como no caso de espaços métricos:

**Definição 1.1.1.** Seja  $X$  um conjunto. Dizemos que  $(X, d)$  é um **espaço métrico**, se  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função que satisfaz:

- (a)  $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$  e  $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ ;
- (b)  $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$ ;
- (c)  $\forall x, y, z \in X, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ .

Desta maneira, temos que uma maneira de medir o quanto um ponto está próximo do outro - simplesmente vemos o valor de  $d$  neste dois pontos. Um ponto está mais próximo de outro o quanto menor for o valor de  $d$  calculado nestes dois pontos.

**Exemplo 1.1.2.** Uma métrica sobre o conjunto dos reais  $\mathbb{R}$  é a função  $d(x, y) = |x - y|$ . Esta é a métrica usual sobre  $\mathbb{R}$ .

Para muitos casos, essa noção de proximidade é suficiente. Mas ela não cobre uma gama grande (e importante) de noções em matemática.

O seguinte exemplo é um caso simples onde o conceito não é aplicável: considere um rio com uma correnteza razoavelmente forte. Para simplificar, pensemos que esta correnteza anda para a direita e seja tão forte que não seja possível andar rio acima (ou seja, andar para esquerda). Podemos

Para espaços de funções em geral não é possível definir métricas.




Figura 1.1: Uma correnteza forte

representar este rio usando a reta real, mas precisamos de uma noção de proximidade diferente da usual: ao tomarmos dois pontos  $x, y$  com  $x < y$  queremos que  $y$  esteja perto de  $x$  mas não que  $x$  esteja perto de  $y$  (pois a correnteza não permite sair de  $y$  e chegar em  $x$ ). Note que isso não é possível ao usar uma métrica, uma vez que teríamos  $d(x, y) = d(y, x)$ .

Veja também o Exercício 1.1.69.

Uma maneira de contornar isso é simplesmente abandonar o conceito quantitativo de proximidade dado pela métrica e usarmos um conceito qualitativo. Para isso, vamos precisar de um conceito diferente:

**Definição 1.1.3.** Seja  $X$  um conjunto. Dizemos que uma família não vazia  $\mathcal{F}$  de subconjuntos de  $X$  é um **filtro** sobre  $X$  se:

- (a)  $\emptyset \notin \mathcal{F}$ ;
- (b) se  $A, B \in \mathcal{F}$ , então  $A \cap B \in \mathcal{F}$ ;
- (c) se  $A \in \mathcal{F}$  e  $A \subset B$ , então  $B \in \mathcal{F}$ .

Agora, em vez de usarmos uma função distância, “atribuímos” a cada ponto um filtro:

Vamos adotar o \* aqui para não confundir com o conceito de vizinhança que será apresentado em 1.1.13. Faremos o análogo em mais algumas definições abaixo.

**Definição 1.1.4.** Seja  $X$  um conjunto e  $x \in X$ . Dizemos que uma coleção  $\mathcal{V}$  de subconjuntos de  $X$  é um **sistema de vizinhanças\*** para  $x$  se  $\mathcal{V}$  é um filtro sobre  $X$  e cada elemento  $V \in \mathcal{V}$  é tal que  $x \in V$ . Chamamos cada  $V \in \mathcal{V}$  de **vizinhança\*** de  $x$ .




Figura 1.2: O ponto  $y$  é o mais próximo de  $x$

A intuição por trás desta definição é que cada elemento de  $\mathcal{V}$  representa uma coleção de pontos “próximos” de  $x$ . Você pode pensar que um ponto  $y$  fixado está mais próximo de  $x$  quanto maior for o conjunto

$$\{V \in \mathcal{V} : y \in V\}$$

Desta maneira, na situação representada pela figura, o ponto mais próximo de  $x$  é  $y$  (e não  $z$ ).

O próximo exemplo dá uma maneira de traduzirmos para a ideia de vizinhanças o conceito de proximidade dado pela métrica usual em  $\mathbb{R}$ .

**Exemplo 1.1.5.** Fixado  $x \in \mathbb{R}$ , temos que  $\mathcal{V} = \{V : \text{existem } a < x < b \text{ tais que } ]a, b[ \subset V\}$  é um sistema de vizinhanças\* para  $x$ .

Sim, parece estranho agora que isso seja realmente uma tradução. Mas veremos isso mais formalmente no Alongamento 1.1.55.

Ao mudarmos ele ligeiramente, obtemos a ideia do exemplo do rio:

**Exemplo 1.1.6.** Fixado  $x \in \mathbb{R}$ , temos que  $\mathcal{V} = \{V : \text{existe } a > x \text{ tal que } ]x, a[ \subset V\}$  é um sistema de vizinhanças\* de  $x$ . Ao conjunto dos reais munido com tal conceito de vizinhanças\* damos o nome de **reta de Sorgenfrey**.

Para tentarmos ver que algo da nossa intuição está sendo capturado neste exemplo, vamos analisar um caso específico. Considere as vizinhanças\* de 0 como definidas acima. Note que números positivos estão muito mais

próximos de 0 do que os números negativos. Note também que isso não ocorre no caso mais simétrico do exemplo anterior.

Com todo esse material, podemos finalmente definir um espaço topológico. Intuitivamente, um espaço topológico nada mais é que um conjunto tal que todos os pontos possuem uma medida qualitativa de proximidade, mais uma condição mais técnica, que garante uma certa compatibilidade entre as noções de proximidade de diferentes pontos. Esta condição será dada em termos de certas vizinhanças\* especiais:

Veja o Alongamento 1.1.54 para ver tal condição é necessária.

**Definição 1.1.7.** Seja  $X$  um conjunto e seja  $(V_x)_{x \in X}$  de forma que cada  $V_x$  é um filtro para  $x$ . Dizemos que  $A \subset X$  é um **aberto\*** (com relação a  $(V_x)_{x \in X}$ ) se, para todo  $a \in A$ ,  $A \in V_a$ . Ou seja,  $A$  é uma vizinhança\* de todos os seus pontos.

Veja a definição “definitiva” em 1.1.12.

**Definição 1.1.8.** Dizemos que  $(X, (\mathcal{V})_{x \in X})$  é um **espaço topológico\*** se, para cada  $x \in X$ ,  $\mathcal{V}_x$  é um sistema fundamental de vizinhanças\* para  $x$ . Além disso, para qualquer  $x \in X$  e qualquer  $V \in \mathcal{V}_x$ , existe  $A \in \mathcal{V}_x$  aberto\* tal que  $x \in A \subset V$ .

Esta não é a definição que iremos trabalhar. Optamos por apresentar esta versão por entendermos que a intuição por trás dela é mais aparente do que na definição “definitiva”.

Vejamos alguns exemplos de espaços topológicos\*.

**Exemplo 1.1.9.** Considere  $\mathbb{R}$  como no Exemplo 1.1.5 e sejam  $a, b \in \mathbb{R}$  com  $a < b$ . Note que um intervalo  $]a, b[$  é aberto\*. De fato, dado qualquer  $x \in ]a, b[$ , o próprio conjunto  $]a, b[$  atesta que  $]a, b[$  é uma vizinhança\* de  $x$ . Por outro lado, o conjunto  $[a, b[$  não é aberto\* pois  $[a, b[$  não é vizinhança\* de  $a$ . Note que, assim, isso forma um espaço topológico\*, pois, para cada  $x \in X$ , sempre existe  $A$  aberto tal que  $A \in \mathcal{V}_x$ .

**Exemplo 1.1.10.** Se considerarmos a reta de Sorgenfrey (como no Exemplo 1.1.6) e tomamos  $a, b \in \mathbb{R}$  com  $a < b$ , temos que  $]a, b[$  é aberto\*, pois, para cada  $x \in ]a, b[$ , temos que  $[x, b[$  atesta que  $]a, b[$  é uma vizinhança\* de  $x$ . De maneira análoga, podemos mostrar que  $[a, b[$  também é aberto\*.

Os abertos\* tem algumas propriedades a se destacar:

**Proposição 1.1.11.** *Seja  $X$  um espaço topológico. Temos:*

- (a)  $\emptyset$  e  $X$  são abertos\*;
- (b) se  $A$  e  $B$  são abertos\*, então  $A \cap B$  também é;



(c) se  $\mathcal{A}$  é uma família de abertos\*, então  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$  é um aberto\*.

*Demonstração.* Veja o Alongamento 1.1.51. □

Essas propriedades da última proposição na verdade motivam a definição usual de espaço topológico:

**Definição 1.1.12.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é um **espaço topológico** se  $X$  é um conjunto e  $\tau \subset \wp(X)$  é uma família que satisfaz:

Esta é a definição oficial para espaços topológicos.  $\wp(X)$  é a coleção de todos os subconjuntos de  $X$ .

(a)  $X, \emptyset \in \tau$ ;

(b) se  $A, B \in \tau$ , então  $A \cap B \in \tau$ ;

(c) se  $\mathcal{A} \subset \tau$ , então  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \in \tau$ .

Cada elemento de  $\tau$  é chamado de **aberto** e a própria família  $\tau$  é chamada de **topologia**.

Temos que a definição de espaço topológico e a definição de espaço topológico\* aqui apresentadas são equivalentes. Começando com um espaço topológico\*, note que o conjunto dos abertos\* forma uma topologia (basicamente, isso é a Proposição 1.1.11). Mas como recuperar o conceito de vizinhança\*? Para isso, basta fazer a seguinte definição:

**Definição 1.1.13.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Dado  $x \in X$ , dizemos que  $V \subset X$  é uma **vizinhança** de  $x$  se existe  $A$  aberto tal que  $x \in A \subset V$ .

A coleção das vizinhanças de um ponto, de fato, forma um filtro (ver o Alongamento 1.1.52). Desta maneira, se começamos com um espaço topológico\*, temos como definir um espaço topológico e vice e versa. Além disso, essas construções comutam (veja os Alongamentos 1.1.52 e 1.1.53).

### Alguns exemplos de espaços topológicos

Vejam alguns exemplos de espaços topológicos. Outros exemplos serão dados no decorrer do texto.

**Exemplo 1.1.14.** Seja  $X$  um conjunto qualquer. Então  $\tau = \{\emptyset, X\}$  é uma topologia sobre  $X$  (chamada **topologia caótica**).

**Exemplo 1.1.15.** Seja  $X$  um conjunto qualquer. Então  $\tau = \wp(X)$  é uma topologia sobre  $X$  (chamada **topologia discreta**).

A topologia discreta tem uma caracterização útil:

**Proposição 1.1.16.** *Seja  $X$  um conjunto qualquer e  $\sigma$  uma topologia sobre  $X$ . Então,  $\sigma$  é a topologia discreta se, e somente se, para todo  $x \in X$ ,  $\{x\} \in \sigma$ .*

*Demonstração.* Se  $\sigma$  é a topologia discreta, segue da definição que para todo  $x \in X$ ,  $\{x\} \in \sigma$ .

Reciprocamente, dado um conjunto qualquer  $A \subset X$ , ele pode ser escrito da forma  $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ . Logo, pela definição de topologia,  $A \in \sigma$  e, portanto,  $\sigma$  é a topologia discreta.  $\square$

Veja o Alongamento 1.1.55 para notar que diversas maneiras definir a topologia nos reais chegam ao mesmo lugar.

**Exemplo 1.1.17.** O conjunto  $\mathbb{R}$  é um espaço topológico, com a topologia  $\tau = \{A \subset \mathbb{R} : \forall x \in A, \exists \varepsilon > 0, ]x - \varepsilon, x + \varepsilon[ \subset A\}$ . Esta é chamada de **topologia usual em  $\mathbb{R}$** .

**Exemplo 1.1.18.** Seja  $X$  um conjunto qualquer. Considere  $\tau = \{A \subset X : X \setminus A \text{ é finito}\} \cup \{\emptyset\}$ . Temos que  $\tau$  é uma topologia sobre  $X$  (chamada **topologia cofinita** - veja também o Exercício 1.1.67).

De fato, note que  $X, \emptyset \in \tau$ . Seja  $\mathcal{A}$  uma família de elementos de  $\tau$ . Temos que

$$X \setminus \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} (X \setminus A)$$

Note que o lado direito da equação é finito pois é interseção de conjuntos finitos. Logo,  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \in \tau$ . Agora, sejam  $A_1, A_2 \in \tau$ . Note que

$$X \setminus (A_1 \cap A_2) = (X \setminus A_1) \cup (X \setminus A_2)$$

Novamente o lado direito é finito, pois é união finita de conjuntos finitos. Portanto,  $A_1 \cap A_2 \in \tau$  e  $\tau$  é uma topologia sobre  $X$ .

Também podemos definir um espaço “menor” que um já fixado:

Veja Alongamento 1.1.57.

**Definição 1.1.19.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico e seja  $Y \subset X$ . A **topologia de subespaço** sobre  $Y$  induzida por  $(X, \tau)$  é dada por  $\tau_Y = \{A \cap Y : A \in \tau\}$ .

A menos de menção contrária, sempre que tomarmos  $Y \subset X$ , onde  $(X, \tau)$  é um espaço topológico,  $Y$  será considerado com a topologia de subespaço.

Finalmente, associada a uma métrica, sempre existe uma topologia.

**Proposição 1.1.20.** *Seja  $(X, d)$  um espaço métrico. Então,  $\tau = \{A \subset X : \forall x \in A, \exists r > 0, B_r(x) \subset A\}$ , onde  $B_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$ , é uma topologia sobre  $X$ , chamada **topologia induzida pela métrica  $d$** .*

*Demonstração.* Note que  $X \in \tau$  trivialmente e que  $\emptyset \in \tau$  por vacuidade. Agora, sejam  $A_1, A_2 \in \tau$ . Se  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ , nada há a provar. Caso contrário, seja  $x \in A_1 \cap A_2$ . Sejam  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$  tais que  $B_{\varepsilon_1}(x) \subset A_1$  e  $B_{\varepsilon_2}(x) \subset A_2$ . Seja  $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ . Note que  $B_\varepsilon(x) \subset A_1 \cap A_2$ . Finalmente, seja  $\mathcal{A} \subset \tau$ . Novamente, podemos supor que  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \neq \emptyset$  pois caso contrário nada há a provar. Seja  $x \in \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ . Seja  $A \in \mathcal{A}$  tal que  $x \in A$ . Seja  $\varepsilon > 0$  tal que  $B_\varepsilon(x) \subset A$ . Note que  $B_\varepsilon(x) \subset \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$  e, portanto,  $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \in \tau$ .  $\square$

## Fechados

Um importante conceito é o de conjunto fechado:

**Definição 1.1.21.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Dizemos que  $F \subset X$  é um **conjunto fechado** se  $X \setminus F$  é aberto.

**Exemplo 1.1.22.** Em qualquer espaço topológico  $(X, \tau)$ ,  $X$  e  $\emptyset$  são fechados, pois seus complementares são abertos (em particular,  $X$  e  $\emptyset$  são abertos e fechados).

**Exemplo 1.1.23.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $[0, 1]$  é fechado já que  $\mathbb{R} \setminus [0, 1] = ]-\infty, 0[ \cup ]1, +\infty[$ .

**Exemplo 1.1.24.** Na topologia discreta, qualquer conjunto é fechado. Para isso, basta notar que o complementar de qualquer conjunto é ainda um membro de  $\wp(X)$  e, portanto, é aberto.

**Exemplo 1.1.25.** Na reta de Sorgenfrey,  $[a, b[$  é fechado, onde  $a < b$ . Vamos mostrar que  $\mathbb{R} \setminus [a, b[$  é aberto. Se  $x \in \mathbb{R} \setminus [a, b[$ , então há dois casos a considerar:

- $x \geq b$ : basta tomar o aberto  $[x, x + 1[$ , cuja interseção com  $[a, b[$  é vazia;
- $x < a$ : podemos considerar o aberto  $[x, a[$ , que também está contido no complementar de  $[a, b[$ .

Portanto, o complementar de  $[a, b[$  é aberto, como queríamos.

## Fecho, interior e fronteiras

Algo muito comum de se fazer é tomar o menor fechado contendo um determinado conjunto:

**Definição 1.1.26.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Definimos  $\overline{A} = \bigcap \{F \subset X : F \text{ é fechado e } A \subset F\}$  (**fecho** de  $A$ , também denotado por  $\text{Cl}(A)$ ).

Definimos  $\overset{\circ}{A} = \bigcup \{V \subset X : V \text{ é aberto e } V \subset A\}$  (**interior** de  $A$ , também denotado por  $\text{Int}(A)$ ).

**Proposição 1.1.27.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Então  $\overline{A}$  é fechado e  $\overset{\circ}{A}$  é aberto.

*Demonstração.* Decorre diretamente da definição e das propriedades de conjuntos abertos e fechados.  $\square$

Pensando que os abertos que contêm um ponto são as possíveis noções de “perto do ponto”, podemos definir a noção de um ponto estar perto de um conjunto se toda vez que olhamos para “perto do ponto”, interceptamos o conjunto:

Note que esta definição difere da definição que daremos para ponto de acumulação.

**Definição 1.1.28.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Dizemos que  $x \in X$  é **ponto aderente** a  $A$  se para todo aberto  $V$  tal que  $x \in V$  valer  $V \cap A \neq \emptyset$ .

Vamos mostrar que o fecho de um conjunto basicamente é a coleção de todos os pontos próximos do conjunto:

**Proposição 1.1.29.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Então  $\overline{A} = \{x \in X : x \text{ é ponto aderente de } A\}$ .

*Demonstração.* Chame de  $D$  o conjunto dos pontos aderentes a  $A$ . Vamos provar que  $\overline{A} \subset D$ . Seja  $x \in \overline{A}$ . Seja  $V$  aberto tal que  $x \in V$  e suponha  $V \cap A = \emptyset$ . Logo,  $A \subset X \setminus V$  que é fechado. Assim, pela definição de  $\overline{A}$ , segue que  $\overline{A} \subset X \setminus V$ , contradição com o fato que  $x \in \overline{A}$  e  $x \in V$ .

Provemos que  $D \subset \overline{A}$ . Seja  $x \in D$  e suponha  $x \notin \overline{A}$ . Logo,  $x \in X \setminus \overline{A}$  que é aberto. Como  $x \in D$ , temos que  $(X \setminus \overline{A}) \cap A \neq \emptyset$ . Contradição, pois  $A \subset \overline{A}$ .  $\square$

Vale um resultado análogo para o interior de um conjunto  $A$ . Em particular,  $A$  é aberto se, e somente se,  $\overset{\circ}{A} = A$  (ver Alongamento 1.1.61).

**Proposição 1.1.30.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $A, B \subset X$ . Temos

- (a) Se  $A \subset B$ , então  $\overline{A} \subset \overline{B}$ ;
- (b)  $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$ ;
- (c)  $\overline{A} = A$  se, e somente se,  $A$  é fechado.

*Demonstração.* Dado  $x \in \bar{A}$ , segue que  $U \cap A \neq \emptyset$  para todo aberto  $U$  que contém  $x$ . Como  $A \subset B$ , segue em particular que  $U \cap B \neq \emptyset$ . Isto prova (a).

Provemos (c). Naturalmente se  $\bar{A} = A$ , obtemos que  $A$  é fechado, pois seu fecho é fechado. Reciprocamente, se  $A$  é fechado, segue que  $A = \bigcap \{F \subset X : F \text{ é fechado e } A \subset F\} = \bar{A}$ . O item (b) segue então diretamente de (c), por  $\bar{A}$  ser fechado.  $\square$

**Exemplo 1.1.31.** Considere um conjunto  $X$  com a topologia discreta. Como todo subconjunto  $A$  de  $X$  é fechado, segue que  $\bar{A} = A$  (e também que  $\overset{\circ}{A} = A$ ).

**Exemplo 1.1.32.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $\overline{[a, b[} = [a, b]$ . De fato,  $b$  é o único ponto aderente a  $[a, b[$  que é aderente a  $[a, b]$ .

**Exemplo 1.1.33.** Na reta de Sorgenfrey,  $\overline{[a, b[} = [a, b]$ . Para isso, basta lembrar que  $[a, b]$  é fechado.

**Exemplo 1.1.34.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$  e  $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$ . Ambas as igualdades se devem ao fato de que dado qualquer ponto  $q \in \mathbb{Q}$  e  $\varepsilon > 0$ ,  $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$  contém pontos de  $\mathbb{Q}$  e de  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ . O mesmo vale na reta de Sorgenfrey.

Algumas vezes, um ponto pode estar próximo tanto de um conjunto, como de seu complementar:

**Definição 1.1.35.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Dizemos que  $x \in X$  é um **ponto de fronteira** de  $A$  se para todo  $V \subset X$  aberto tal que  $x \in V$ , temos  $V \cap A \neq \emptyset$  e  $V \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ .

**Notação 1.1.36.**  $\partial A = \{x \in X : x \text{ é ponto de fronteira de } A\}$ .

**Exemplo 1.1.37.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $\partial[a, b[ = \{a, b\}$ . Enquanto que na reta de Sorgenfrey temos que  $\partial[a, b[ = \emptyset$ .

**Observação 1.1.38.** A igualdade acima vale de modo geral. Se  $A$  é um subconjunto aberto e fechado de um espaço topológico  $(X, \tau)$ , então  $\partial A = \emptyset$ .

**Exemplo 1.1.39.** Em  $\mathbb{R}$  (ou na reta de Sorgenfrey),  $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ .

## Bases

Uma base nada mais é que uma subfamília de abertos que é suficiente para recuperarmos todos os abertos por meio de uniões:




Figura 1.3: O desenho básico de uma base

**Definição 1.1.40.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Dizemos que  $\mathcal{B} \subset \tau$  é uma **base** para  $(X, \tau)$  se para todo aberto não vazio  $A \in \tau$ , existe uma família  $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$  de elementos da base tal que  $A = \bigcup_{B \in \mathcal{A}} B$ .

Uma importante caracterização para bases é o seguinte resultado:

Veja a figura 1.3.

**Proposição 1.1.41.** Uma família  $\mathcal{B}$  de subconjuntos de  $\tau$  é uma base para  $(X, \tau)$  se, e somente se, para todo aberto não vazio  $A \in \tau$  e todo  $x \in A$ , existe  $B \in \mathcal{B}$  de forma que  $x \in B \subset A$ .

*Demonstração.* Suponha que  $\mathcal{B}$  seja uma família como no enunciado e seja  $A \in \tau$ . Para cada elemento  $x \in A$ , existe um conjunto  $B_x \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B_x \subset A$ . Segue, então, que  $A = \bigcup_{x \in A} B_x$ .

Reciprocamente, sejam  $x \in X$  e  $A \in \tau$ . Como podemos escrever  $A = \bigcup \mathcal{B}'$  com  $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ , tomamos  $B \in \mathcal{B}'$  tal que  $x \in B$ . Além disso, temos que  $B \subset A$ .  $\square$

**Exemplo 1.1.42.**  $\mathcal{B} = \{]a, b[ : a, b \in \mathbb{Q}\}$  é uma base para a topologia usual de  $\mathbb{R}$ .

De fato, seja  $x \in \mathbb{R}$  e  $A \in \tau$ . Pela definição de  $\tau$ , existe  $\varepsilon > 0$  tal que tal que  $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[ \subset A$ . Note que existem  $a, b \in \mathbb{Q}$  tais que

$$x - \varepsilon < a < x < b < x + \varepsilon$$

Logo,  $B = ]a, b[ \in \mathcal{B}$  e  $x \in B \subset A$ .

**Exemplo 1.1.43.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico qualquer. Então,  $\mathcal{B} = \{B_{\frac{1}{n}}(x) : x \in X, n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é uma base para  $(X, d)$  (ver Alongamento 1.1.64).

**Exemplo 1.1.44.** Seja  $X$  um conjunto qualquer.  $\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}$  é uma base para a topologia discreta sobre  $X$  (ver Alongamento 1.1.64).

**Exemplo 1.1.45.** A família  $\mathcal{B} = \{[x, y[ : x < y\}$  é uma base para a reta de Sorgenfrey (ver Alongamento 1.1.64).

Em algum sentido, uma base é um conjunto suficiente para determinar todos os abertos. Podemos fazer o análogo para vizinhanças:

**Definição 1.1.46.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $x \in X$ . Dizemos Veja o Exercício 1.1.78 que  $\mathcal{V}$  é um **sistema fundamental de vizinhanças** de  $x$  se

- (a) Para todo  $V \in \mathcal{V}$ ,  $V$  é vizinhança de  $x$ ;
- (b) Para todo aberto  $A \subset X$  tal que  $x \in A$ , existe  $V \in \mathcal{V}$  tal que  $x \in V \subset A$ .

No caso em que os elementos de  $\mathcal{V}$  são abertos, chamamos  $\mathcal{V}$  de **base local** para  $x$ .

**Exemplo 1.1.47.** Em  $\mathbb{R}$ ,  $\mathcal{V}_1 = \{]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[ : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$  (mais que isso, como todos os membros de  $\mathcal{V}_1$  são abertos,  $\mathcal{V}_1$  é uma base local de  $x$ ).

$\mathcal{V}_2 = \{[x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[ : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ .

**Exemplo 1.1.48.** Na reta de Sorgenfrey,  $\mathcal{V} = \{[x, x + \frac{1}{n}[ : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ .

**Exemplo 1.1.49.** Considere  $X$  com a topologia discreta.  $\mathcal{V}_1 = \{\{x\}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ , bem como  $\mathcal{V}_2 = \{A \subset X : x \in A\}$ .

O próximo resultado mostra como bases do espaço original se relacionam com as de um subespaço:

**Proposição 1.1.50.** *Se  $\mathcal{B}$  é uma base para  $(X, \tau)$ , então  $\mathcal{B}' = \{B \cap Y : B \in \mathcal{B}\}$  é uma base para  $Y \subset X$  com a topologia de subespaço.* Podemos fazer o análogo com sistemas fundamentais de vizinhanças.

*Demonstração.* Sejam  $A' \in \tau_Y$  e  $x \in A'$ . Pela definição de topologia de subespaço, existe  $A \in \tau$  tal que  $A' = A \cap Y$  e, assim,  $x \in A$ . Logo, pelo fato de  $\mathcal{B}$  ser base, existe  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B \subset A$ . Logo,  $x \in B \cap Y \subset A \cap Y$  e, portanto,  $\mathcal{B}'$  é uma base para  $(Y, \tau_Y)$ . □

**Alongamentos**

**Alongamento 1.1.51.** Mostre a Proposição 1.1.11.

**Alongamento 1.1.52.** Fixe um espaço topológico  $(X, \tau)$ . Considere para cada  $x \in X$ ,  $\mathcal{V}_x$  a coleção de todas as vizinhanças de  $x$ .

- (a) Mostre que cada  $\mathcal{V}_x$  é um filtro.
- (b) Mostre que  $(X, (\mathcal{V}_x)_{x \in X})$  é um espaço topológico\*.
- (c) Mostre que  $\{A \subset X : A \text{ é aberto}^*\} = \tau$ .

**Alongamento 1.1.53.** Fixe um espaço topológico\*  $(X, (\mathcal{V}_x)_{x \in X})$ . Seja  $\tau = \{A \subset X : A \text{ é aberto}^*\}$ .

- (a) Mostre que  $\tau$  é uma topologia sobre  $X$ .
- (b) Para cada  $x \in X$ , seja  $\mathcal{W}_x = \{V \subset X : V \text{ é vizinhança de } x \text{ em } (X, \tau)\}$ . Mostre que, para cada  $x \in X$ ,  $\mathcal{W}_x = \mathcal{V}_x$ .

**Alongamento 1.1.54.** Este é um exercício para mostrar que a hipótese de compatibilidade na definição de espaço topológico\* é necessária. Considere  $X = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{F}_0 = \{A \subset \mathbb{R} : 0 \in A \text{ e } \mathbb{R} \setminus A \text{ é enumerável}\}$  e, para cada  $x \neq 0$ ,  $\mathcal{F}_x = \{\mathbb{R}\}$ .

- (a) Note que, de fato, cada  $\mathcal{F}_x$  é um filtro.
- (b) Considere  $\tau = \{A \subset X : \forall a \in A \ A \in \mathcal{F}_a\}$ .
- (c) Mostre que  $\tau$  é uma topologia sobre  $\mathbb{R}$ .
- (d) Seja  $\mathcal{V}_0$  a coleção de todas as vizinhanças de 0 na topologia  $\tau$ . Mostre que  $\mathcal{V}_0 \subsetneq \mathcal{F}_0$ .

**Alongamento 1.1.55.** Vejamos que os abertos em  $\mathbb{R}$  podem ser obtidos de várias maneiras. Mostre que os abertos são os mesmos se:

- (a) fizermos como no Exemplo 1.1.17;
- (b) usamos as vizinhanças como em 1.1.5
- (c) usamos a métrica de 1.1.2 e depois a Proposição 1.1.20.

**Alongamento 1.1.56.** Mostre que todo aberto usual nos reais é um aberto na reta de Sorgenfrey.



**Alongamento 1.1.57.** Mostre que, de fato, a topologia de subespaço é uma topologia.

**Alongamento 1.1.58.** Considere  $[0, 1]$  com a topologia de subespaço de  $\mathbb{R}$ . Mostre que  $[0, \frac{1}{2}[$  é aberto em  $[0, 1]$  mas não é aberto em  $\mathbb{R}$ .

**Alongamento 1.1.59.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Mostre que são verdadeiras:

- (a)  $X, \emptyset$  são fechados;
- (b) Se  $F, G \subset X$  são fechados, então  $F \cup G$  é fechado;
- (c) Se  $\mathcal{F}$  é uma família não vazia de fechados, então  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$  é um fechado.

**Alongamento 1.1.60.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $A \subset X$ . Dizemos que  $x \in X$  é **ponto interior** de  $A$  se existe  $V$  aberto tal que  $x \in V \subset A$ . Mostre que  $\overset{\circ}{A} = \{x \in X : x \text{ é ponto interior de } A\}$ .

**Alongamento 1.1.61.** Mostre o análogo à Proposição 1.1.30 para o interior.

**Alongamento 1.1.62.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $A \subset X$ . Mostre as seguintes afirmações:

- (a)  $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$
- (b)  $\overset{\circ}{A} \cap \partial A = \emptyset$
- (c)  $\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$
- (d)  $\overline{A} = A \cup \partial A$

**Alongamento 1.1.63.** Mostre que a fronteira de um conjunto sempre é fechada.

**Alongamento 1.1.64.** Mostre as afirmações dos Exemplos 1.1.43, 1.1.44 e 1.1.45.

**Alongamento 1.1.65.** Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Sejam  $x \in X$  e  $V$  aberto tal que  $x \in V$ . Mostre que  $\{A \in \tau : x \in A \subset V\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ .

**Alongamento 1.1.66.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico,  $x \in X$ ,  $\mathcal{V}$  sistema fundamental de vizinhanças de  $x$  e  $W \subset X$  vizinhança de  $x$ . Mostre que  $\{V \cap W : V \in \mathcal{V}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ .

**Exercícios**

**Exercício 1.1.67.** Na definição da topologia cofinita (Exemplo 1.1.18), poderíamos pedir, em vez que os abertos tivessem complementar finito, que os abertos simplesmente fossem infinitos?

**Exercício 1.1.68.** Dizemos que duas métricas sobre um mesmo espaço  $X$  são **métricas equivalentes** se elas induzem a mesma topologia. Mostre que se  $(X, d)$  é um espaço métrico qualquer, então existe uma outra métrica  $d'$  sobre  $X$  equivalente a  $d$  e que é limitada (isto é, existe  $L > 0$  tal que  $d'(x, y) \leq L$  para todo  $x, y \in X$ ).

**Exercício 1.1.69.** Seja  $X$  um conjunto. Chamamos de **assimétrica** (na maioria dos livros, **quasi-métrica**), uma função  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  satisfazendo:

- (i)  $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$  e  $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ ;
  - (ii)  $\forall x, y, z \in X, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ .
- (a) Mostre que  $\tau = \{A \subset X : \forall x \in A, \exists r > 0, B_r(x) \subset A\}$ , onde  $B_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$  é uma topologia sobre  $X$  (como fizemos com uma métrica);
- (b) Considere seguinte função sobre  $\mathbb{R}$ :

$$d(x, y) = \begin{cases} y - x & \text{se } y \geq x \\ 1 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

para  $x, y \in \mathbb{R}$ . Mostre que  $d$  é uma assimétrica sobre  $\mathbb{R}$ . Mostre que a topologia induzida por ela é a mesma da reta de Sorgenfrey.

**Exercício 1.1.70.** Sejam  $(X, d)$  um espaço métrico e  $Y \subset X$ . Note que a restrição de  $d$  a  $Y$  induz uma métrica sobre  $Y$ . Mostre que a topologia induzida por tal métrica e a topologia induzida de subespaço de  $X$  coincidem.

**Exercício 1.1.71.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $Y \subset X$  subespaço. Mostre que  $F \subset Y$  é fechado em  $Y$  se, e somente se, existe  $F' \subset X$  fechado em  $X$  tal que  $F = F' \cap Y$ .

**Exercício 1.1.72.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $Y \subset X$  subespaço fechado. Mostre que  $F \subset Y$  é fechado em  $Y$  se, e somente se,  $F$  é fechado em  $X$ .

**Exercício 1.1.73.** Encontre o análogo do Exercício 1.1.72 para abertos.

**Exercício 1.1.74.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico. Dados  $A \subset X$  não vazio e  $x \in X$ , definimos  $d(x, A)$  (**distância de ponto a conjunto**) como  $d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$ . Mostre que  $x \in \overline{A}$  se, e somente se,  $d(x, A) = 0$ .

**Exercício 1.1.75.** Considere  $\tau = \{A \subset \mathbb{Z} : \text{para todo } a \in A, \text{ existe } b \in \mathbb{N}_{>0} \text{ tal que } \{a + bz : z \in \mathbb{Z}\} \subset A\}$ .

- (a) Mostre que  $\tau$  é uma topologia sobre  $\mathbb{Z}$ .
- (b) Mostre que não existe um aberto não vazio que seja finito.
- (c) Mostre que, dados  $a \in \mathbb{Z}$  e  $b \in \mathbb{N}_{>0}$ , o conjunto  $S(a, b) = \{a + bz : z \in \mathbb{Z}\}$  é aberto e fechado.
- (d) Mostre que  $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \text{ é primo}} S(0, p)$ .

(e) Mostre que existem infinitos primos.

**Exercício 1.1.76.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico,  $A \subset X$ ,  $x \in X$  e  $\mathcal{V}$  um sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ . Mostre que  $x \in \overline{A}$  se, e somente se, para todo  $V \in \mathcal{V}$ ,  $V \cap A \neq \emptyset$ .

**Exercício 1.1.77.** Seja  $X$  um conjunto e sejam  $\tau$  e  $\sigma$  topologias sobre  $X$ . Sejam  $\mathcal{B}$  e  $\mathcal{C}$  bases para  $(X, \tau)$  e  $(X, \sigma)$  respectivamente.

- (a) Suponha que para todo  $x \in X$  e todo  $B \in \mathcal{B}$  e  $C \in \mathcal{C}$  tais que  $x \in B$  e  $x \in C$  existam  $C' \in \mathcal{C}$  e  $B' \in \mathcal{B}$  tais que  $x \in C' \subset B$  e  $x \in B' \subset C$ . Mostre que  $\tau = \sigma$ .
- (b) Suponha que para todo  $x \in X$  e todo  $B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$  exista  $C \in \mathcal{C}$  tal que  $x \in C \subset B$ . É verdade que  $\sigma = \tau$ ? Se não for verdade, vale alguma das inclusões?

**Exercício 1.1.78.** Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Para cada  $x \in X$ , seja  $\mathcal{V}_x$  um sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ . Mostre que, dado  $A \subset X$ ,  $A$  é aberto se, e somente se, para todo  $x \in A$  existe  $V \in \mathcal{V}_x$  tal que  $x \in V \subset A$ .

**Exercício 1.1.79.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é um **espaço zero-dimensional** se ele possui uma base formada por abertos fechados.

- (a) Mostre que a reta de Sorgenfrey é zero-dimensional.

- (b) Mostre que tanto  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  quanto  $\mathbb{Q}$  são zero-dimensionais (considerados com a topologia de subsespaço).
- (c) Mostre que se  $Y$  é subespaço de um espaço zero-dimensional, então  $Y$  também é zero-dimensional.

**Exercício 1.1.80.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $\mathcal{B}$  base para  $(X, \tau)$ . Mostre que  $\tau$  é a menor topologia que contém  $\mathcal{B}$ . Isto é, mostre que  $\tau = \bigcap_{\sigma \in T} \sigma$  onde  $T = \{\sigma : \sigma \text{ é uma topologia para } X \text{ tal que } \mathcal{B} \subset \sigma\}$ .

**Exercício 1.1.81.** Dado um conjunto  $X$  e uma família  $\mathcal{B}$  de subconjuntos de  $X$ , chamamos de **topologia gerada** por  $X$  o conjunto  $[\mathcal{B}] = \bigcap_{\tau \in T} \tau$ , onde  $T = \{\tau \subset \wp(X) : \tau \text{ é topologia sobre } X \text{ e } \mathcal{B} \subset \tau\}$ .

- (a) Mostre que  $T$  definido acima é não vazio (e, portanto, podemos tomar a intersecção).
- (b) Mostre que  $[\mathcal{B}]$  é uma topologia sobre  $X$ .
- (c) Mostre que, se  $\mathcal{B}$  satisfaz:
- (i)  $\forall x \in X, \exists B \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B$ ;
  - (ii)  $\forall A, B \in \mathcal{B}, \forall x \in A \cap B, \exists C \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in C \subset A \cap B$ .
- então  $\mathcal{B}$  é uma base para  $(X, [\mathcal{B}])$ .

## 1.2 Axiomas de Separação

Muitas vezes, só a definição de topologia é muito simples para que possamos trabalhar. Nesta seção veremos algumas hipóteses adicionais que podemos pedir num espaço topológico. As hipóteses desta seção tem como objetivo, por exemplo, exigir que a topologia sobre o espaço seja rica o suficiente para diferenciar os pontos do espaço, ou separar os pontos entre si ou até mesmo separar fechados. Apresentaremos as propriedades em ordem de “força” (veja o Exercício 1.2.27).

Num espaço  $T_0$ , pelo menos um dos abertos da Figura 1.4 existe.

Num espaço  $T_0$ , os abertos **Definição 1.2.1.** Dizemos que um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_0$  se para “diferenciam” pontos, isto é, quaisquer  $x, y \in X$  distintos existir um aberto  $A$  tal que  $(x \in A \text{ e } y \notin A)$  ou  $(x \notin A \text{ e } y \in A)$ .  
é, dados dois pontos distintos, existe ao menos um aberto que os distingue.




Figura 1.4: Abertos diferentes para pontos diferentes

Vejamos alguns exemplos de espaços que não são  $T_0$ . Exemplos que satisfazem tal propriedade serão dados no decorrer do texto (veja também o Exercício 1.2.24).

**Exemplo 1.2.2.** Qualquer conjunto  $X$  com mais de dois pontos, munido da topologia caótica não é  $T_0$ .

**Exemplo 1.2.3.** Seja  $X$  um conjunto qualquer com pelo menos dois elementos. Fixe  $x, y \in X$  distintos e defina  $\tau = \{A \subset X : x, y \in A \text{ ou } A = \emptyset\}$ . É fácil ver que  $(X, \tau)$  é um espaço topológico. Contudo, não existe aberto em  $X$  tal que  $x \in A$  e  $y \notin A$  ou  $y \in A$  e  $x \notin A$ . Logo  $(X, \tau)$  não é  $T_0$ .

**Proposição 1.2.4.** Um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_0$  se, e somente se, para quaisquer  $x, y \in X$  distintos e para quaisquer bases locais  $\mathcal{B}_x, \mathcal{B}_y$  para  $x$  e  $y$  respectivamente, tivermos que  $\mathcal{B}_x \neq \mathcal{B}_y$ .

*Demonstração.* Suponha  $(X, \tau)$   $T_0$ . Tomemos  $x, y \in X$  pontos distintos e  $\mathcal{B}_x, \mathcal{B}_y$  bases locais arbitrárias para  $x$  e  $y$  respectivamente. Por  $X$  ser  $T_0$ , existe um aberto  $A$  tal que  $x \in A$  e  $y \notin A$ , ou  $x \notin A$  e  $y \in A$ . Sem perda de generalidade, suponha o primeiro caso. Por  $\mathcal{B}_x$  ser base, existe  $B \in \mathcal{B}_x$  tal que  $x \in B \subset A$ . Como  $y \notin A$ , segue que  $y \notin B$  e, por tanto,  $B \notin \mathcal{B}_y$ , mostrando que  $\mathcal{B}_x \neq \mathcal{B}_y$ .

Reciprocamente, suponha que para quaisquer  $x, y \in X$  distintos, toda base local de  $x$  seja distinta de qualquer base local de  $y$ . Em particular,

Esse resultado deixa claro que os pontos próximos de um ponto são diferentes dos próximos a outro num espaço  $T_0$ .

$\mathcal{B}_x = \{A \in \tau : x \in A\}$  e  $\mathcal{B}_y = \{A \in \tau : y \in A\}$  são bases locais de  $x$  e  $y$  respectivamente. Logo,  $\mathcal{B}_x \neq \mathcal{B}_y$  pela hipótese. Assim, existe  $B \in \mathcal{B}_x$  tal que  $B \notin \mathcal{B}_y$  ou existe  $B \in \mathcal{B}_y$  tal que  $B \notin \mathcal{B}_x$ .  $\square$

Já nos espaços  $T_1$ , exigimos que ambos os abertos da Figura 1.4 existam.

Note que ser  $T_1$  é “mais forte” do que ser  $T_0$ , pois enquanto o último exige a existência de um aberto que satisfaça ao menos um dentre dois casos, ser  $T_1$  exige a existência de abertos que satisfaçam ambos os casos.

**Definição 1.2.5.** Dizemos que um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_1$  se, e somente se, para quaisquer  $x, y \in X$  distintos, existir  $A$  aberto tal que  $x \in A$  e  $y \notin A$ .

Provavelmente a caracterização mais importante de  $T_1$  é a seguinte:

**Proposição 1.2.6.**  $(X, \tau)$  é  $T_1$  se, e somente se, para todo  $x \in X$ ,  $\{x\}$  é fechado.

*Demonstração.* Suponha  $(X, \tau)$  um espaço  $T_1$ . Sejam  $x, y \in X$  tais que  $x \neq y$ . Como  $(X, \tau)$  é  $T_1$ , existe um aberto  $A$  tal que  $y \in A$  e  $x \notin A$ , isto é,  $A \cap \{x\} = \emptyset$ . Logo,  $y \notin \overline{\{x\}}$ . Assim, o único ponto que pode pertencer a  $\overline{\{x\}}$  é o próprio  $x$ . Ou seja  $\overline{\{x\}} = \{x\}$ .

Reciprocamente, sejam  $x, y \in X$  distintos. Como  $\{x\}$  é fechado para qualquer  $x \in X$ , então  $X \setminus \{x\}$  é um conjunto aberto. Assim,  $X \setminus \{x\}$  é um aberto tal que  $y \in X \setminus \{x\}$  e  $x \notin X \setminus \{x\}$ .  $\square$

**Exemplo 1.2.7.** Um conjunto  $X$  com a topologia cofinita é sempre  $T_1$ . De fato, dados  $x, y \in X$  distintos, o complementar de  $\{x\}$  é um aberto que não contém  $x$  mas contém  $y$ .

Para espaços de Hausdorff, já exigimos que os abertos em volta dos pontos sejam disjuntos.

Num espaço de Hausdorff, os abertos “separam” pontos.

**Definição 1.2.8.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é  $T_2$  (**espaço de Hausdorff**) se, para todo  $x, y \in X$  distintos, existem  $A, B$  abertos tais que  $x \in A$ ,  $y \in B$  e  $A \cap B = \emptyset$ .

**Exemplo 1.2.9.**  $X$  munido da topologia cofinita é  $T_1$ , mas não é  $T_2$  se  $X$  for infinito. De fato, sejam  $x, y \in X$  distintos e abertos  $A, B$  tais que  $x \in A$  e  $y \in B$ . Temos que  $A = X \setminus F_1$  e  $B = X \setminus F_2$ , com  $F_1, F_2$  finitos. Logo,  $A \cap B = X \setminus (F_1 \cup F_2)$  e, como  $X$  é infinito,  $A \cap B$  é necessariamente não vazio.

**Proposição 1.2.10.** Considere  $(X, d)$  um espaço métrico. Então tal espaço é de Hausdorff (com a topologia induzida pela métrica).




Figura 1.5: Comportamento de vizinhanças em espaços  $T_3$

*Demonstração.* Sejam  $x, y \in X$  distintos. Seja  $r = d(x, y) > 0$ . Vamos mostrar que  $B_{\frac{r}{2}}(x) \cap B_{\frac{r}{2}}(y) = \emptyset$ . Suponha que não. Seja  $a \in B_{\frac{r}{2}}(x) \cap B_{\frac{r}{2}}(y)$ . Então

$$d(x, y) \leq d(x, a) + d(a, y) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r,$$

absurdo, pois  $d(x, y) = r$ . □

**Definição 1.2.11.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é  $T_3$  se, para quaisquer  $x \in X$  e Num espaço topológico regular, os abertos “separados”  $F \subset X$  fechado tais que  $x \notin F$  existirem  $A, B$  abertos tais que  $x \in A$ ,  $F \subset B$  e  $A \cap B = \emptyset$ . Se, além disso,  $(X, \tau)$  é  $T_1$ , dizemos que  $(X, \tau)$  é um **espaço regular**<sup>1</sup>.

O próximo resultado é provavelmente a principal caracterização de espaços  $T_3$ :

**Proposição 1.2.12.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico.  $(X, \tau)$  é  $T_3$  se, e somente se, para todo  $x \in X$  e para todo aberto  $V$  tal que  $x \in V$ , existe um aberto  $A$  tal que  $x \in A \subset \overline{A} \subset V$ .* Veja a Figura 1.5.

*Demonstração.* Suponha  $(X, \tau)$  espaço  $T_3$ . Sejam  $x \in X$  e  $V \in \tau$  tal que  $x \in V$ . Note que  $X \setminus V$  é um fechado e  $x \notin X \setminus V$ . Então existem  $A, B$

<sup>1</sup>Essa nomenclatura não é padrão - às vezes se supõe  $T_1$  para regulares, às vezes não.

abertos disjuntos tais que  $x \in A$  e  $X \setminus V \subset B$ . Assim,  $A \subset X \setminus B$  que é fechado. Logo,  $\overline{A} \subset X \setminus B \subset V$ .

Reciprocamente, mostremos que  $(X, \tau)$  é  $T_3$ . Sejam  $x \in X$  e  $F \subset X$  fechado tais que  $x \notin F$ . Então  $X \setminus F$  é aberto e contém  $x$ . Logo, existe  $A$  aberto tal que  $x \in A \subset \overline{A} \subset X \setminus F$ . Note que  $x \in A$ ,  $F \subset X \setminus \overline{A}$  e  $A \cap (X \setminus \overline{A}) = \emptyset$ .  $\square$

**Corolário 1.2.13.** *Um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_3$  se, e somente se, para todo  $x \in X$  existe um sistema fundamental de vizinhanças fechadas para  $x$ .*

*Demonstração.* Veja o Alongamento 1.2.22.  $\square$

Neste e no próximo exemplo já estamos supondo claro que os espaços em questão são  $T_1$ .

**Exemplo 1.2.14.**  $\mathbb{R}$  é regular. De fato, para cada  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\left\{ \left[ x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n} \right] : n \in \mathbb{N} \right\}$$

é um sistema fundamental de vizinhanças fechadas para  $x$ .

**Exemplo 1.2.15.** A reta de Sorgenfrey é regular (veja o Exemplo 1.1.48, e considere o Corolário 1.2.13).

Veja o Exercício 1.2.30 para um exemplo de um espaço de Hausdorff que não seja regular.

Num espaço normal, os abertos separam os fechados disjuntos.

**Definição 1.2.16.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é  $T_4$  se, para quaisquer  $F, G \subset X$  fechados disjuntos, existirem  $A, B$  abertos disjuntos tais que  $F \subset A$ ,  $G \subset B$ . Se, além disso,  $(X, \tau)$  é  $T_1$ , dizemos que  $(X, \tau)$  é **espaço normal**<sup>2</sup>.

**Exemplo 1.2.17.** Vamos mostrar mais para frente que todo métrico é normal (Corolário 2.2.4).

**Exemplo 1.2.18.** A reta de Sorgenfrey é normal. Vamos provar tal afirmação. Primeiramente, note que ela é  $T_1$ .

Sejam  $F, G$  fechados disjuntos. Para cada  $a \in F$  e cada  $b \in G$ , sejam  $x(a)$  e  $y(b)$  de forma que

$$[a, x(a)[ \cap G = \emptyset \text{ e } [b, y(b)[ \cap F = \emptyset.$$

Podemos fazer isso pois os complementares de  $F$  e  $G$  são abertos. Sejam

$$A = \bigcup_{a \in F} [a, x(a)[ \text{ e } B = \bigcup_{b \in G} [b, y(b)[.$$

<sup>2</sup>Novamente, tal nomenclatura não é completamente padrão. Às vezes se supõe  $T_1$ , às vezes não.



Note que  $F \subset A$  e  $G \subset B$ , os quais são abertos. Vamos mostrar que  $A \cap B = \emptyset$ . Suponha que não. Então existe  $c \in A \cap B$ . Para tanto, existem  $a \in F$  e  $b \in G$  tais que  $c \in [a, x(a)[ \cap ]b, y(b)[$ .

Caso  $a < b$ : então  $x(a) < b$ , pois  $b \notin [a, x(a)[$ , logo  $[a, x(a)[ \cap ]b, y(b)[ = \emptyset$ , absurdo. Se  $b < a$ , obtém-se uma contradição de maneira análoga. É claro que  $a = b$  não pode ocorrer por estarmos supondo  $F \cap G = \emptyset$ .

**Exemplo 1.2.19.** Veremos mais para frente que o quadrado da reta de Sorgenfrey é regular mas não é normal (Proposição ??).

Veremos que até regularidade, as propriedades desta seção são “bem comportadas” e muitas vezes a verificação de se um espaço tem ou não a propriedade é elementar. Mas com a normalidade, a situação muda. Desta forma, um tipo de resultado bastante útil é quando podemos “subir” alguma propriedade até a normalidade. O próximo resultado vai nesta direção: veremos que para um espaço enumerável ser normal basta ele ser regular. A ideia para a demonstração será usada outras vezes no decorrer do texto:

**Proposição 1.2.20.** *Todo espaço enumerável e regular é normal.*

Note que na verdade estamos provando que todo espaço  $T_3$  enumerável é  $T_4$ .

*Demonstração.* Sejam  $F$  e  $G$  fechados disjuntos. Faça  $F = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  e  $G = \{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Como o espaço é regular, para cada  $m \in \mathbb{N}$ , existe  $A_m$  aberto tal que  $x_m \in A_m$  e  $\overline{A_m} \cap G = \emptyset$  (pela Proposição 1.2.12), bem como  $B_m$  aberto tal que  $y_m \in B_m$  e  $\overline{B_m} \cap F = \emptyset$ .

Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , defina

$$A_n^* = A_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{B_k} \text{ e } B_n^* = B_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{A_k}.$$

Note que  $A_n^*$  e  $B_n^*$  são abertos (pois  $A \setminus B = A \cap (X \setminus B)$  para  $A, B \subset X$ ).

Sejam  $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^*$  e  $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n^*$ . Note que  $F \subset A$  e  $G \subset B$  (em particular, observe que  $A_n^* \cap F = A_n \cap F$ ). Vamos mostrar que  $A \cap B = \emptyset$ . Suponha que não. Então existe  $z \in A \cap B$ . Sejam  $m, n \in \mathbb{N}$  tais que  $z \in A_n^*$  e  $z \in B_m^*$ .

Vamos fazer o caso  $n \leq m$ , o outro é análogo. Então  $z \in A_n^* = A_n \setminus \bigcup_{k \leq n} \overline{B_k}$  e  $z \in B_m^* = B_m \setminus \bigcup_{k \leq m} \overline{A_k}$ . Note que, como  $m \geq n$ ,  $z \notin \bigcup_{k \leq m} \overline{A_k} \supset \overline{A_n} \supset A_n \supset A_n^*$ , contradição, pois supomos  $z \in A_n^*$ .  $\square$

## Alongamentos

**Alongamento 1.2.21.** Mostre que um espaço finito é  $T_1$  se, e somente se, tem a topologia discreta.

**Alongamento 1.2.22.** Demonstre o Corolário 1.2.13.

**Alongamento 1.2.23.** Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Mostre que  $T_4$  é equivalente à seguinte propriedade: “Para todo  $F$  fechado e todo  $V$  aberto tal que  $F \subset V$ , existe um aberto  $U$  tal que  $F \subset U \subset \bar{U} \subset V$ ”.

### Exercícios

**Exercício 1.2.24.** Dê um exemplo de um espaço  $T_0$  que não seja  $T_1$ .

**Exercício 1.2.25.**  $(X, \tau)$  é  $T_0$  se, e somente se, para quaisquer  $x, y \in X$  distintos tivermos  $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{y\}}$ .

**Exercício 1.2.26.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. São equivalentes:

- (a)  $(X, \tau)$  é  $T_1$ ;
- (b)  $\forall x \in X$ , existe  $\mathcal{A}$  uma coleção de abertos tal que  $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = \{x\}$ ;
- (c)  $\forall x \in X$  existe  $\mathcal{V}_x$  um sistema fundamental de vizinhanças para  $x$  tal que  $\bigcap_{V \in \mathcal{V}_x} V = \{x\}$ ;

**Exercício 1.2.27.** Prove a cadeia de implicações:  $(X, \tau)$  é normal  $\Rightarrow (X, \tau)$  é regular  $\Rightarrow (X, \tau)$  é  $T_2 \Rightarrow (X, \tau)$  é  $T_1 \Rightarrow (X, \tau)$  é  $T_0$ .

**Exercício 1.2.28.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $Y \subset X$  subespaço. Mostre que se  $(X, \tau)$  é  $T_i$  para  $i = 0, \dots, 3$ , então  $Y$  também é.

**Exercício 1.2.29.** Mostre que se  $Y$  é subespaço fechado de um espaço normal, então  $Y$  também é normal.

**Exercício 1.2.30.** Considere  $\mathbb{R}$  com a topologia gerada pelos conjuntos da forma

$$]a, b[ \setminus C$$

onde  $a < b \in \mathbb{Q}$  e  $C \subset \mathbb{R}$  é enumerável. Vamos chamar tal espaço de **reta esburacada**.

- (a) Mostre que isso é uma base para tal topologia;
- (b) Mostre que tal espaço é de Hausdorff;
- (c) Mostre que todo subconjunto enumerável é fechado;
- (d) Mostre que tal espaço não é regular.

**Exercício 1.2.31.** Mostre que  $\mathbb{Q}$  com a topologia induzida pela reta de Sorgenfrey é normal.

### 1.3 Axiomas de Enumerabilidade

Nesta seção vamos começar a investigar quando a existência de determinados conjuntos enumeráveis nos dão propriedades importantes sobre o espaço. Tais propriedades serão muito usadas no decorrer do texto.

**Definição 1.3.1.** Dizemos que um espaço topológico  $(X, \tau)$  satisfaz o **primeiro axioma de enumerabilidade** (*1st countable*) se, para todo  $x \in X$ , existe um sistema fundamental de vizinhanças enumerável. Neste caso, também dizemos que  $(X, \tau)$  tem **bases locais enumeráveis**.

Veja o Alongamento 1.3.24 para ver que um ponto ter um sistema fundamental de vizinhanças enumerável é equivalente a ter uma base local enumerável.

**Exemplo 1.3.2.** Todo espaço métrico  $(X, d)$  satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade. Para isso, basta notar que  $\{B_{\frac{1}{n}}(x) : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças para cada  $x \in X$ .

**Exemplo 1.3.3.** A reta de Sorgenfrey satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade, já que  $\{[x, x + \frac{1}{n}[: n \in \mathbb{N}_{>0}\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças para cada  $x \in X$ .

O primeiro axioma de enumerabilidade tem bastante em comum com o conceito de sequência convergente:

**Definição 1.3.4.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Seja  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de pontos de  $X$ . Dizemos que  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  **converge** para  $x \in X$  se, para toda vizinhança  $V$  de  $x$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq n_0$ ,  $x_n \in V$ . Notação:  $x_n \rightarrow x$ .

Note que esta definição permanece equivalente se trocarmos vizinhança por aberto contendo o ponto (veja o Alongamento 1.3.25).

**Proposição 1.3.5.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $x_n \rightarrow x$ . Então,  $x \in \overline{\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}$ .*

*Demonstração.* Seja  $V$  vizinhança de  $x$ . Seja  $n_0$  da definição de convergência. Note que  $x_{n_0} \in V \cap \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ . □

**Corolário 1.3.6.** *Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $Y \subset X$ . Sejam  $x \in X$  e  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de pontos de  $Y$ . Se  $y_n \rightarrow x$ , então  $x \in \overline{Y}$ .*

Para espaços que satisfazem o primeiro axioma de enumerabilidade, ser ponto aderente pode ser caracterizado por limite de sequências:

**Proposição 1.3.7.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico com bases locais enumeráveis. Sejam  $Y \subset X$  e  $x \in X$ . Então,  $x \in \overline{Y}$  se, e somente se, existe  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sequência de pontos de  $Y$  tal que  $y_n \rightarrow x$ .*

A hipótese sobre as bases locais é necessária. Veja o Exemplo 1.3.9.




Figura 1.6: Aderência em termos de convergência

*Demonstração.* Um lado já está feito (vale mesmo sem a hipótese sobre as bases).

Suponha que  $x \in \bar{Y}$  e seja  $\mathcal{V} = \{V_n : n \in \mathbb{N}\}$  sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , escolha  $y_n \in \left(\bigcap_{k \leq n} V_k\right) \cap Y$ . Mostremos que  $y_n \rightarrow x$ . Seja  $V$  vizinhança de  $x$ . Como  $\mathcal{V}$  é sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $V_{n_0} \subset V$ . Seja  $n \geq n_0$ . Note que  $y_n \in \bigcap_{k \leq n} V_k \subset V_{n_0} \subset V$ .  $\square$

Espaços de Hausdorff tem a propriedade da unicidade de limites:

**Proposição 1.3.8.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico de Hausdorff. Se  $x_n \rightarrow x$  e  $x_n \rightarrow y$ , então  $x = y$ .*

*Demonstração.* Suponha, por contradição, que  $x \neq y$ . Sejam  $U$  e  $V$  abertos disjuntos tais que  $x \in U$  e  $y \in V$ . Então, existem  $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$  tais que para todo  $n \geq n_1$ ,  $x_n \in U$  e para todo  $n \geq n_2$ ,  $x_n \in V$ . Seja  $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$ , segue que  $x_{n_0} \in U \cap V$ , que é uma contradição.  $\square$

**Exemplo 1.3.9.** Na reta esburacada, se uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é tal que  $x_n \rightarrow x$  para algum  $x$ , então existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $x_n = x$ . De fato, temos que  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  é fechado por ser enumerável (veja o Exercício 1.2.30). Em particular, note que  $0 \in ]0, 1[$  mas não existe sequência em  $]0, 1[$  que




Figura 1.7: A unicidade de limites de seqüências

converge para 0. Com isso, temos que a reta esburacada não tem bases locais enumeráveis.

**Definição 1.3.10.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico. Dizemos que uma seqüência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de pontos de  $X$  é uma **seqüência de Cauchy** se, para todo  $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ , existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para  $n, m \geq n_0$ ,  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ .

**Proposição 1.3.11.** *Seja  $(X, d)$  um espaço métrico e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma seqüência de pontos de  $X$  tal que  $x_n \rightarrow x$ . Então,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma seqüência de Cauchy.*

*Demonstração.* Seja  $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ . Seja  $n_0$  tal que, para todo  $n \geq n_0$ ,  $d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$ . Assim, dados  $n, m \geq n_0$ , temos

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \varepsilon$$

□

**Definição 1.3.12.** Seja  $(X, d)$  um espaço métrico.  $(X, d)$  é dito **espaço métrico completo** se toda seqüência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de Cauchy é convergente.

O segundo axioma de enumerabilidade é uma versão global do primeiro:

**Definição 1.3.13.** Dizemos que  $(X, \tau)$  satisfaz o **segundo axioma de enumerabilidade** (*2nd countable*) se admite uma base enumerável.

**Exemplo 1.3.14.** A reta real satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, já que  $\{]a, b[ : a, b \in \mathbb{Q}\}$  é uma base.

**Proposição 1.3.15.** *Se um espaço topológico  $(X, \tau)$  satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, então também satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade.*

*Demonstração.* Seja  $\mathcal{B}$  uma base para  $(X, \tau)$ . Então,  $\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$  é uma base local para  $x$ .  $\square$

**Exemplo 1.3.16.** A reta de Sorgenfrey não satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade. De fato, suponha, por contradição, que satisfaça. Seja  $\mathcal{B}$  uma base enumerável. Para cada  $x \in X$ , seja  $B_x \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B_x \subset [x, x + 1[$ . Note que se  $x \neq y$ , então  $B_x \neq B_y$ . De fato, sem perda de generalidade, suponha que  $x < y$  e note que  $x \notin B_y$ , pois  $B_y \subset [y, y + 1[$ . Logo,  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{B}$  definida por  $f(x) = B_x$  é injetora, o que é uma contradição, pois  $\mathcal{B}$  é enumerável e  $\mathbb{R}$  não.

**Definição 1.3.17.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Dizemos que  $D \subset X$  é denso em  $X$  se  $\overline{D} = X$ .

**Definição 1.3.18.** Dizemos que  $(X, \tau)$  satisfaz o **terceiro axioma de enumerabilidade** (*3rd countable*) se admite um subconjunto denso enumerável. Neste caso, dizemos também que  $(X, \tau)$  é um **espaço separável**.

**Exemplo 1.3.19.** Temos que a reta real e a reta de Sorgenfrey são separáveis pois em ambos os casos  $\mathbb{Q}$  é denso.

O segundo axioma de enumerabilidade implica no terceiro (e já vimos que ele implica no primeiro também):

**Proposição 1.3.20.** *Se um espaço topológico  $(X, \tau)$  satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, então ele é separável.*

*Demonstração.* Seja  $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma base para  $(X, \tau)$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , seja  $x_n \in B_n$  (podemos supor sem perda de generalidade que  $B_n \neq \emptyset$ ). Vamos mostrar que  $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  é denso. Sejam  $x \in X$  e  $V$  vizinhança de  $x$ . Como  $\mathcal{B}$  é base, existe  $B_n \in \mathcal{B}$  tal que  $x \in B_n \subset V$ . Note que  $x_n \in B_n$ . Portanto,  $x_n \in V \cap D$ .  $\square$

No caso de métricos, vale a volta:

Note que a reta de Sorgenfrey nos dá que a hipótese de metrizabilidade é necessária. **Proposição 1.3.21.** *Se  $(X, d)$  é um espaço métrico e separável, então  $(X, d)$  satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade.*

*Demonstração.* Seja  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  denso em  $X$ . Considere

$$\mathcal{B} = \{B_{\frac{1}{m}}(x_n) : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

Vamos mostrar que  $\mathcal{B}$  é base. Sejam  $A$  aberto e  $x \in A$ . Seja  $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$  tal que  $B_\varepsilon(x) \subset A$ . Seja  $m \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2}$ . Como  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  é denso em  $X$ , existe  $x_n \in B_{\frac{1}{m}}(x)$ . Vamos mostrar que  $x \in B_{\frac{1}{m}}(x_n) \subset B_\varepsilon(x)$ . Primeiramente, note que  $x \in B_{\frac{1}{m}}(x_n)$ , pois  $d(x, x_n) < \frac{1}{m}$ . Temos também que  $B_{\frac{1}{m}}(x_n) \subset B_\varepsilon(x)$ , pois, dado  $a \in B_{\frac{1}{m}}(x_n)$ , temos

$$d(a, x) \leq d(a, x_n) + d(x_n, x) < \frac{1}{m} + \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

**Definição 1.3.22.** Dizemos que o espaço topológico  $(X, \tau)$  é um **espaço metrizável** se existe uma métrica sobre  $X$  que induz a topologia  $\tau$ .

Com o que temos até o momento, já conseguimos dizer em alguns casos quando um espaço não é metrizável:

**Exemplo 1.3.23.** A reta de Sorgenfrey não é um espaço metrizável. De fato, temos que este é um espaço separável mas que não admite uma base enumerável. Assim, pela Proposição 1.3.21, que ele não é metrizável.

Veremos outros critérios ao longo do texto.

## Alongamentos

**Alongamento 1.3.24.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico e  $x \in X$ . Mostre que são equivalentes:

- (i)  $x$  admite um sistema fundamental de vizinhanças enumerável;
- (ii)  $x$  admite uma base local enumerável.

**Alongamento 1.3.25.** Sejam  $(X, \tau)$  espaço topológico,  $x \in X$  e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sequência de pontos de  $X$ . Mostre que são equivalentes:

- (i)  $x_n \rightarrow x$ .
- (ii) para todo  $V$  aberto tal que  $x \in V$ , existe  $n_0$  tal que, se  $n \geq n_0$ , então  $x_n \in V$ .

(iii) dado  $\mathcal{V}$  sistema fundamental de vizinhanças para  $x$ , para todo  $V \in \mathcal{V}$ , existe  $n_0$  tal que, se  $n \geq n_0$ , então  $x_n \in V$ .

**Alongamento 1.3.26.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Mostre que  $D \subset X$  é denso se, e somente se, para todo aberto não vazio  $A$ ,  $A \cap D \neq \emptyset$ .

**Alongamento 1.3.27.** Mostre que se  $(X, \tau)$  é um espaço topológico enumerável que satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade, então  $(X, \tau)$  também satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade.

**Alongamento 1.3.28.** Mostre que todo subespaço de um espaço que satisfaça o primeiro axioma de enumerabilidade também satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade.

**Alongamento 1.3.29.** Mostre que todo subespaço de um espaço com base enumerável tem base enumerável.

**Alongamento 1.3.30.** Mostre que se  $(X, \tau)$  satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade, então todo  $x \in X$  admite um sistema fundamental de vizinhanças abertas enumerável e decrescente, isto é,  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é tal que  $V_{n+1} \subset V_n$ .

## Exercícios

**Exercício 1.3.31.** Mostre que a reta esburacada não é metrizável.

**Exercício 1.3.32.** Mostre que na reta esburacada as únicas sequências convergentes são as quase constantes. Uma sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é dita uma **sequência quase constante** se existem  $x$  e  $n_0$  tais que  $x_n = x$  para todo  $n \geq n_0$ .

**Exercício 1.3.33.** Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Seja  $D \subset X$  denso. Considerando  $D$  como subespaço, mostre que se  $E \subset D$  é denso em  $D$ , então  $E$  é denso em  $X$ .

**Exercício 1.3.34.** Mostre que todo subespaço de um espaço que tenha base enumerável é separável.

**Exercício 1.3.35.** O exemplo deste exercício é chamado de **plano de Niemytski**.

Considere  $X = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, y \geq 0\}$  com a topologia de forma que:

- (i) se  $(x, y)$  é tal que  $y > 0$ , então uma vizinhança básica de  $(x, y)$  é da forma de uma bola aberta centrada em  $(x, y)$  que não intercepta o eixo  $x$ , isto é  $B_\varepsilon((x, y))$  com  $0 < \varepsilon < y$ ;



- (ii) Para os pontos da forma  $(x, 0)$ , uma vizinhança de tal ponto é da forma de uma bola aberta contida em  $\{(a, b) : b > 0\}$  e que tangencie o eixo  $x$  no ponto  $(x, 0)$  (inclua o ponto em tal vizinhança). Ou seja,  $B_y((x, y)) \cup \{(x, 0)\}$ .

onde  $B_r((x, y))$  é a bola com a métrica usual do  $\mathbb{R}^2$ .

- (a) Mostre que isso define uma topologia.  
(b) Mostre que tal espaço é de Hausdorff.  
(c) Mostre que tal espaço é regular.  
(d) Mostre que tal espaço é separável.  
(e) Mostre que o eixo  $x$  ( $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ ) com a topologia de subespaço tem a topologia discreta.  
(f) Mostre que tal espaço não tem base enumerável.  
(g) Mostre que tal espaço não é metrizável.  
(h) Mostre que não é verdade que todo subespaço de um espaço separável é separável (compare com o Exercício 1.3.34).

**Exercício 1.3.36.** Mostre que a reta esburacada não é separável.

**Exercício 1.3.37.** Mostre que, se  $(X, \tau)$  é um espaço regular que satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, então  $(X, \tau)$  é um espaço normal.

**Exercício 1.3.38.** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico,  $\mathcal{B}$  uma base enumerável para  $(X, \tau)$  e seja  $\mathcal{C}$  uma base qualquer para  $(X, \tau)$ . Então, existe uma família enumerável  $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$  que é base para  $(X, \tau)$ .



## Capítulo 2

# Funções

### 2.1 Funções contínuas

Uma maneira de entender a definição de função contínua é a seguinte: imagine que  $f$  seja uma máquina de transformar algo em outra coisa. Para exemplificar, imaginemos que  $f$  transforma farinha em pizza. Assim, se queremos obter “ $y$  m<sup>2</sup> de pizza”, precisamos fornecer  $x$  kg de farinha, de forma que  $f(x) = y$ . Mas, como toda medição acarreta em erros, este processo não tem precisão absoluta. Desta forma, para obtermos “ $y$  m<sup>2</sup> de pizza” dentro de uma margem de erro  $T$  (tolerância), precisamos fornecer  $x$  kg dentro de uma precisão  $P$  (exigida pela  $f$ ). Vamos dizer que  $f$  é contínua se dada uma tolerância qualquer, sempre podemos encontrar uma precisão que satisfaça o processo.

O que não seria nada ruim. Mas não sei de onde viria o molho.

Traduzindo para a nossa linguagem, dados  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos,  $f$  será contínua no ponto  $x$  se para toda tolerância  $T$  em torno de  $f(x)$ , existe uma precisão  $P$  em torno de  $x$  de forma que  $f[P] \subset T$ . Note que essa última condição simplesmente quer dizer que todo os pontos que satisfazem a precisão tem imagem dentro da tolerância. Finalmente, note que estar dentro de uma precisão ou de uma tolerância é simplesmente estar “próximo” de um determinado ponto. Ou seja, basta trabalharmos com estes dois conceitos como sendo vizinhanças:

**Definição 2.1.1.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos e seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Seja também  $x \in X$ . Dizemos que  $f$  é uma função **função contínua no ponto**  $x$  se, para toda vizinhança  $A$  de  $f(x)$  existe uma vizinhança  $B$  de  $x$  tal que  $f[B] \subset A$ .

Veja o Alongamento 2.1.17 para ver que esse conceito de fato generaliza aquele normalmente visto em cursos de Cálculo.

Da mesma forma que obtemos uma definição mais simples (e menos intuitiva) quando abandonamos vizinhanças e definimos abertos diretamente

de uma forma global para o espaço, também temos uma definição para funções contínuas (de maneira global):

**Definição 2.1.2.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos e seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Dizemos que  $f$  é uma **função contínua** se, para todo aberto  $A$  de  $Y$ , temos que  $f^{-1}[A]$  é aberto em  $X$  (i.e.,  $\forall A \in \rho \ f^{-1}[A] \in \tau$ ).

De fato, os conceitos apresentados são versões globais e locais de uma mesma coisa:

**Proposição 2.1.3.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos e  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Então  $f$  é contínua se, e somente se, para todo  $x \in X$ ,  $f$  é contínua no ponto  $x$ .*

*Demonstração.* Suponha  $f$  contínua e  $x \in X$ . Seja  $A$  vizinhança de  $f(x)$  e  $A'$  aberto tal que  $f(x) \in A' \subset A$ . Assim,  $f^{-1}[A']$  é aberto, com  $x \in f^{-1}[A']$  (portanto, vizinhança de  $x$ ) e  $f[f^{-1}[A']] \subset A' \subset A$ .

Agora, suponha que para todo  $x \in X$ ,  $f$  é contínua em  $x$ . Seja  $A$  aberto em  $Y$ . Para cada  $x \in X$  tal que  $f(x) \in A$ , seja  $B_x$  vizinhança de  $x$  tal que  $f[B_x] \subset A$ . Como  $B_x$  é vizinhança de  $x$ , existe  $B'_x$  aberto tal que  $x \in B'_x \subset B_x$ . Assim,  $f^{-1}[A] = \bigcup_{x \in f^{-1}[A]} B'_x$  é aberto.  $\square$

**Exemplo 2.1.4.** Considere  $(X, \tau)$  um espaço topológico. Então a função  $I : X \rightarrow X$  dada por  $I(x) = x$  para todo  $x \in X$  (**função identidade**) é contínua (a verificação é imediata).

**Exemplo 2.1.5.** Qualquer função constante é contínua. De fato, sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos e considere uma função constante  $f : X \rightarrow Y$  dada por  $f(x) = k$ . Seja  $A$  um aberto de  $(Y, \sigma)$ . Então,

$$f^{-1}[A] = \begin{cases} \emptyset, & k \notin A \\ X, & k \in A \end{cases}$$

Ou seja, em ambos os casos  $f^{-1}[A]$  é um aberto de  $(X, \tau)$ .

Com a definição global de continuidade, prova-se o seguinte resultado facilmente:

Este resultado é lido como **Proposição 2.1.6.** *Sejam  $(X_1, \tau_1)$ ,  $(X_2, \tau_2)$  e  $(X_3, \tau_3)$  espaços topológicos e sejam  $g : X_1 \rightarrow X_2$  e  $f : X_2 \rightarrow X_3$  funções contínuas. Então,  $f \circ g : X_1 \rightarrow X_3$  é contínua.* O que era de se esperar.

*Demonstração.* Seja  $A$  um aberto em  $X_3$ . Como  $f$  é contínua, temos que  $f^{-1}[A]$  é aberto em  $X_2$ . Agora, como  $g$  é contínua,  $g^{-1}[f^{-1}[A]]$  é aberto em  $X_1$ . Mas, como  $g^{-1}[f^{-1}[A]] = (f \circ g)^{-1}[A]$ , a proposição está provada.  $\square$




Figura 2.1: Composta de contínuas é contínua (vá da direita para a esquerda)

Densos são “empurrados” por funções contínuas:

**Proposição 2.1.7.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos e  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua sobrejetora. Se  $D \subset X$  é denso em  $X$ , então,  $f[D]$  é denso em  $Y$ .*

*Demonstração.* Seja  $A \subset Y$  aberto não vazio. Note que  $f^{-1}[A]$  é aberto em  $X$ . Como  $f$  é sobrejetor,  $f^{-1}[A] \neq \emptyset$ . Logo, existe  $d \in D$  tal que  $d \in f^{-1}[A]$ , ou seja,  $f(d) \in A$ . Portanto,  $f[D] \cap A \neq \emptyset$ .  $\square$


**Corolário 2.1.8.** *Imagem contínua de um espaço separável é separável.*

O seguinte exemplo será útil no estudo de sequências convergentes:

**Exemplo 2.1.9.** Considere o conjunto  $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$  com a topologia gerada pelos conjuntos

- (a)  $\{n\}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ;
- (b)  $\{\infty\} \cup A$ , em que  $A \subset \mathbb{N}$  e  $\mathbb{N} \setminus A$  é finito.

Note que, desta forma, um conjunto contendo  $\infty$  é aberto se, e somente se, apenas uma quantidade finita de elementos de  $\mathbb{N}$  não pertence a ele. Chamamos este espaço de **espaço da sequência convergente**.

Figura 2.2: Típica vizinhança de  $\infty$ 

**Proposição 2.1.10.** *Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico e seja  $f : \mathbb{N} \cup \{\infty\} \rightarrow X$  uma função  $(\mathbb{N} \cup \{\infty\})$  com a topologia do exemplo anterior). Então,  $f$  é contínua se, e somente se,  $f(n) \rightarrow f(\infty)$  (i.e., a sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , em que cada  $x_n = f(n)$ , é convergente para  $x = f(\infty)$ ).*

*Demonstração.* Suponha  $f$  contínua. Seja  $A$  aberto tal que  $f(\infty) \in A$ . Como  $f$  é contínua,  $f^{-1}[A]$  é aberto. Logo,  $\mathbb{N} \setminus f^{-1}[A]$  é finito, ou seja, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para  $n \geq n_0$ ,  $n \in f^{-1}[A]$ . Logo, para  $n \geq n_0$ ,  $f(n) \in A$ .

Agora, suponha que  $f(n) \rightarrow f(\infty)$ . É imediato que  $f$  é contínua em todo  $n \in \mathbb{N}$ . Mostremos que  $f$  é contínua em  $\infty$ . Seja  $A$  aberto tal que  $f(\infty) \in A$ . Como  $f(n) \rightarrow f(\infty)$ , existe  $n_0$  tal que para  $n \geq n_0$ ,  $f(n) \in A$ . Logo,  $\{n : n \geq n_0\} \subset f^{-1}[A]$  e  $\infty \in \{n : n \geq n_0\} \cup \{\infty\} \subset f^{-1}[A]$ .  $\square$

Funções contínuas também “empurram” sequências convergentes:

**Proposição 2.1.11.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos,  $f : X \rightarrow Y$  função contínua e  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência convergente para  $x \in X$ . Então,  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .*

*Demonstração.* Considere a função  $h : \mathbb{N} \cup \{\infty\} \rightarrow X$ , com  $h(n) = x_n$  e  $h(\infty) = x$ . Note que  $h$  é contínua pela proposição anterior. Note também que  $f \circ h$  é contínua, pois é composta de contínuas. Note que  $(f \circ h)(n) =$

$f(x_n)$ , para  $n \in \mathbb{N}$  e que  $(f \circ h)(\infty) = f(\infty)$ . Logo, pela proposição anterior, aplicada a  $f \circ h$ , temos  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .  $\square$

No caso de espaços “ricos” em sequências convergentes, também temos a volta do resultado anterior:

**Proposição 2.1.12.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos, onde  $(X, \tau)$  possui bases locais enumeráveis. Dada  $f : X \rightarrow Y$  uma função, temos que  $f$  é contínua se, e somente se, para toda sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  tal que  $x_n \rightarrow x$ , temos que  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .* Veja também o Exercício 2.1.22.

*Demonstração.* Já está feito supondo  $f$  contínua.

Para a recíproca, sejam  $x \in X$  e  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  base local para  $x$ . Seja  $A$  aberto em  $Y$  tal que  $f(x) \in A$ . Mostremos que existe  $V$  aberto tal que  $x \in V \subset f^{-1}[A]$ . Suponha, por contradição, que não existe. Então, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , temos que  $\bigcap_{k \leq n} B_k \not\subset f^{-1}[A]$ . Seja  $x_n \in \bigcap_{k \leq n} B_k$  tal que  $f(x_n) \notin A$ . Agora, observe que  $x_n \rightarrow x$ . De fato, seja  $V \ni x$  aberto. Existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $x \in B_n \subset V$ . Portanto, para todo  $m \geq n$ ,  $x_m \in V$ . Note, também, que  $f(x_n) \not\rightarrow f(x)$ . De fato, veja que  $f(x) \in A$ , que é aberto e para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f(x_n) \notin A$ , que é contradição.  $\square$

**Corolário 2.1.13.** *Sejam  $(X, d_1)$  e  $(Y, d_2)$  espaços métricos e  $f : X \rightarrow Y$  uma função. Então,  $f$  é contínua se, e somente se, para toda sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  em  $X$  tal que  $x_n \rightarrow x$ , temos que  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .*

## Alongamentos

**Alongamento 2.1.14.** Mostre que  $f : X \rightarrow Y$  é contínua se, e somente se,  $f^{-1}[F]$  é fechado (em  $X$ ) para todo  $F \subset Y$  fechado.

**Alongamento 2.1.15.** Mostre que na definição de função contínua poderíamos supor os abertos da imagem como sendo básicos (isto é, os abertos em  $Y$  serem elementos de uma base  $\mathcal{B}$  fixada previamente).

**Alongamento 2.1.16.** Mostre o análogo do alongamento anterior para a definição de continuidade num ponto, trocando vizinhança por “elemento de uma base local” fixada.

**Alongamento 2.1.17.** Sejam  $(X_1, d_1)$  e  $(X_2, d_2)$  espaços métricos e  $f : X_1 \rightarrow X_2$  uma função. Mostre que, para cada  $x \in X_1$ , são equivalentes: Para aqueles que gostam de  $\varepsilon$ 's e  $\delta$ 's.

- (a)  $f$  contínua em  $x$  (com as topologia induzidas pelas métricas);
- (b)  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in X, d_1(x, y) < \delta \rightarrow d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$ .

**Alongamento 2.1.18.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos e  $Z \subset X$  subespaço de  $X$ . Seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua. Mostre que  $(f \upharpoonright Z) : Z \rightarrow Y$  é contínua.

### Exercícios

**Exercício 2.1.19.** Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico. Seja  $A$  um aberto fechado em  $X$ . Mostre que a **função característica** de  $A$  é contínua. Isto é, que a função  $\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$  dada por

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

é contínua (considere em  $\{0, 1\}$  a topologia discreta (ou a induzida por  $\mathbb{R}$ , que dá na mesma)).

**Exercício 2.1.20.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos. Sejam  $F_1, \dots, F_n \subset X$  fechados tais que  $\bigcup_{i=1}^n F_i = X$ . Seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função.

- Mostre que se  $f \upharpoonright F_i$  é contínua para todo  $i = 1, \dots, n$ , então  $f$  é contínua;
- Note que a volta é imediata (mesmo que cada  $F_i$  não seja fechado).
- Dê um exemplo para mostrar que a hipótese de que cada  $F_i$  ser fechado é necessária no item (a).

**Exercício 2.1.21.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos. Seja  $(A_i)_{i \in I}$  família de abertos de  $X$  tal que  $\bigcup_{i \in I} A_i = X$ . Seja  $f : X \rightarrow Y$ .

- Mostre que se  $f \upharpoonright A_i$  é contínua para todo  $i \in I$ , então  $f$  é contínua.
- Note que a volta é imediata (mesmo que cada  $A_i$  não seja aberto).

**Exercício 2.1.22.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos, sendo que  $(X, \tau)$  satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade. Mostre que podemos melhorar a Proposição 2.1.12 para  $f : X \rightarrow Y$  é contínua se, e somente, para toda sequência  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  convergente em  $X$ , temos que  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  é convergente.

**Exercício 2.1.23.** Considere  $(X, \tau)$  como sendo a reta esburacada e seja  $(Y, \rho)$  um espaço qualquer. Seja  $f : X \rightarrow Y$ . Mostre que se  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência convergente em  $X$ , então  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência convergente em  $Y$ . Conclua que a hipótese sobre o primeiro axioma de enumerabilidade é essencial no exercício anterior (e na Proposição 2.1.12).



## 2.2 Lema de Urysohn

Nesta seção veremos uma equivalência entre a normalidade e a existência de determinadas funções contínuas. Começemos com o “lado fácil”:

**Proposição 2.2.1.** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico de modo que, para todos  $F, G \subset X$  fechados disjuntos, existe uma função contínua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que, para todo  $x \in F$ ,  $f(x) = 0$  e, para todo  $y \in G$ ,  $f(y) = 1$ . Então,  $(X, \tau)$  é  $T_4$ .*

*Demonstração.* Note que  $F \subset f^{-1}[[0, \frac{1}{2}[$  e  $G \subset f^{-1}][\frac{1}{2}, 1]$  e, por  $f$  ser uma função contínua, tais conjuntos são abertos e disjuntos.  $\square$

Com este resultado, podemos mostrar facilmente a normalidade de espaços métricos:

**Definição 2.2.2.** Sejam  $(X, d)$  espaço métrico e  $A, B \subset X$  conjuntos não vazios. Definimos  $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$ . No caso  $A = \{a\}$ , denotamos  $d(A, B) = d(a, B)$  (analogamente para  $B = \{b\}$ ).

**Exemplo 2.2.3.** Sejam  $(X, d)$  espaço métrico e  $A \subset X$  um conjunto não vazio. Então, a função  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por  $f(x) = d(x, A)$  é contínua.

*Demonstração.* Seja  $a \in A$  e sejam  $x, y \in X$ . Temos que  $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$ . Logo,  $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$ . Assim,

$$d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y).$$

Analogamente, temos

$$d(y, A) - d(x, A) \leq d(y, x).$$

Portanto,  $|f(x) - f(y)| = |d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ . Com isso, temos que, dado  $\varepsilon > 0$ , para  $x, y \in X$ , temos que  $d(x, y) < \varepsilon$  implica que  $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ . O que mostra que tal função é contínua (ver Alongamento 2.1.17 e lembre que a métrica usual em  $\mathbb{R}$  é dada por  $d(x, y) = |x - y|$ ).  $\square$

**Corolário 2.2.4.** *Seja  $(X, d)$  um espaço métrico. Então,  $(X, d)$  é normal.*

*Demonstração.*  $T_1$  é imediato (já feito).

Sejam  $F, G \subset X$  fechados disjuntos. Considere a função  $f : X \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$f(x) = \frac{d(x, F)(1 - d(x, G))}{d(x, F) + d(x, G)}.$$

Note que  $f$  satisfaz as hipóteses da Proposição 2.2.1 e portanto segue o resultado.  $\square$

A continuidade segue da continuidade de operações básicas (exercício) e de que composta de funções contínuas é contínua.




Figura 2.3: Abertos intercalados

Agora vamos provar o “lado difícil” da equivalência. Nesta demonstração usaremos muitas vezes o seguinte fato: Se  $(X, \tau)$  é  $T_4$  e  $F$  é um fechado contido num aberto  $A$ , então existe um aberto  $B$  tal que  $F \subset B \subset \overline{B} \subset A$  (note que isto é, na verdade, equivalente a ser  $T_4$ , vide o Alongamento 1.2.23).

**Teorema 2.2.5 (Lema de Urysohn).** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço topológico  $T_4$ . Sejam  $F, G \subset X$  fechados disjuntos. Então existe uma função contínua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que, para todo  $x \in F$ ,  $f(x) = 0$  e, para todo  $x \in G$ ,  $f(x) = 1$ .*

*Demonstração.* Seja  $\{q_n : n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ , de forma que  $q_0 = 0$ ,  $q_1 = 1$  e  $q_i \neq q_j$  se  $i \neq j$ . Vamos definir por indução uma família  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  de abertos de  $X$ , de forma que, para todo  $n, m \in \mathbb{N}$ :

- (a)  $F \subset U_n \subset \overline{U_n} \subset X \setminus G$ ;
- (b) se  $q_n < q_m$ , então  $\overline{U_n} \subset U_m$ .

Atenção com a ordem aqui: não estamos usando a ordem dos naturais, mas sim a ordem dos racionais. Por exemplo, suponha que

$q_0 = 0$ ;  $q_1 = 1$ ;  $q_2 = \frac{1}{2}$ ,  
 $q_3 = \frac{1}{3}$  e  $q_4 = \frac{2}{3}$ . Então teríamos que  $U_0 \subset \overline{U_0} \subset U_3 \subset \overline{U_3} \subset U_2 \subset \overline{U_2} \subset U_4 \subset \overline{U_4} \subset U_1$

Mostremos que existe tal família.

Seja  $U_0$  aberto tal que  $F \subset U_0 \subset \overline{U_0} \subset X \setminus G$  (note que  $U_0$  existe por  $(X, \tau)$  ser  $T_4$ ). Seja  $U_1$  aberto tal que  $\overline{U_0} \subset U_1 \subset \overline{U_1} \subset X \setminus G$  (novamente, tal  $U_1$  existe por  $(X, \tau)$  ser  $T_4$ ). Note que as condições (a) e (b) impostas acima estão satisfeitas.

Seja  $U_2$  aberto tal que  $\overline{U_0} \subset U_2 \subset \overline{U_2} \subset U_1$ . Vale lembrar que o índice 2 em  $U_2$  faz referência ao racional  $q_2$  e que este é tal que  $0 < q_2 < 1$ . Em particular,  $U_2$  satisfaz (a) e (b).

Suponha  $U_j$  definido para todo  $j \leq k$ , com  $k \geq 2$ , de forma que estejam satisfeitas as condições (a) e (b) (vamos chamar isso de “hipótese de indução” (HI)).

Seja  $i \leq k$  de forma que

$$q_i = \max\{q_n : n \leq k, q_n < q_{k+1}\}.$$

Note que  $q_i$  está bem definido, devido a  $q_0 = 0$ . Seja  $j \leq k$  de forma que

$$q_j = \min\{q_n : n \leq k, q_{k+1} < q_n\}.$$

Novamente, tal número está bem definido, devido a  $q_1 = 1$ .

Por HI, temos  $\overline{U_i} \subset U_j$ ; por  $(X, \tau)$  ser  $T_4$ , podemos tomar  $U_{k+1}$  aberto tal que  $\overline{U_i} \subset U_{k+1} \subset \overline{U_{k+1}} \subset U_j$ . Vamos mostrar  $U_{k+1}$  satisfaz (a) e (b).

De fato, temos (a) pois

$$F \subset U_i \subset \overline{U_i} \subset U_{k+1} \subset \overline{U_{k+1}} \subset U_j \subset \overline{U_j} \subset X \setminus G$$

Note que tanto a primeira quanto a última inclusão decorrem de HI.

Para a condição (b), seja  $m \leq k$ . Temos dois casos:  $q_m < q_{k+1}$  e  $q_{k+1} < q_m$ . Vamos fazer o caso em que  $q_{k+1} < q_m$  (o outro caso é análogo e é o Alongamento 2.2.9). Note que  $q_m \geq q_j$ . Temos dois subcasos aqui: se  $q_m = q_j$ , segue trivialmente de nossas hipóteses, já que

$$\overline{U_{k+1}} \subset U_j$$

Agora, se  $q_j < q_m$ , segue de (HI) que

$$\overline{U_{k+1}} \subset U_j \subset \overline{U_j} \subset U_m.$$

Agora vamos construir a função do enunciado. Seja  $f : X \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$f(x) = \inf(\{q_n : x \in U_n\} \cup \{1\}),$$

para todo  $x \in X$ . Claramente,  $f(x) \in [0, 1]$  para qualquer  $x \in X$ . Suponha que  $x \in F$ . Neste caso, temos por construção que  $x \in U_0$  e, portanto,  $f(x) = 0$ . Se tivermos  $x \in G$ , então  $x \notin U_n$ , para todo  $n \in \mathbb{N}$  e, portanto,  $f(x) = 1$  (note que, em ambos os casos, utilizamos a condição (a)). Resta apenas mostrar que  $f$  é contínua. Considere as seguintes afirmações sobre  $\alpha \in ]0, 1[$ :

Fazendo o mesmo exemplo que apresentamos antes, quando  $k + 1 = 2$ , teríamos que  $q_i = 0$  e  $q_j = 1$ . Já quando  $k + 1 = 3$ , teríamos  $q_i = q_0$  e  $q_j = q_2$ . Os números  $q_i$  e  $q_j$  indicam o “lugar” onde  $U_{k+1}$  deve ser encaixado.

Boa parte do argumento aqui segue diretamente do fato dos  $U_n$ 's estarem encaixados na mesma ordem que os respectivos  $q_n$ 's.

- (i)  $f^{-1}[[0, \alpha[$  é aberto: Seja  $x \in X$  tal que  $0 \leq f(x) < \alpha$ . Seja  $q_n \in \mathbb{Q}$  tal que  $f(x) < q_n < \alpha$ . Vamos mostrar que

$$x \in U_n \subset f^{-1}[[0, \alpha[.$$

Primeiramente, note que  $x \in U_n$  pois, caso contrário, teríamos que  $f(x) \geq q_n$ , contrariando nossa hipótese. Agora seja  $y \in U_n$ . Assim,  $f(y) \leq q_n$  e, portanto,  $f(y) \in [0, \alpha[$  como queríamos.

- (ii)  $f^{-1}]]\alpha, 1]]$  é aberto: Seja  $x \in X$  tal que  $\alpha < f(x) \leq 1$ . Seja  $q_n \in \mathbb{Q}$  tal que  $\alpha < q_n < f(x) < 1$ . Vamos mostrar que

$$x \in X \setminus \overline{U_n} \subset f^{-1}]]\alpha, 1]].$$

Primeiramente, note que  $x \in X \setminus \overline{U_n}$ . Pois, caso contrário, teríamos que  $x \in \overline{U_n} \subset U_m$  para todo  $m$  tal que  $q_m > q_n$ . Logo,  $f(x) \leq q_n$  contrariando nossa hipótese. Agora seja  $y \in X \setminus \overline{U_n}$ . Note que  $f(y) \geq q_n$  e, portanto,  $f(y) \in ]q_n, 1]$  como queríamos.

Note que abertos da forma  $] \alpha, \beta[$ ,  $[0, \alpha[$ ,  $] \beta, 1]$  formam uma base para  $[0, 1]$  e que  $] \alpha, \beta[ = [0, \beta[ \cap ] \alpha, 1]$ . Como  $f^{-1}[A \cap B] = f^{-1}[A] \cap f^{-1}[B]$  em geral, concluímos que a imagem inversa de um aberto de uma base fixada é aberta. Logo,  $f$  é contínua (veja o Alongamento 2.1.15).  $\square$

**Corolário 2.2.6.** *Um espaço topológico  $(X, \tau)$  é  $T_4$  se, e somente se, para quaisquer fechados  $F, G \subset X$  disjuntos existir uma função contínua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(x) = 0$  para todo  $x \in F$  e  $f(x) = 1$  para todo  $x \in G$ .*

**Corolário 2.2.7.** *Um espaço topológico  $(X, \tau)$   $T_1$  é normal se, e somente se, para quaisquer fechados  $F, G \subset X$  disjuntos existir uma função contínua  $f : X \rightarrow [0, 1]$  tal que  $f(x) = 0$  para todo  $x \in F$  e  $f(x) = 1$  para todo  $x \in G$ .*

Podemos pensar que espaços normais são aqueles em que funções contínuas separam fechados disjuntos. Ao tentarmos fazer o análogo para separação entre pontos e fechados, obtemos um novo axioma de separação:

Alguns lugares chamam um espaço completamente regular de um **espaço de Tychonoff**.

**Definição 2.2.8.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é  $T_{3\frac{1}{2}}$  se, para todo  $x \in X$  e  $F \subset X$  fechado tal que  $x \notin F$  existir  $f : X \rightarrow [0, 1]$  contínua, tal que  $f(x) = 0$  e  $f(y) = 1$ , para todo  $y \in F$ . No caso que  $(X, \tau)$  também é  $T_1$ , dizemos que  $(X, \tau)$  é um espaço **completamente regular**.

### Alongamentos

**Alongamento 2.2.9.** Complete a demonstração do Lema de Urysohn, para o caso em que  $m \leq k$  e  $q_m < q_{k+1}$ .

**Alongamento 2.2.10.** Mostre que todo espaço completamente regular é um espaço regular.

### Exercícios

**Exercício 2.2.11.** Seja  $(X, d)$  espaço métrico. Sejam  $F \subset X$  fechado. Mostre que, dado  $x \in X$ ,  $d(x, F) = 0$  se, e somente se,  $x \in F$ .

**Exercício 2.2.12.** Mostre que subespaços de espaços  $T_{3\frac{1}{2}}$  são  $T_{3\frac{1}{2}}$ .

**Exercício 2.2.13.** Seja  $X$  um conjunto não vazio. Dizemos que  $\preceq$  é uma **ordem parcial** sobre  $X$  se, dados  $a, b, c \in X$  temos:

- (i)  $a \preceq a$ ;
- (ii) se  $a \preceq b$  e  $b \preceq a$ , então  $a = b$ ;
- (iii) se  $a \preceq b$  e  $b \preceq c$ , então  $a \preceq c$ .

Mostre que a seguinte relação é uma ordem parcial sobre subconjuntos de um espaço topológico:  $A \preceq B$  se, e somente se,  $\overline{A} \subset B$  ou  $A = B$ .

**Exercício 2.2.14.** Considere  $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$  como na demonstração do Teorema 2.2.5 e  $\preceq$  como definida no exercício anterior.

- (a) Mostre que  $\preceq$  é uma **ordem total** (isto é, dados  $a, b$ , temos que  $a \preceq b$  ou  $b \preceq a$ ) sobre  $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ ;
- (b) Mostre que existe um **isomorfismo de ordem**<sup>1</sup> entre  $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$  com a ordem  $\preceq$  e  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$  com a ordem usual.

## 2.3 Extensões de funções

**Definição 2.3.1.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos. Seja  $A \subset X$ . Dadas  $f : A \rightarrow Y$  e  $g : X \rightarrow Y$  funções contínuas, dizemos que  $g$  é uma **extensão contínua** de  $f$  se  $f(a) = g(a)$  para todo  $a \in A$ .

<sup>1</sup> $(X, \preceq)$  é isomorfo a  $(Y, \leq)$  se existe  $f : X \rightarrow Y$  bijetora tal que, para todo  $a, b \in X$ ,  $f(a) \leq f(b)$  se, e somente se,  $a \preceq b$ .

Os valores num denso determinam, no máximo, uma função contínua:

**Proposição 2.3.2.** *Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \rho)$  espaços topológicos, onde  $(Y, \rho)$  é de Hausdorff. Se  $D \subset X$  é denso e  $f : X \rightarrow Y$  e  $g : X \rightarrow Y$  são duas funções contínuas tais que  $f(d) = g(d)$  para todo  $d \in D$ , então  $f = g$ .*

*Demonstração.* Suponha que não. Seja  $x \in X$  tal  $f(x) \neq g(x)$ . Sejam  $A$  e  $B$  abertos disjuntos tais que  $f(x) \in A$  e  $g(x) \in B$ . Note que  $f^{-1}[A] \cap g^{-1}[B]$  é um aberto contendo  $x$ . Logo, existe  $d \in f^{-1}[A] \cap g^{-1}[B]$ . Note que  $f(d) = g(d) \in A \cap B$ , contradição.  $\square$

Na verdade, dada qualquer  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , existe um denso  $D \subset \mathbb{R}$  tal que  $f$  é contínua em tal denso [1].

Dissemos “no máximo” pois existem casos que uma função contínua num denso não admite qualquer extensão contínua:

**Exemplo 2.3.3.** Considere  $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ é par} \\ 0 & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Note que  $f$  é contínua,  $\mathbb{N}$  é denso em  $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$  (espaço da sequência convergente) e não existe  $g : \mathbb{N} \cup \{\infty\} \rightarrow [0, 1]$  contínua que estenda  $f$ .

Note que no mesmo exemplo, temos que  $f$  está definida num aberto e não pode ser estendida continuamente ao espaço todo. Vamos agora apresentar um resultado sobre quando podemos estender uma função definida num fechado:

**Teorema 2.3.4 (Teorema da Extensão de Tietze).** *Seja  $(X, \tau)$  um espaço  $T_4$ . Sejam  $M \subset X$  fechado e  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua. Então existe  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  uma extensão contínua de  $f$ .*

Note que vale a volta, isto é, se  $(X, \tau)$  for um espaço topológico tal que para qualquer função contínua  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ , com  $M \subset X$  fechado, existir uma extensão contínua  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ , então  $(X, \tau)$  é  $T_4$ . De fato, dados  $F, G \subset X$  fechados disjuntos, a função  $f : F \cup G \rightarrow \{0, 1\}$  dada por  $f(x) = 1$  se  $x \in F$  e  $f(x) = 0$  caso  $x \in G$ ; é contínua, donde segue que existe  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  contínua com  $g(x) = 1$  se  $x \in F$  e  $g(x) = 0$  caso  $x \in G$ ; note que  $g^{-1} \left[ \left] 0, \frac{1}{2} \right[ \right] \supset G$  e  $g^{-1} \left[ \left] \frac{1}{2}, 1 \right[ \right] \supset F$  são abertos disjuntos.

Antes de demonstrarmos o teorema, vamos provar alguns lemas auxiliares.

**Lema 2.3.5.** *Sejam  $(X, \tau)$   $T_4$ ,  $M \subset X$  fechado e  $f_0 : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua tal que  $|f_0(x)| \leq c$ , para todo  $x \in M$  (com  $c \in \mathbb{R}_{>0}$  fixado). Então existe  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  contínua, tal que*




Figura 2.4: A ideia para o Lema 2.3.5

$$(a) |g(x)| \leq \frac{1}{3}c, \text{ para todo } x \in X;$$

$$(b) |f_0(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}c, \text{ para todo } x \in M.$$

*Demonstração.* Sejam  $A = f_0^{-1} [[-c, -\frac{1}{3}c]]$  e  $B = f_0^{-1} [[\frac{1}{3}c, c]]$ . Note que  $A$  e  $B$  são disjuntos e fechados de  $M$ , pois são imagens inversas de fechados via função contínua. Como  $M$  é fechado em  $X$ , temos  $A$  e  $B$  são disjuntos e fechados em  $X$ .

Pelo Lema de Urysohn, existe  $h : X \rightarrow [0, 1]$  contínua tal que  $h[A] = \{0\}$  e  $h[B] = \{1\}$ . Note que a função  $g(x) = \frac{2}{3}c \cdot (h(x) - \frac{1}{2})$  satisfaz as condições (a) e (b) desejadas (ver Alongamento 2.3.8).  $\square$

**Lema 2.3.6.** *Sejam  $(X, \tau)$   $T_4$ ,  $M \subset X$  fechado e  $f : M \rightarrow [-1, 1]$  contínua. Então existe  $g : X \rightarrow [-1, 1]$  uma extensão contínua de  $f$ .*

*Demonstração.* Vamos definir  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  funções contínuas de  $X$  em  $[-1, 1]$  satisfazendo

$$(a) |g_i(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^i, \text{ para todo } x \in X;$$

$$(b) \left| f(x) - \sum_{j=0}^i g_j(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^i, \text{ para todo } x \in M.$$

Para definir  $g_0$ , aplicamos o Lema 2.3.5 para  $f$  e  $c = 1$  (note que tal valor de  $c$  se deve ao fato de  $f$  ser limitada por 1 pela hipótese deste lema). Suponha definidas  $g_0, \dots, g_i$ , de modo a valer (a) e (b). Vamos definir  $g_{i+1}$ .

Aplique o lema anterior para  $f - \sum_{j=0}^i (g_j \upharpoonright M)$  e  $c = (\frac{2}{3})^i$ . Note que  $f - \sum_{j=0}^i (g_j \upharpoonright M)$  é contínua (por ser soma de funções contínuas) e limitada pela constante  $c$  escolhida (pois  $g_0, \dots, g_i$  satisfazem b). É imediato verificar que  $g_{i+1}$  satisfaz (a) e (b).

Defina  $g : X \rightarrow [-1, 1]$  como  $g(x) = \sum_{j=0}^{\infty} g_j(x)$ , para todo  $x \in X$  (note que tal definição faz sentido devido à condição (a)). Pela condição (b), temos que  $g$  estende  $f$ . Resta apenas mostrar que  $g$  é contínua.

Sejam  $\varepsilon > 0$  e  $x \in X$ . Tome  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $\sum_{i=n_0+1}^{\infty} (\frac{2}{3})^{i+1} < \frac{\varepsilon}{2}$ . Como cada  $g_i$  é contínua, existe  $A_i$  vizinhança de  $x$  tal que para todo  $y \in A_i$ ,  $|g_i(x) - g_i(y)| < \frac{\varepsilon}{2(n_0+1)}$ . Seja  $A = \bigcap_{i=0}^{n_0} A_i$  (note que  $A$  é vizinhança de  $x$ ). Seja  $y \in A$ . Temos

$$\begin{aligned}
|g(x) - g(y)| &\leq \sum_{i=0}^{\infty} |g_i(x) - g_i(y)| \\
&= \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} |g_i(x) - g_i(y)| \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} (|g_i(x)| + |g_i(y)|) \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} \left( \frac{1}{3} \left( \frac{2}{3} \right)^i + \frac{1}{3} \left( \frac{2}{3} \right)^i \right) \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^i \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) \\
&\leq \sum_{i=0}^{n_0} |g_i(x) - g_i(y)| + \sum_{i=n_0+1}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^{i+1} \\
&< (n_0 + 1) \frac{\varepsilon}{2(n_0+1)} + \frac{\varepsilon}{2} \\
&= \varepsilon
\end{aligned}$$

□

Finalmente, podemos passar à demonstração do Teorema:

*Demonstração do Teorema da Extensão de Tietze (2.3.4).* Note que basta mostrarmos o resultado para  $f : M \rightarrow ]-1, 1[$  (pois existe  $\varphi : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  bijetora contínua com inversa contínua e, portanto, o argumento segue via composições adequadas - veremos mais sobre isso em 2.4.13).

Pelo Lema 2.3.6, existe  $g : X \rightarrow [-1, 1]$  contínua que estende  $f$ . Seja  $M' = g^{-1}[\{-1, 1\}]$ . Note que  $M$  e  $M'$  são fechados disjuntos. Pelo Lema de Urysohn, existe  $h : X \rightarrow [0, 1]$  contínua tal que  $h[M] = \{1\}$  e  $h[M'] = \{0\}$ . Finalmente, note que a função desejada é  $F : X \rightarrow ]-1, 1[$  dada por  $F(x) = g(x)h(x)$ . □



**Exemplo 2.3.7.** Considere  $(X, \tau)$  como o plano de Niemytski (ver Exercício 1.3.35). Vamos mostrar que tal espaço não é normal. Faremos isso de duas maneiras (ambas usam um argumento de cardinalidade - escolha a que deixar você mais confortável).

Por ser  $T_1$ , afirmar que  $X$  não é normal equivale a afirmar que  $X$  não é  $T_4$ . Suponha, por absurdo, que  $X$  seja  $T_4$ . Note primeiramente que  $R = \mathbb{R} \times \{0\} = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$  é fechado em  $X$  e, como  $R$  é discreto, qualquer subconjunto  $F \subset R$  é fechado em  $R$  e, portanto, também é fechado em  $X$ . Note que  $F$  e  $R \setminus F$  são disjuntos e fechados em  $X$ . Vamos agora terminar de duas maneiras diferente:

- Aplicando o Teorema de Tietze, temos que, para cada  $F \subset R$ , existe  $f_F : X \rightarrow \mathbb{R}$  contínua tal que  $f_F[F] = \{0\}$  e  $f_F[R \setminus F] = \{1\}$ . Note que, se  $F \neq G$ , então  $f_F \neq f_G$ . Logo, temos uma quantidade maior igual que  $|\wp(R)|$  de funções contínuas saindo de  $X$  e chegando em  $\mathbb{R}$ . Por outro lado, seja  $D \subset X$  denso enumerável. Então existem  $|\wp(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$  funções (contínuas ou não) saindo de  $D$  e chegando em  $\mathbb{R}$ . Logo, pela Proposição 2.3.2, existem, no máximo  $|\mathbb{R}|$  funções contínuas saindo de  $X$  e chegando em  $\mathbb{R}$ . Como  $|\wp(\mathbb{R})| > |\mathbb{R}|$ , temos uma contradição.
- Aplicando diretamente o definição de  $T_4$ , para cada  $F \subset R$ , existem abertos (em  $X$ )  $A(F)$  e  $B(F)$  disjuntos tais que  $F \subset A(F)$  e  $R \setminus F \subset B(F)$ .

Isso é um fato que poder ser facilmente provado usando-se um pouco de teoria dos conjuntos.

Vamos mostrar que, se  $F \neq G$ , então  $A(F) \neq A(G)$ . Sejam  $F, G \subset R$  com  $F \neq G$ . Sem perda de generalidade, suponha  $F \setminus G \neq \emptyset$ . Como  $F \setminus G = F \cap (R \setminus G)$ , segue que  $B(G) \cap A(F) \neq \emptyset$ , mas como  $A(G) \cap B(G) = \emptyset$ , temos necessariamente  $A(F) \neq A(G)$ .

Seja  $D$  denso enumerável em  $X$ . Defina  $A'(F) = A(F) \cap D$  e  $B'(F) = B(F) \cap D$ . Por argumentação análoga à anterior, vemos que se  $F \neq G$ , então  $A'(F) \neq A'(G)$ . Assim, obtemos  $\varphi : \wp(R) \rightarrow \wp(D)$  dada por  $\varphi(F) = A'(F)$ , uma função injetora, o que é absurdo, uma vez que  $|\wp(R)| > |\wp(D)|$ .

Estas duas demonstrações apresentadas aqui podem ser generalizadas pelo Lema de Jones (ver Exercício 2.3.11).

## Alongamentos

**Alongamento 2.3.8.** Prove que a função  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  dada na demonstração do Lema 2.3.5 satisfaz as condições (a) e (b).

**Alongamento 2.3.9.** Mostre o Lema de Urysohn a partir do Teorema de Tietze.

### Exercícios

**Exercício 2.3.10.** Seja  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sequência de pontos de  $\mathbb{R}$  tal que  $x_n \rightarrow x \in \mathbb{R}$ ,  $x_n \neq x_m$  se  $n \neq m$  e  $x_n \neq x$  para todo  $n$ . Seja também  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sequência de pontos de  $\mathbb{R}$  tal que  $y_n \rightarrow y \in \mathbb{R}$ . Mostre que existe uma função contínua  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = f(y)$  e  $f(x_n) = f(y_n)$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercício 2.3.11.** Prove o seguinte caso particular do **Lema de Jones**: Seja  $(X, \tau)$  espaço topológico separável. Se existe  $D \subset X$  discreto fechado tal que  $|D| = \mathfrak{c}$  (cardinalidade do contínuo), então  $(X, \tau)$  não é  $T_4$ .

## 2.4 Homeomorfismos

Nesta seção vamos apresentar como formalizar a ideia que dois espaços são o mesmo do ponto de vista topológico.

**Definição 2.4.1.** Sejam  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  espaços topológicos. Dizemos que uma função  $f : X \rightarrow Y$  é um **homeomorfismo**, se  $f$  é bijetora, contínua e  $f^{-1}$  é contínua. Neste caso, dizemos que  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  são **homeomorfos**.

Intuitivamente, mostrar que dois espaços dados são homeomorfos é “fácil”: É lógico que às vezes é difícil de encontrar o homeomorfismo, mas isso é outra história.

Por causa desse tipo de truque, na prática muitas vezes a situação é o inverso do que a intuição pode dizer num primeiro momento, já que em geral é muito mais fácil verificar invariantes do que construir homeomorfismos no braço.

basta exibir o homeomorfismo. Por outro lado, mostrar que dois espaços não são homeomorfos costuma ser uma tarefa mais “difícil”: precisamos mostrar que não existe um homeomorfismo. Nesse sentido, encontrar invariantes topológicos é bastante útil, já que se um dos espaços satisfaz algum invariante enquanto o outro não, já temos automaticamente a não existência de homeomorfismos.

**Definição 2.4.2.** Chamamos uma propriedade  $P$  de um **invariante topológico**, se ela é preservada por homeomorfismos (isto é, se  $(X, \tau)$  e  $(Y, \sigma)$  são espaços homeomorfos, então  $(X, \tau)$  tem a propriedade  $P$  se, e somente se,  $(Y, \sigma)$  tem).

**Exemplo 2.4.3.** Todos os axiomas de separação e de enumerabilidade que apresentamos são invariantes topológicos. Por exemplo, provamos no Corolário 2.1.8 que se  $X$  é separável e  $f : X \rightarrow Y$  é contínua e sobrejetora, então  $Y$  também é separável. Assim, se  $f$  é um homeomorfismo entre  $X$  e  $Y$ , temos que o fato de  $X$  ser separável implica  $Y$  ser separável. Já a função

$f^{-1}$  nos dá que  $Y$  ser separável implica que  $X$  também é. Veja também o Exercício 2.4.24.

Nem tudo que é discutido no âmbito de espaços métricos é topológico, como o próximo exemplo ilustra:

**Exemplo 2.4.4.** Seja o conjunto  $X = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ . Sobre este conjunto podemos ter a métrica  $d_1$ , herdada da métrica usual em  $\mathbb{R}$  e, também, podemos ter a métrica discreta  $d_2$ , dada por

$$d_2(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

O espaço  $(X, d_1)$  não é completo, pois  $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$  é uma sequência de Cauchy que não converge em  $(X, d_1)$ . Por outro lado,  $(X, d_2)$  é completo, pois com a métrica discreta, qualquer espaço é completo.

A métrica  $d_1$  induz a topologia  $\tau$  sobre  $X$  que é a topologia induzida de  $\mathbb{R}$  sobre  $X$ . Por outro lado, a métrica  $d_2$  induz a topologia discreta  $\sigma$  sobre  $X$ . Note que, neste caso,  $\tau = \sigma$ . Portanto, a função  $f : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ , dada por  $f(x) = x$  é um homeomorfismo.

Logo, apesar da propriedade “ser sequência convergente” ser um invariante topológico, a propriedade “ser sequência de Cauchy” não é. Veja o Alongamento 2.4.15

Vamos terminar esta seção mostrando alguns resultados envolvendo a topologia da ordem e dando uma caracterização para o reais (a menos de homeomorfismos).

**Definição 2.4.5.** Seja  $(X, \leq)$  um conjunto ordenado. Dizemos que  $\leq$  é uma **ordem total** se, para todo  $x, y \in X$ , vale  $x \leq y$  ou  $y \leq x$ .

**Definição 2.4.6.** Seja  $(X, \leq)$  um conjunto totalmente ordenado. Chamamos de **topologia da ordem** sobre  $(X, \leq)$  a topologia gerada pelos seguintes conjuntos (para todo  $a, b \in X$ ):

- (a)  $]a, b[ = \{x \in X : a < x < b\}$ ;
- (b)  $[a, b[ = \{x \in X : a \leq x < b\}$ , caso  $a = \min X$ ;
- (c)  $]a, b] = \{x \in X : a < x \leq b\}$ , caso  $b = \max X$ .

**Exemplo 2.4.7.** As topologias usuais sobre  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{N}$  e  $[0, 1]$  são as topologias induzidas pelas ordens usuais dos respectivos conjuntos.

**Definição 2.4.8.** Sejam  $(X, \leq)$  e  $(Y, \preceq)$  espaços ordenados. Dizemos que  $f : X \rightarrow Y$  é um **isomorfismo de ordem** se  $f$  é bijetora e, para todo  $a, b \in X$ , temos  $a \leq b$  se, e somente se,  $f(a) \preceq f(b)$ .

**Definição 2.4.9.** Seja  $(X, \leq)$  um conjunto totalmente ordenado. Dizemos que  $\leq$  é uma **ordem densa** se para todo  $x, y \in X$ , com  $x < y$ , existe  $z \in X$  tal que  $x < z < y$ .

**Exemplo 2.4.10.** Os conjuntos  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$  e  $[0, 1]$  têm as ordens usuais densas enquanto  $\mathbb{N}$  não tem.

Vamos apresentar uma maneira de caracterizar os reais com esta linguagem. Para isso, vamos apresentar antes outra caracterização interessante, mas esta sobre os racionais:

**Teorema 2.4.11.** *Todo conjunto enumerável, totalmente ordenado com uma ordem densa e sem maior nem menor elementos é isomorfo (e, portanto, homeomorfo) a  $\mathbb{Q}$ .*

Veja o Exercício 2.4.18

*Demonstração.* Seja  $(X, \leq)$  como no enunciado e  $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma enumeração para  $X$ . Seja, também,  $\{q_n : n \in \mathbb{N}\}$  uma enumeração para  $\mathbb{Q}$ . Vamos definir indutivamente  $f : X \rightarrow \mathbb{Q}$  um isomorfismo de ordem. Primeiramente, definimos  $f(x_0) = q_0$ .

Agora, caso  $x_1 < x_0$ , tomamos  $n = \min\{m : q_m < q_0\}$  e, caso  $x_1 > x_0$ , tomamos  $n = \min\{m : q_0 < q_m\}$  e definimos  $f(x_1) = q_n$ .

Suponha definidos  $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$  e tratemos os casos:

- CASO 1: se  $x_{n+1} < x_i$ , para todo  $i \leq n$ , tomamos  $k = \min\{m : q_m < f(x_i), \forall i \leq n\}$ ;
- CASO 2: se  $x_{n+1} > x_i$ , para todo  $i \leq n$ , tomamos  $k = \min\{m : q_m > f(x_i), \forall i \leq n\}$ ;
- CASO 3: se existem  $i, j \leq n$  tais que  $x_i < x_{n+1} < x_j$ , sejam  $I = \max\{x_m : x_m < x_{n+1}, m \leq n\}$  e  $J = \min\{x_m : x_m > x_{n+1}, m \leq n\}$ . Agora, tomamos  $k = \min\{m : f(I) < q_m < f(J)\}$ .

Definimos  $f(x_{n+1}) = q_k$ . Pela construção,  $f$  preserva a ordem e é injetora.

Vejamos que  $f$  é, também, sobrejetora. Para isso, precisamos mostrar que todo  $q_n$  pertence à imagem de  $f$ . Suponha que não. Seja  $m$  o menor índice tal que  $q_m$  não esteja na imagem de  $f$ . Seja

$$n = \min\{p : \forall k < p, \exists s < p \text{ } f(x_s) = q_k\}$$

A ideia aqui é pegar o primeiro momento em que todos os  $q_k$ 's antes de  $q_m$  já apareceram na imagem.




Figura 2.5: Construindo o isomorfismo

Temos 3 casos:  $x_n < x_s$  para todo  $s < n$ ,  $x_n > x_s$  para todo  $s < n$  ou existem  $a, b < n$  tais que  $x_a < x_n < x_b$ . Vamos analisar este último caso (os outros são análogos). Note que, pelo CASO 3 da construção,  $f(x_n) = q_m$  contrariando o fato de  $q_m$  não estar na imagem de  $f$ .  $\square$

Finalmente, a caracterização para os reais:

**Teorema 2.4.12.** *Todo espaço totalmente ordenado, com ordem densa, sem maior nem menor elementos, completo e separável é homeomorfo a  $\mathbb{R}$ .*

*Demonstração.* Seja  $(X, \leq)$  como no enunciado. Seja  $D \subset X$  denso e enumerável. Vamos mostrar que  $D$  satisfaz as hipóteses do teorema anterior (Teorema 2.4.11).

Suponha por contradição que  $D$  possua maior elemento  $m$ . Sejam  $x_1, x_2 \in X$  tais que  $m < x_1 < x_2$  (tais elementos existem pois  $X$  não possui maior elemento). Note que  $]m, x_2[ \neq \emptyset$  e  $]m, x_2[ \cap D = \emptyset$ . Mas isso é uma contradição pois  $D$  é denso em  $X$ . Analogamente,  $D$  não tem menor elemento.

Suponha que a ordem de  $D$  não seja densa. Então, existem  $d_1, d_2 \in D$  tais que  $d_1 < d_2$  e  $]d_1, d_2[ \cap D = \emptyset$ . Mas, como a ordem em  $X$  é densa,  $]d_1, d_2[ \neq \emptyset$ , o que é, novamente, uma contradição com o fato de  $D$  ser denso em  $X$ .

Desta forma, podemos tomar  $f : D \rightarrow \mathbb{Q}$  o isomorfismo dado pelo teo-

rema anterior. Vamos estender  $f$  para  $X$  da seguinte forma:

$$\tilde{f}(x) = \sup\{f(d) : d \in D, d \leq x\}$$

Note que, pela densidade de  $D$ ,  $\tilde{f}$  preserva a ordem. Pela completude de  $X$ , temos que  $\tilde{f}$  é bijetora (veja o Exercício 2.4.17).  $\square$

**Corolário 2.4.13.** *Sejam  $a, b \in \mathbb{R}$ , com  $a < b$ . Então,  $]a, b[$  é homeomorfo a  $\mathbb{R}$ .*

### Alongamentos

**Alongamento 2.4.14.** Mostre que composição de homeomorfismos é um homeomorfismo.

**Alongamento 2.4.15.** Mostre que “ser uma sequência convergente” é um invariante topológico.

**Alongamento 2.4.16.** Seja  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_{>0}\} \cup \{0\}$  com a topologia induzida por  $\mathbb{R}$ . Mostre que tal espaço e o espaço da sequência convergente (Exemplo 2.1.9) são homeomorfos.

### Exercícios

**Exercício 2.4.17.** Mostre que a função  $\tilde{f}$  construída na demonstração de 2.4.12 é bijetora.

**Exercício 2.4.18.** Se  $X$  e  $Y$  são conjuntos totalmente ordenados e com a topologia da ordem, mostre que se  $f : X \rightarrow Y$  é um isomorfismo de ordem, então  $f$  é um homeomorfismo (quando  $X$  e  $Y$  são considerados com as topologias da ordem).

**Exercício 2.4.19.** Mostre que todo espaço com uma topologia da ordem sempre é de Hausdorff.

**Exercício 2.4.20.** Seja  $(X, \leq)$  conjunto totalmente ordenado e com a topologia da ordem. Mostre que se  $X$  tem um **ponto isolado** ( $x$  é isolado se  $\{x\}$  é aberto) então  $\leq$  não é uma ordem densa. Dê um exemplo de que não vale a volta.

**Exercício 2.4.21.** Mostre que  $\mathbb{Q}$  e  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$  são homeomorfos.

**Exercício 2.4.22.** Dizemos que  $(X, \tau)$  é um **espaço homogêneo** se para todo  $x, y \in X$ , existe  $f : X \rightarrow X$  homomorfismo de forma que  $f(x) = y$ .

- (a) Mostre que  $\mathbb{R}$  é homogêneo.
- (b) Mostre que  $]a, b[$  é homogêneo.
- (c) Mostre que  $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$  como no espaço da sequência convergente (Exemplo 2.1.9) não é homogêneo.

**Exercício 2.4.23.** Dizemos que  $f : X \rightarrow Y$  é uma **função aberta** se  $f[A]$  é aberto para todo  $A$  aberto em  $X$  (definimos uma **função fechada** de maneira análoga). Mostre que, se  $f$  é um homeomorfismo, então  $f$  é aberta.

**Exercício 2.4.24.** Seja  $f : X \rightarrow Y$  uma função contínua, injetora e aberta. Mostre que, se  $\mathcal{B}$  é uma base em  $Y$ , então  $\{f^{-1}[B] : B \in \mathcal{B}\}$  é uma base em  $X$ .





# Dicas de alguns exercícios

## 1.1.62

**d** Para o lado  $\bar{A} \subset A \cup \partial A$ , considere  $x \in \bar{A}$ . Note que se  $x \in A$ , é trivial. No caso que  $x \notin A$ , mostre que  $x \in \partial A$ .

## 1.1.75

**e** Suponha que não e use os itens anteriores.

## 1.1.77

**a** Comece com  $A \in \tau$  e  $x \in A$ . Use o fato que  $\mathcal{B}$  é base. Depois use a propriedade do enunciado. Mostre que  $A \in \sigma$ .

**1.2.21** Veja a Proposição **1.1.16**.

## 1.2.30

**a** Mostre que tal conjunto é fechado por intersecções finitas.

**d** Considere o conjunto  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ . Mostre que tal conjunto não pode ser separado do ponto 0.

**1.2.31** Lembre que os racionais são enumeráveis.

**1.3.27** Fixe uma base local enumerável para cada ponto, mostre que a união de todas elas forma uma base.

**1.3.37** Veja a demonstração da proposição **1.2.20**. Use o fato da existência de uma base enumerável para construir o análogo das famílias  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  e  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**1.3.38** Considere  $\mathcal{A} = \{(B_1, B_2) \in \mathcal{B}^2 : B_1 \subset B_2\}$ . Fixe  $C' \in \mathcal{C}$ . Para cada  $(B_1, B_2) \in \mathcal{A}$ , se existir  $C \in \mathcal{C}$  de forma que  $B_1 \subset C \subset B_2$ , então escolha  $C_{B_1, B_2}$  como um destes elementos. Se não existir, simplesmente faça  $C_{B_1, B_2} = C'$ . Note que  $\mathcal{C}' = \{C_{B_1, B_2} : (B_1, B_2) \in \mathcal{A}\}$  é enumerável. Mostre que  $\mathcal{C}'$  é base.

**2.1.20**

a Use o Alongamento 2.1.14.

c Considere  $X = [0, 1]$ ,  $F_1 = \{0\}$  e  $F_2 = ]0, 1]$ .

**2.1.22** Suponha  $x_n \rightarrow x$ . Note que a sequência  $y_{2n} = x_n$  e  $y_{2n+1} = x$  também é convergente.

**2.4.15** Mostre que se  $f : X \rightarrow Y$  é um homeomorfismo, então  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência convergente em  $X$  se, e somente se,  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$  é uma sequência convergente em  $Y$ . Lembre que funções contínuas levam sequências convergentes em sequências convergentes (Proposição 2.1.11).

**2.4.17** Para mostrar que  $\tilde{f}$  é bijetora, considere  $x \in \mathbb{R}$ , mostre que  $f(a) = x$ , onde  $a = \sup\{d \in D : f(d) \leq x\}$ .

**2.4.20** Considere  $[0, 1] \cup [2, 0]$ .

**2.4.22**

b Use o Corolário 2.4.13 e o item (a).

# Soluções de alguns exercícios

## 1.1.59

b Vamos mostrar que  $X \setminus (F \cup G)$  é aberto. Se mostrarmos que  $X \setminus (F \cup G) = (X \setminus F) \cap (X \setminus G)$ , seguirá que o complementar de  $F \cup G$  é aberto por ser a interseção (finita) de abertos, o que acarretará que  $F \cup G$  é fechado. De fato, se  $x \in X \setminus (F \cup G)$ , segue que  $x \in X$  e  $x \notin F$  e  $x \notin G$ , e daí decorre que  $x \in (X \setminus F) \cap (X \setminus G)$ . Reciprocamente, se  $x \in (X \setminus F) \cap (X \setminus G)$ , segue que  $x \in X$  e  $x \notin F$  e  $x \notin G$ , ou equivalentemente,  $x \in X$  e  $x \notin F \cup G$ , acarretando a igualdade desejada.

c Note que se  $\mathcal{A}$  é uma família não vazia de conjuntos, então

$$X \setminus \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} X \setminus A$$

Da igualdade acima, e do fato de que cada membro de  $\mathcal{F}$  possui o complementar aberto, o temos (c).

1.1.60 Por definição,  $\overset{\circ}{A}$  é a reunião dos abertos contidos em  $A$ . Daí, se  $x \in V$  para algum  $V$  aberto contido em  $A$ , temos  $x \in \overset{\circ}{A}$ . A recíproca é imediata.

1.1.71 Seja  $F \subset Y$  fechado em  $Y$ . Então  $Y \setminus F$  é aberto em  $Y$ . Logo, existe  $A \subset X$  um aberto em  $X$  tal que  $A \cap Y = Y \setminus F$ . Vamos mostrar que  $F' = X \setminus A$  satisfaz o que desejamos. Primeiramente, note que  $F'$  é fechado em  $X$  (pois é complementar de um aberto). Agora só precisamos mostrar que, de fato,

$$F = F' \cap Y$$

Seja  $y \in F$ . Então  $y \notin Y \setminus F$  e, portanto,  $y \notin A$ . Assim,  $y \in X \setminus A$  e, portanto,  $y \in Y \cap (X \setminus A) = F'$ . A outra inclusão segue de maneira análoga (é um bom alongamento para o leitor).

Agora precisamos mostrar que, dado  $F'$  fechado em  $X$ ,  $F' \cap Y$  é fechado em  $Y$ . Isso decorre imediatamente do fato que  $Y \setminus (Y \cap F') = Y \cap (X \setminus F')$ . Logo,  $Y \setminus (Y \cap F')$  é aberto em  $Y$  e, portanto,  $Y \cap F'$  é fechado em  $Y$ .

**1.1.72** Suponha  $F \subset Y$  fechado em  $Y$ . Então existe  $F' \subset X$  fechado em  $X$  tal que  $F' \cap Y = F$ . Logo,  $F'$  é fechado em  $X$  (por ser interseção de fechados). Agora suponha  $F \subset Y$  fechado em  $X$ . Note que  $F = F \cap Y$  e, portanto,  $F$  é fechado em  $Y$ .

**1.1.73** Sejam  $(X, \tau)$  um espaço topológico e  $Y \subset X$  um subespaço aberto. Então  $A \subset Y$  é aberto em  $Y$  se, e somente se, for aberto em  $X$ .

A demonstração é análoga a da Proposição **1.1.72**.

**1.1.76** Suponha  $x \in \bar{A}$ . Seja  $V \in \mathcal{V}$ , então existe  $U \subset V$  aberto tal que  $x \in U$ . Como  $x \in \bar{A}$ , obtemos  $U \cap A \neq \emptyset$  e, portanto,  $V \cap A \neq \emptyset$ .

Suponha que para todo  $V \in \mathcal{V}$ ,  $V \cap A \neq \emptyset$ . Seja  $U \subset X$  aberto tal que  $x \in U$ . Como  $\mathcal{V}$  é sistema fundamental de vizinhanças de  $x$ , existe  $V \in \mathcal{V}$  tal que  $x \in V \subset U$ . Logo, como  $V \cap A \neq \emptyset$ , segue que  $U \cap A \neq \emptyset$ .

**1.2.22** Supondo  $(X, \tau) T_3$  e fixando  $x \in X$ , a família  $\mathcal{V}_x = \{\bar{A} : A \in \tau \text{ e } x \in A\}$  é um sistema fundamental de vizinhanças fechadas para  $x$ . Reciprocamente, supondo a existência de um sistema fundamental de vizinhanças fechadas podemos concluir que  $(X, \tau)$  é  $T_3$ .

**1.2.25** Procedamos pela contrapositiva.

Suponha  $\overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$ , para quaisquer  $x, y \in X$  distintos. Isso equivale a afirmar que  $a$  é ponto aderente de  $\{x\}$  se, e somente se,  $a$  é ponto aderente de  $\{y\}$  ou, equivalentemente, todo aberto que contém  $x$  também contém  $y$ , isto é,  $(X, \tau)$  não é  $T_0$ .

**1.2.26** Supondo  $(X, \tau) T_1$ , provemos (b). Basta considerar  $\mathcal{A} = \{A \in \tau : x \in A\}$ . Por construção, vale que  $\{x\} \subset \bigcap \mathcal{A}$ . Por outro lado, se existisse  $y \neq x$  tal que  $y \in \bigcap \mathcal{A}$ , então todo aberto de  $A$  que contém  $x$  também conteria  $y$ , o que contraria a hipótese de estarmos supondo  $(X, \tau) T_1$ .

Agora suponha que para todo  $x \in X$ , existe uma coleção  $\mathcal{A}_x$  de abertos tal que  $\bigcap \mathcal{A}_x = \{x\}$ . Defina  $B_x = \{A \in \tau | x \in A\}$  e  $\mathcal{V}_x = \{U \in \tau : (\exists A, B)(A \in \mathcal{A}_x \text{ e } B \in B_x)(U = A \cap B)\}$ . Claramente,  $\mathcal{V}_x$  é sfv para  $x$  e  $\bigcap \mathcal{V}_x = \{x\}$ .

Finalmente, se para cada  $x \in X$  existir um sfv  $\mathcal{V}_x$  para  $x$  tal que  $\bigcap \mathcal{V}_x = \{x\}$ , então para  $x \neq y$ , segue que existem sistemas de vizinhanças  $\mathcal{V}_x$  e  $\mathcal{V}_y$  para  $x$  e  $y$ , respectivamente, tais que  $\{x\} = \bigcap \mathcal{V}_x \neq \bigcap \mathcal{V}_y = \{y\}$ , ou seja,

existem abertos  $A_y \in \mathcal{V}_y$  e  $A_x \in \mathcal{V}_x$  tais que  $x \in A_x$  mas  $y \notin A_x$  e  $y \in A_y$  mas  $x \notin A_y$ , donde  $(X, \tau)$  é  $T_1$ .

**1.2.27** Se  $(X, \tau)$  é normal, então em particular  $\{x\}$  é fechado. Assim, sejam  $F$  um fechado e  $x \in X$  tais que  $x \notin F$ , isto é,  $\{x\}$  e  $F$  são fechados disjuntos. Por  $X$  ser  $T_4$ , existem abertos  $A$  e  $B$  disjuntos tais que  $\{x\} \subset A$  e  $F \subset B$ , isto é,  $(X, \tau)$  é  $T_3$  e, por ser  $T_1$ ,  $X$  é regular.

Se  $(X, \tau)$  for regular, novamente  $\{x\}$  é fechado, para qualquer  $x \in X$ . Em particular, se  $x \neq y$ ,  $x \notin \{y\}$ , logo existem abertos disjuntos  $A, B$  tais que  $x \in A$  e  $\{y\} \subset B$ , logo  $(X, \tau)$  é de Hausdorff.

Daí, se  $(X, \tau)$  é Hausdorff, dados  $x \neq y$  elementos de  $X$ , existem abertos disjuntos  $A, B$  tais que  $x \in A$  e  $y \in B$ , em particular, por serem disjuntos,  $x \in A$  e  $y \notin A$  e  $y \in B$  e  $x \notin B$ , implicando em  $(X, \tau)$  ser  $T_1$ .

Se  $(X, \tau)$  é  $T_1$ , então claramente também é  $T_0$ .

**1.3.26** Suponha que exista um aberto não vazio  $A$  tal que  $A \cap D = \emptyset$ . Então,  $X \setminus A$  é um fechado diferente de  $X$  de modo que  $D \subset (X \setminus A)$ . Então, como  $\overline{D}$  é a interseção de todos os fechados que contém  $D$ , segue que  $\overline{D} \neq X$  e  $D$  não é denso.

Agora, suponha que para qualquer aberto não vazio  $A$ , temos que  $A \cap D \neq \emptyset$ . Seja  $F$  um fechado tal que  $D \subset F$ , segue que  $X \setminus F$  é um aberto tal que  $(X \setminus F) \cap D = \emptyset$ . Logo  $X \setminus F = \emptyset$  e, então,  $F = X$ . Portanto,  $X$  é o único fechado que contém  $D$  e  $\overline{D} = X$ .

**2.1.18** Seja  $A$  um aberto em  $Y$ . Então, como  $f$  é contínua,  $f^{-1}[A]$  é um aberto em  $X$ , e portanto,  $f^{-1}[A] \cap Z$  é um aberto de  $Z$ . Por outro lado, como  $(f \upharpoonright Z)^{-1}[A] = f^{-1}[A] \cap Z$ , temos que  $f \upharpoonright Z$  é contínua.

**2.4.19** Sejam  $(X, \leq)$  um conjunto totalmente ordenado e  $x, y \in X$  tais que  $x \neq y$ . Suponha, sem perda de generalidade, que  $x < y$ . Então, se  $x \neq \min X$  e  $y \neq \max X$ , temos que existem  $\tilde{x}, \tilde{y} \in X$  de modo que  $\tilde{x} < x < y < \tilde{y}$ . Primeiramente, vamos fazer o caso em que existe  $c \in X$  tal que  $x < c < y$ . Neste caso, temos que  $x \in ]\tilde{x}, c[$ ,  $y \in ]c, \tilde{y}[$  e  $]\tilde{x}, c[ \cap ]c, \tilde{y}[ = \emptyset$ . Já no caso em que não existe tal  $c$ , temos  $x \in ]\tilde{x}, y[$ ,  $y \in ]x, \tilde{y}[$  e  $]\tilde{x}, y[ \cap ]x, \tilde{y}[ = \emptyset$ .

Para os casos  $x = \min X$  ou  $y = \max X$ , basta tomar conjuntos como  $[x, y[$  e  $]x, y]$  e trabalhar como anteriormente.



# Referências Bibliográficas

- [1] H. Blumberg. New Properties of All Real Functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 24:113–118, oct 1922.
- [2] S. Willard. *General topology*. Dover Publications Inc., Mineola, NY, 2004.

## Notação

$B_r(x)$ , 10

$T_0$ , 20

$T_1$ , 22, 41, 44

$T_2$ , 22

$T_3$ , 23

$T_4$ , 24, 41, 44, 49

$T_{3\frac{1}{2}}$ , 44

$\chi_A$ , 40

$\mathbb{R}$ , 8, 11, 13–16, 24

$\wp(X)$ , 9

$d(x, A)$ , 19



## Índice Remissivo

- aberto, 9
- aberto\*, 8
- aderente
  - ponto, 12
- assimétrica, 18
  
- base, 14
- base local, 15
- bases locais
  - enumeráveis, 27
  
- caótica
  - topologia, 9
- característica
  - função, 40
- Cauchy
  - sequência de, 29
- cofinita
  - topologia, 10, 22
- completamente
  - regular, 44
- completo
  - espaço métrico, 29
- conjunto
  - fechado, 11
- contínua
  - extensão, 45
  - função, 36
- converge, 27
  
- de
  - Urysohn, Lema, 42
- denso, 46
- discreta
  - topologia, 9, 11, 15
- distância
  - ponto a conjunto, de, 19
  
- enumeráveis
  - bases locais, 27
- enumerabilidade
  - primeiro axioma de, 27
  - segundo axioma de, 29
  - terceiro axioma de, 30
- equivalentes
  - métricas, 18
- esburacada
  - reta, 26, 28, 32, 33
- espaço
  - completo, métrico, 29
  - Hausdorff, de, 22
  - métrico, 5, 10, 22, 27, 29, 41
  - metrizável, 31
  - normal, 24
  - regular, 23
  - separável, 30
  - sequência convergente, da, 37, 46
  - topológico, 9
  - topológico\*, 8
  - Tychonoff, de, 44
  - zero-dimensional, 19
- extensão
  - contínua, 45
- Extensão de Tietze
  - Teorema da, 46
  
- fechado
  - conjunto, 11
- fecho, 12
- filtro, 6
- fronteira
  - ponto de, 13
- função
  - característica, 40

- contínua, 36
  - identidade, 36
  - no ponto  $x$ , contínua, 35
- gerada
  - topologia, 20
- Hausdorff, 46
- Hausdorff
  - espaço de, 22
- identidade
  - função, 36
- induzida pela métrica
  - topologia, 10
- interior, 12
- interior
  - ponto, 17
- isomorfismo
  - ordem, de, 45
- Jones
  - Lema de, 50
- Lema
  - de Urysohn, 42
  - Jones, de, 50
- métricas
  - equivalentes, 18
- métrico
  - espaço, 5, 10, 22, 27, 29, 41
- metrizável, 32
- metrizável
  - espaço, 31
- Niemytski
  - plano de, 32
- no ponto  $x$ 
  - função contínua, 35
- normal, 41, 44
- normal
  - espaço, 24
- ordem
  - isomorfismo de, 45
  - parcial, 45
  - total, 45
- parcial
  - ordem, 45
- plano
  - Niemytski, de, 32
- ponto
  - aderente, 12
  - fronteira, de, 13
  - interior, 17
- ponto a conjunto
  - distância de, 19
- primeiro axioma
  - enumerabilidade, de, 27
- quase constante
  - sequência, 32
- quasi-métrica, 18
- reais, 5, 16
- real
  - reta, 30
- regular
  - completamente, 44
  - espaço, 23
- reta
  - esburacada, 26, 28, 32, 33
  - real, 30
  - Sorgenfrey, de, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24–27, 30, 31
- segundo axioma
  - enumerabilidade, de, 29
- separável
  - espaço, 30
- sequência

- Cauchy, de, 29
- quase constante, 32
- sequência convergente
  - espaço da, 37, 46
- sistema
  - vizinhanças\*, de, 6
- sistema fundamental
  - vizinhanças, de, 15
- Sorgenfrey
  - reta de, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24–27, 30, 31
- subespaço
  - topologia de, 10
- Teorema
  - Extensão de Tietze, da, 46
- terceiro axioma
  - enumerabilidade, de, 30
- topológico
  - espaço, 9
- topológico\*
  - espaço, 8
- topologia, 9
- topologia
  - caótica, 9
  - cofinita, 10, 22
  - discreta, 9, 11, 15
  - gerada, 20
  - induzida pela métrica, 10
  - subespaço, de, 10
  - usual em  $\mathbb{R}$ , 10
- total
  - ordem, 45
- Tychonoff
  - espaço de, 44
- Urysohn
  - Lema de, 42
- usual em  $\mathbb{R}$ 
  - topologia, 10
- vizinhança, 9
- vizinhança\*, 6
- vizinhanças
  - sistema fundamental de, 15
- vizinhanças\*
  - sistema de, 6
- zero-dimensional
  - espaço, 19